MEDDELELSER

FRA

FINSENS MEDICINSKE LYSINSTITUT

VED

NIELS R. FINSEN

VI

KØBENHAVN
GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG
FR. BAGGES BOGTRYKKERI
1903
(MAJ)

Paa **Gyldendalske Boghandels Forlag** er tidligere udkommet:

MEDDELELSER

FRA

FINSENS MEDICINSKE LYSINSTITUT

VED

NIELS R. FINSEN

I—V

INDHOLD:

I

I. Finsens medicinske Lysinstitut.
II. Nye Undersøgelser over Lysets Indvirkning paa Huden. Af Niels R. Finsen. (Med to Billeder).
III. En Glødelysthermostat. Af S. Bang. (Med et Billede).
IV. Undersøgelser om Virkningen af Spektrets forskellige Afdelinger paa Bakteriers Udvikling. Af Valdemar Bie. (Med en Figur).
V. Om Lysets Evne til at dræbe Gær- og Skimmelsvampe. Af Valdemar Bie.
VI. Paavirkes de forskellige Bakterieærter ens eller forskelligt af Lyset? Af Axel L. Larsen.
VII. Solstraalernes Intensitet. Af Absalon Larsen. (Med to Fig.).
VIII. Nogle Undersøgelser over Forholdet mellem Erysipelas og Lupus vulgaris. Af V. Eilschou Holm.
IX. Nogle Tilfælde af Alopecia areata behandlede med koncentrerede, kemiske Lysstraaler. Foreløbig Meddelelse. Af O. Jersild.
X. Litteraturanmeldelse. Af S. Bang.

II

I. Om Lysets Virkninger paa Mikrober. 1. Variationer i Modstandsevnen hos B. Prodigiosus efter Kulturens Alder og Temperatur. Af Sophus Bang (Med fire Billeder).
II. Actinoskopet. Af Absalon Larsen. (Med et Billede).
III. Et Fotometer. Af Absalon Larsen. (Med tre Billeder).
IV. Om Buelysets Variation med Strøm og Spænding. Af Absalon Larsen.

III

I. Lupus vulgaris laryngis. En klinisk Undersøgelse. (Med en Tavle). Af Holger Mygind.
II. Lysets kemiske Straaler som Incitament samt nogle Bemærkninger om Lysbade. Af Niels R. Finsen.
III. Beretning fra Finsens medicinske Lysinstitut (1898 og 99).
IV. Behandling af Mæslinger og Skarlagensfeber med Udelukkelse af de saakaldte kemiske Lysstraaler. Oversigtsartikel. Af Valdemar Bie.
V. Litteraturanmeldelse. Af Valdemar Bie.

IV

I. Om Anvendelse i Medicinen af koncentrerede kemiske Lysstraaler. Af N. R. Finsen. (Med 8 Billeder og Figurer).
II. Om blaa Vædskers Absorption af ultraviolette Straaler. Af Valdemar Bie.
III. Undersøgelser over Lysets Virkning paa Koppe-Vakcine. Af N. R. Finsen og G. Dreyer.
IV. Om Fremstilling af Buelys ved Hjælp af afkølede Elektroder. Af S. Bang.
V. Om Lysets Virkninger paa Mikrober. Af S. Bang. (Med 6 Figurer).
VI. Behandling af Kopper med Udelukkelse af Dagslysets kemiske Straaler. Af N. R. Finsen.
VII. Behandling af Rosen med Udelukkelse af Dagslysets kemiske Straaler. Af N. R. Finsen.
VIII. Litteraturanmeldelse.

V

I. Lupus vulgaris pharyngis. En klinisk Undersøgelse. Af Holger Mygind.
II. Bidrag til Undersøgelserne over Legemets Gennemstraalelighed. Af Gunni Busck.
III. Undersøgelser over de baktericide Lysstraalers Evne til at trænge gennem Hud. Af Hans Jansen.
IV. Et nyt Lyssamleapparat til Enkeltbehandling. Af Niels R. Finsen og Axel Reyn.
V. Lysets Indvirkning paa Amøber. Af Georges Dreyer.
VI. Om de forskellige Spektralstraalers relative Penetrationsevne overfor dyrisk Væv. Af Gunni Busck.
VII. Om Bakteriesporers Modstandsevne over for Lys. Af Hans Jansen.
VIII. Litteraturanmeldelse.

MEDDELELSER

FRA

FINSENS MEDICINSKE LYSINSTITUT

VI

MEDDELELSER

FRA

FINSENS MEDICINSKE LYSINSTITUT

VED

NIELS R. FINSEN

VI

KØBENHAVN
GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG
FR. BAGGES BOGTRYKKERI
1903
(MAJ)

INDHOLD.

Resultaterne af Lysbehandlingen ved vore første 800 Tilfælde af Lupus vulgaris. Med 48 Dobbelt-Billeder af Patienter. Af NIELS R. FINSEN og H. FORCHHAMMER.

(Fortsættelse af: Om Anvendelse i Medicinen af koncentrerede kemiske Lysstraaler. Af NIELS R. FINSEN. — Meddelelser fra F. m. L. IV, Side 1—57).

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/meddelelser-fra-finsens-medicinske-lysinstitut_1903_6

RESULTATERNE AF LYSBEHANDLINGEN VED VORE FØRSTE 800 TILFÆLDE AF LUPUS VULGARIS.

AF

NIELS R. FINSEN og H. FORCHHAMMER.

(Fortsættelse af: Om Anvendelse i Medicinen af koncentrerede kemiske Lysstraaler. Af NIELS R. FINSEN. Meddelelser fra F. m. L. IV, S. 1).

Ved en Sygdom som Lupus vulgaris, hvis Forløb er saa kronisk, og hvis Tendens til Recidiv er saa udpræget selv efter længere Tids tilsyneladende Helbredelse, maa man nødvendigvis væbne sig med stor Taalmodighed, naar man vil gøre Forsøg med en særlig Behandlingsmaade og drage tilforladelige Slutninger om dens Virkning.

Selv om man har et nok saa stort Materiale, faar Resultaterne først Værdi, naar man har fulgt Tilfældene i en vis Tid efter afsluttet Behandling. Vore Erfaringer, der nu omfatter c. 950 Lupustilfælde, som vi have fulgt med stor Opmærksomhed, have tilfulde bekræftet Umuligheden af at afgøre, om et tilsyneladende helbredet Tilfælde er definitivt helbredet, eller om der endnu findes usynlige Sygdomskim, der før eller senere kunne komme til Udbrud. Hvor lang Tids Observation man vil kræve, bliver ret vilkaarligt; praktisk set kan man dog nok slaa sig til Ro med et Par Aar, da Recidiverne efter saa lang Tid ere ret sjældne.

Ud fra disse Synspunkter, som allerede bleve antydede i

vor første Offentliggørelse i 1896, er det, at vi først nu, efter at Lysbehandlingen ved Lupus vulgaris har været anvendt i 7 Aar, fremlægger en detailleret Redegørelse for dens Resultater. Selvfølgelig have vi gentagne Gange offentliggjort Meddelelser om Methoden og dens Virkning; men vi have med Hensigt været meget varsomme med vore Udtalelser om de endelige Resultater; saaledes have vi saa vidt muligt undgaaet Udtrykket „helbredet" og have foretrukket Udtrykket „færdig med Hovedbehandlingen", for at antyde Muligheden af, at en „Efterbehandling" endnu kunde blive nødvendig. Vi have langt mere lagt Vægt paa, ved Hjælp af Billeder og ved Demonstration af behandlede Patienter at anskueliggøre Lysbehandlingens Virkning.

Vi have ikke sjældent — navnlig fra Udlandet — mødt Bebrejdelse for eller Forundring over, at vi endnu ikke have givet udførligere Beretning om vore Resultater; men vi have foretrukket at vente, til vort Materiale syntes os virkelig værdifuldt, og til vort eget Syn paa Methoden var klaret paa de væsenlige Punkter. Vi have kunnet handle uden Hastværk, da vi have arbejdet under gunstige ydre Vilkaar og med en stadig og rigelig Tilstrømning af Patienter; vi have desuden følt os særlig opfordrede til Forsigtighed, da det her ikke alene gjaldt en ny Behandlingsmaade for Lupus, men noget langt mere, nemlig Indførelsen af et helt nyt therapeutisk Agens: Lysets kemiske Straaler, ved Behandlingen af Hudsygdomme; vi maatte jo gaa ud fra, at der her var en særlig stor Skepsis at overvinde, og at det derfor var dobbelt vigtigt at føre et saa stringent Bevis som muligt.

Vor Redegørelse omfatter Lysinstitutets første 800 Tilfælde af Lupus vulgaris, indkomne til Behandling i de 6 Aar fra Novbr. 1895 til Novbr. 1901. Den Opgørelse, som ligger til Grund for Fremstillingen, er afsluttet 1. Oktober 1902, og Patienterne ere fulgte saa nær op til denne Dag som muligt. Selv de senest indkomne have altsaa været i Behandling eller Observation i næsten et Aar.

Bearbejdelsen af et saa stort Materiale frembyder selvfølgelig visse Vanskeligheder, særlig med Hensyn til Stoffets Begrænsning. Da det imidlertid ikke har været vor Hensigt at give en Monografi af Sygdommen, men kun en Fremstilling af Lysbehandlingens Resultater, have vi draget Grænserne for, hvad vi skulde medtage, hovedsagelig med dette for Øje. I den skematiske Fremstilling, som vi for Oversigtens Skyld have været nødt til at anvende, have vi foruden selve Lysbehandlingen og dens Resultater kun medtaget, hvad der paa en anskuelig Maade kunde tjene til at belyse og karakterisere det Patientmateriale, hvormed vi have arbejdet.

I Skemaet er for hver Patient anført 1) Løbenummeret, 2) Kønnet, 3) Alderen, 4) Sygdomsvarigheden, 5) Hudlidelsens Udbredning og Sæde, 6) dens Komplikation med Slimhindelupus, 7) Lysbehandlingen, naar den er begyndt, Antallet af Enkeltbehandlinger i hvert Aar, og naar den er afsluttet, samt endelig som den sidste og væsenligste Rubrik 8) Resultatet.

Som Supplement til denne kortfattede skematiske Fremstilling have vi tilføjet en Række mere udførlige Sygehistorier, først over 122 helbredede Patienter, som have holdt sig recidivfri i et Tidsrum af 2—5 Aar, dernæst over 13 helbredede Patienter, der ere døde indenfor de første 2 Aar efter Behandlingens Ophør. Det samlede Antal Sygehistorier bliver saaledes 135.

Til Slut er medtaget en Række Fotografier, ialt 49 Par, der alle ere udførte paa Institutet og fremstiller Patienten før

og efter Behandlingen. Ved Hjælp af disse Billeder har det været vor Hensigt at vise Behandlingens kosmetiske Resultater, der jo ikke kan anskueliggøres paa anden Maade. Vi have derfor ved Siden af helbredede Patienter medtaget nogle, som ikke ere fuldstændig helbredede, men som særlig tydelig illustrere, hvad Lysbehandlingen har formaaet at udrette.

Redegørelse for Skemaet.

I det følgende ville vi kort gøre Rede for de forskellige Rubrikker i vort Patientskema og belyser dem ved nogle talmæssige Opgørelser; lejlighedsvis ville vi tillige berøre enkelte af de Forhold, som vi ikke have kunnet medtage i den korte skematiske Fremstilling.

1) Løbenummeret.

I Skemaets første Rubrik er i fortløbende Række fra 1 til 800 opført de Numre, hvorunder Patienterne ere indførte i Lysinstitutets Hovedjournal.

Hvor dette Tal er trykt med fede Typer, betegner det en Henvisning til de udførligere Sygehistorier, medens en Stjerne foran Tallet gennem en Note under Siden henviser til Billedtavlerne.

2) Kønnet.

Dette er betegnet ved M (Mand) eller K (Kvinde). En Sammentælling viser, at Kvindekønnet er i stort Overtal, idet

Kvindernes Antal er 582 = 73 %,
Mændenes — 218 = 27 %.

3) Alderen.

Alderen er angivet i fyldte Aar; Fordeligen i de forskellige Aldersklasser er følgende:

Under 15 Aar	84		
15—25 —	273		
		under 25 Aar ialt 357 Tilfælde	= 45 %.
25—35 —	183		
35—45 —	122		
		25—45 Aar ialt 305 Tilfælde	= 38 %.
45—55 —	86		
55—65 —	38		
Over 65 —	14		
		over 45 Aar ialt 138 Tilfælde	= 17 %.

Som det ses, har vort Klientel omfattet alle Aldre fra Børn til Oldinge (den yngste Patient var ikke fyldt 1 Aar, den ældste var 74 Aar). Fordelingen er dog langtfra ligelig, saaledes er den egentlige Barnealder kun ret svagt repræsenteret, Ynglingealderen stærkest, hvorefter Tallet falder jævnt med Aarene. Hovedmængden, omtrent $^3/_4$ af Tilfældene, tilhører Alderen mellem 15 og 45 Aar.

4) Sygdomsvarigheden.

Denne er regnet fra Tidspunktet for Hudlidelsens Erkendelse, og i de talrige Tilfælde, hvor Sygdommen er begyndt som en Slimhindelidelse, er der ikke taget Hensyn hertil. Ved en Sygdom med et saa kronisk og snigende Forløb som Lupus bliver en Angivelse af Sygdomsvarigheden imidlerlid altid omtrentlig, og Tallene blive gennemgaaende for lave.

Gennemsnitstallet for den angivne Sygdomsvarighed i samtlige Tilfælde er ca. 11 Aar. En Sammentælling viser følgende Fordeling:

Sygdomsvarighed	under 2 Aar:	82	Tilfælde
—	2— 5 —	148	—
—	5—10 —	187	—
	Under 10 Aar ialt	417	Tilfælde = 52 %.

Sygdomsvarighed	10—15 Aar:	145	Tilfælde
—	15—20 —	95	—
—	20—30 —	90	—
—	30—40 —	36	—
—	40—50 —	12	—
—	Over 50 —	5	—

Over 10 Aar ialt 383 Tilfælde = 48 %.

Som det ses, er det forholdsvis faa Tilfælde, der ere komne under Lysbehandling hurtigt efter deres Opstaaen. Saa godt som alle vore Patienter have forud baaret paa deres Sygdom i en Aarrække. Selvfølgelig findes i vort Materiale en Del forsømte og slet behandlede Tilfælde, men til Gengæld ere mange i Aarevis behandlede paa forskellig Maade og med megen Energi, uden Resultat. En Redegørelse for den „tidligere Behandling" vilde frembyde megen Interesse; men Stoffet har været for overvældende til, at det kunde medtages i den skematiske Fremstilling; derimod er det omtalt i de udførligere Sygehistorier.

5) Hudlidelsens Udbredning og Sæde.

Vi have inddelt vore Tilfælde efter Størrelsen i 4 Grupper:

„Smaa"	=	indtil 2-Krone-store (ca. 10 cm.²)
„Middelstore"	=	— Kortblad-store (ca. 50 cm.²)
„Store"	=	— det dobbelte (ca. 100 cm.²)
„Meget udbredte"	=	over 100 cm.²

Denne Inddeling er valgt vilkaarlig med det praktiske Formaal at anvende almenkendte Størrelsesbegreber. Fordelingen indenfor Grupperne have vi kunnet udføre med ret stor Sikkerhed, idet vi i vore Sygejournaler have gennemført et nøjagtigt Maalesystem samt Fotografering af hver enkelt Patient. Ved en Sammentælling faa vi:

Smaa	Tilfælde.....	243
Middelstore	—	211
Mindre Tilfælde (under 50 cm.²)		454 = 57 %.
Store	Tilfælde..	186
Meget udbredte	— ..	160
Større Tilfælde (over 50 cm.²)		346 = 43 %.

Det kunde synes ensidigt kun at bedømme Tilfældene efter deres Udbredning i Fladen; men dels er det den eneste objektivt sikre Inddeling, dels er det et Forhold af den største Betydning for Lysbehandlingen, der kun kan ramme et begrænset Parti ad Gangen. Fuldt saa vigtig som Lidelsens Udbredning er dens Dybdeforhold, idet det er klart, at Lysets Indtrængen og Virkning maa vanskeliggøres ved en dyb Infiltration; men disse to Forhold følges i Reglen ad, saaledes at de mere begrænsede Tilfælde sædvanlig ere ret overfladiske, medens de mere udbredte tillige gaa dybere. I det Hele og Store afgiver Hudlidelsens Udbredning derfor et godt Holdepunkt for Bedømmelsen af Tilfældet, hvilket vi senere ved Omtalen af Resultaterne ville faa bekræftet.

De sædvanlige dermatologiske Inddelinger have kun ringe Værdi for vort Materiale med dets store Antal af invetererede Tilfælde, hvor det oprindelige Sygdomsbillede er mere eller mindre udvisket.

Den regionære Fordeling, som er medtaget i Skemaet, vilde det føre for vidt her at komme ind paa. Det skal kun nævnes, at Ansigtet har været angrebet i 760 Tilfælde = 95 %.

6) Slimhindelupus.

Denne er angivet ved sin Lokalisation; i de Tilfælde, hvor Slimhinderne ikke ere angrebne, er dette betegnet ved en Streg.

En Optælling viser en overordentlig Hyppighed for disse Lidelser, idet

Slimhindelidelse er paavist i 572 Tilfælde = 72 %.
— ikke — - 228 — = 28 %.

Hyppigst er Næsehulen angreben, dernæst Læber, Mund, Svælg og Strube. De sjældnere Tilfælde, hvor Øjets Slimhinder ere angrebne, ere ikke medtagne i Skemaet. Andre end de her nævnte Lokalisationer have vi ikke iagttaget.

Slimhindelidelserne maa her nøjes med en beskeden Plads som Komplikation til Hovedlidelsen. I Virkeligheden er Forholdet et helt andet, idet Sygdommen meget ofte begynder paa Slimhinderne og først sekundært angriber Huden; men vi maa i dette Arbejde give Afkald paa en nærmere Omtale af disse Forhold. Det samme gælder Spørgsmaalet om Sammentræffet mellem Lupus vulgaris og andre tuberkuløse Lidelser. Kun for Lungetuberkulosen have vi gjort en Undtagelse paa Grund af dens Betydning for Behandlingens Resultater, og i Rubriken „Resultatet" vil man finde tilføjet Tb. pulm. i alle de Tilfælde, hvor vi have fundet stethoskopiske Tegn paa Lungetuberkulose. Ved en Sammentælling ses, at

Lungetuberkulose er fundet i 125 Tilfælde = 16 %.

7) Behandlingen.

Vi have i Skemaet kun medtaget selve Lysbehandlingen. For hver Patient findes anført Datum for Behandlingens Begyndelse, Antallet af Séancer samt Datum for den sidste Behandling; hvor der i Skemaet staar en Streg i Stedet for denne sidste Dato, betyder det, at Patienten er bleven behandlet i Tiden efter 31. Decbr. 1901. Det opførte Séancetal bliver saaledes for lavt for de Patienter, hvis Behandling er fortsat, event. afsluttet i Aaret 1902.

Om Lysbehandlingen skal vi, da Skemaet kun giver Oplysning om Séancernes Antal, endnu tilføje nogle Bemærkninger.

Til Behandlingen er anvendt dels Sollys, dels elektrisk Lys.

Solbehandlingen har kun fundet Sted om Sommeren og kun paa vore forholdsvis faa, klare Solskinsdage; den blev meget anvendt i de første Aar, men er i de senere Aar næsten helt forladt, da vi regne den for betydelig mindre virksom end vor nuværende Behandling med elektrisk Lys.

Behandlingen med elektrisk Lys har i Aarenes Løb undergaaet stadige Forbedringer. Det meget vigtige Spørgsmaal om Betydningen af Lysstyrken vil vi senere komme nærmere ind paa. Den væsenligste og betydningsfuldeste Forbedring, Indførelsen af Bjergkrystallinser i Stedet for Glas, og den samtidige Indførelse af Vandafkøling af Trykglassene, hvorved det blev muligt at anvende dobbelt saa stærkt Lys som tidligere, fandt Sted i Forsommeren 1898, omtrent da vi vare ved Patient Nr. 140.

Anden dermatologisk Behandling har ved Siden af Lysbehandlingen kun været af underordnet Betydning. I den første Tid, indtil Foraaret 1898 holdtes Lysbehandlingen absolut ren, da det jo gjaldt om at undersøge Virkningen af et helt nyt therapeutisk Middel. Senere have vi lejlighedsvis taget andre Metoder til Hjælp for at fremskynde Helbredelsen.

De Behandlingsmaader, vi hyppigst have benyttet, ere følgende:

Besnier's Pyrogallussalve, som er benyttet ialt i 223 Tilfælde, hvoraf kun 8 smaa og 37 middelstore, derimod 75 store og 103 meget udbredte; den er benyttet som forberedende Kur ved dybt infiltrerede og, som man ser, hovedsagelig store Tilfælde.

Udskrabning med paafølgende Brænding ad mod. Paquelin er af og til anvendt, navnlig ved Hypertrofi med Ulceration

af Læberne. Galvanopunktur er hyppigt anvendt ved isolerede, dybe og ganske smaa Knuder.

Endelig maa det bemærkes, at, da Bjergkrystallinserne bleve indførte, blev Lysreaktionen saa stærk med Exsudation og Vesikeldannelse, at det blev nødvendigt at anlægge Forbindinger for at undgaa Forurening; hertil er væsenlig anvendt indifferente Salver eller Omslag.

Almenbehandlingen spiller selvfølgelig en Rolle ved en tuberkuløs Lidelse som Lupus vulgaris. Det maa derfor udtrykkelig fremhæves, at de fleste af vore Patienter under Behandlingen — som udelukkende er ambulatorisk — have levet under ganske tarvelige Vilkaar. Efter Evne have vi forsøgt at raade Bod herpaa ved til de slettest ernærede Patienter gratis at uddele Mælk, Hæmatinalbumin m. m., ligesom der i Institutets Have er bygget en lille Liggehal til Sommerbrug.

Slimhindebehandlingen er ligeledes ganske forbigaaet i vort Skema. I nogle Tilfælde — paa Læber, Tandkød og Tunge — have vi med Held anvendt Lysbehandling; men iøvrigt have vi maattet ty til andre Midler. Vi lægge den største Vægt paa Behandlingen af Slimhindelidelserne og have i det hele gode Resultater deraf. De Midler, vi med mest Held have anvendt, er Galvanopunktur og Pensling med en stærk Jod-Jodkaliumsopløsning (1 Del Jod, 2 Dele Jodkalium og 2 Dele Vand) efter forudgaaende Cocainisering; desuden omhyggelig Renselse ved Udskylning, i Næsen dog hellere Tampons, dyppede i Sublimatopløsning ($1^0/_{00}$).

8) Resultatet.

Ved en saa haardnakket Sygdom som Lupus har „Udskrivningsresultatet“ efter en instituteret Behandling kun en forholdsvis ringe Betydning; thi selv om der paa dette Tidspunkt ikke er synlige Sygdomstegn, kan der, som vi ovenfor have fremhævet, meget vel være skjulte Foci, som før eller

senere kunne komme til Udbrud. Dette gælder selvfølgelig for Lysbehandling som for enhver anden Behandling. Vi udskrive derfor aldrig vore Patienter som „helbredede", men forberede dem paa Sandsynligheden af ny Udbrud, der kræve „Efterbehandling"; og vi sætte os det som Maal, at holde Øje med dem saa længe som muligt.

De Resultater, som vi have opstillet, betyde saaledes ikke Udskrivningsresultater, men maa heller ikke paa nogen Maade betragtes som definitive Resultater; de ere kun en Oplysning om Patienternes Tilstand ved sidste Observation (eller Meddelelse) før Opgørelsen, der er sluttet den 1. Oktober 1902.

Vi have i Skemaet benyttet os af følgende Udtryk:

1) Helbredet, der altsaa maa forstaas med al Reservation, og kun betegner, at der i saa og saa lang Tid ikke har været synlige Sygdomstegn. For de Tilfælde, hvor denne Observationstid har varet to Aar og derover, er tilføjet en Henvisning til de lidt udførligere specielle Sygehistorier (Side 107), medens en Stjerne føjet til Ordet „Helbredet" betegner en Observationstid under to Aar.

2) Næsten helbredet betegner saadanne Tilfælde, hvor der endnu er Sygdomstegn, men kun som ubetydelige Rester, og hvor Udsigten til fuldstændig Helbredelse er god.

3) Partielt helbredet og 4) Væsentlig bedret betegner saadanne Tilfælde, hvor Virkningen er ubetinget gunstig, men hvor Udsigterne til fuldstændig Helbredelse ere mindre gode.

5) Forbigaaende Bedring og 6) Ringe Paavirkning behøve ingen nærmere Forklaring, de omfatte Tilfælde, hvor Lysvirkningen har været mindre gunstig, men hvor Behandlingen endnu fortsættes, enten fordi Haabet om Helbredelse ikke helt er opgivet, eller fordi Lysbehandlingen dog kan hindre Sygdommens videre Udbredning.

7) U. K. (Ufuldendt Kur) betegner de Tilfælde, hvor Behandlingen er afbrudt, paa Grund af negativt Resultat, eller Død, eller Sygdom, eller fordi Patienten af en eller anden Grund er udebleven.

Foruden disse Hovedbetegnelser er der under Rubriken „Resultat" opført enkelte smaa Oplysninger, saavidt Pladsen har tilladt det. Blandt andet er det, som tidligere nævnt, anført, naar Patienten samtidig har haft en Lungetuberkulose.

Patientmaterialet.

Inden vi gaar over til den nærmere Redegørelse for Resultaterne, maa vi med nogle Ord belyse vort Patientmateriale.

Med Hensyn til dette maa vi bemærke, at det ikke bestaar af særlig udvalgte Tilfælde, idet vi principmæssigt have optaget alle de Lupuspatienter, som have henvendt sig til os, fra de ganske smaa og friske Tilfælde til de mest udbredte og invetererede, saadanne, der aldrig før have været behandlede, og saadanne, der i Aartier forgæves have prøvet alle mulige Behandlingsmethoder og været betragtede som uhelbredelige. I de 7 Aar, vi have arbejdet med denne Behandling, have vi kun afvist nogle enkelte Patienter, hvis Tilstand af andre Grunde syntes ganske haabløs.

Hovedparten af vore Patienter har været danske, nemlig 676 mod 124 Udlændinge. De danske Patienter ere komne fra hele Landet, og langt største Parten tilhører de ubemidlede Klasser — lige ned til Fattiggaardenes Beboere. Mellem Udlændingene findes vel en Del mere velhavende Patienter, men største Delen hører dog til Almuen i vore Nabolande, Nordslesvig, Norge og Sverrig, saa at der ikke derved sker nogen væsenlig Forskydning i social Henseende.

Af det her meddelte sammenholdt med de Oplysninger, Skemaet giver, kan man i al Korthed udkaste følgende Billede af vort Klientel:

Langt største Parten tilhører de ubemidlede Klasser, omend ogsaa andre Samfundslag ere repræsenterede.

Vi have haft alle Aldre, fra spæde Børn til Oldinge, flest dog i Ungdommen og de kraftige Aar.

Hvad selve Sygdommen angaar, er Billedet af den alvorligste Art:

Sygdomsvarigheden var gennemsnitlig 11 Aar; omtrent Halvdelen af samtlige Tilfælde — 383 af 800 — havde bestaaet i over 10 Aar, og kun en lille Brøkdel — 82 — vare komne i de første 2 Aar efter Sygdommens Udbrud.

Henimod Halvdelen — 343 af 800 — var i Udstrækning over 50 cm.^{2} og deraf var igen 159 mindst dobbelt saa udbredte.

Ansigtet var angrebet i det store Flertal af Tilfælde — 760 af 800 — og i nøje Sammenhæng hermed staar det, at Slimhindelidelserne i Næse, Mund, Svælg og Strube have været saa hyppige — i 572 af 800 Tilfælde.

Da vor Redegørelse omfatter et Tidsrum af ca. 6 Aar, kan det have sin Interesse at se, hvorvidt vort Klientel i Tidens Løb har forandret sit Præg. Med dette for Øje have vi inddelt vore 800 Tilfælde i 8 Grupper paa 100 hver. Som anført i efterfølgende Tabel spænder den første Gruppe over et Tidsrum paa henimod $2^1/_2$ Aar, medens hver af de følgende paa det nærmeste omfatter $^1/_2$ Aar.

I Tabellen have vi for hver af disse 8 Grupper fremstillet Fordelingen henholdsvis efter Patienternes Køn og Alder, og efter Sygdommens Varighed og Udbredning.

Som Tabellen viser, har Fordelingen af vore Tilfælde efter Køn og Alder holdt sig temmelig ensartet gennem de

Optagelsesdato: / Løbenummer:	$^{20}/_{11}$ 95-$^{11}/_{2}$96 1—100	$-^{15}/_{9}$ 98 101—200	$-^{17}/_{4}$ 99 201—300	$-^{2}/_{9}$ 99 301—400	$-^{23}/_{3}$ 1900 401—500	$-^{1}/_{10}$ 00 501—600	$-^{20}/_{4}$ 01 601—700	$-^{21}/_{11}$ 01 701—800	Ialt
Fordeling efter Pt. Køn:									
Mænd	34	23	30	26	25	27	28	25	218 = 27 %
Kvinder	66	77	70	74	75	73	72	75	582 = 73 %
Fordeling efter Pt. Alder:									
Under 15 Aar	11	8	13	11	8	12	9	12	84 = 11 %
15 - 25 -	42	37	41	32	33	34	29	35	283 = 35 %
25—45 -	35	39	33	37	37	36	43	35	295 = 37 %
Over 45 -	12	16	13	20	22	18	19	18	138 = 17 %
Ford. e. Sygdomsvarigh.:									
Under 2 Aar	2	7	9	5	10	15	13	21	82 = 10 %
2—10 -	47	46	40	47	39	50	37	29	335 = 42 %
10—20 -	32	35	32	28	34	24	28	27	240 = 30 %
Over 20 -	19	12	19	20	17	11	22	23	143 = 18 %
Fordeling e. Hudlidelsen:									
Smaa	27	26	19	32	29	41	27	43	244 = 30 %
Middelstore	20	22	33	27	31	25	26	29	213 = 27 %
Store	32	28	21	18	21	22	27	15	184 = 23 %
Meget udbredte	21	24	27	23	19	12	20	13	159 = 20 %

forløbne Aar. Derimod er der for selve Hudlidelsens Vedkommende en tydelig Forandring at iagttage.

Hvad Sygdomsvarigheden angaar, se vi, at Antallet af de invetererede Tilfælde, der have varet i 10—20 Aar eller mere, har holdt sig ret konstant. Indenfor de „friskere" Tilfælde er der imidlertid en Forskydning, der viser sig ved en kendelig og glædelig Tiltagen af Tallet paa de Tilfælde, der ere komne til Behandling i Løbet af de 2 første Sygdomsaar.

Mest udtalt er Forskellen dog, naar man ser paa Hudlidelsens Udbredning, idet der er en betydelig Tiltagen af de „mindre" og tilsvarende Aftagen af de „større" Tilfælde. Samle vi Tilfældene, saa at vi stille de 400 første (Nr. 1—400) op imod de 400 sidste (Nr. 401—800), finde vi

Nr. 1—400: 104 smaa, 102 middelst., 99 st. og 95 m. udbr.
- 401—800: 140 „ 111 „ 85 „ - 64 „

Man kunde vel have ventet at finde en endnu større Forandring i Patientmaterialet, da Flertallet af vore Patienter er fra Danmark, hvor Antallet af gamle Lupustilfælde engang maa slippe op. Ved at udskyde de udenlandske Patienter have vi ogsaa fundet, at den Forskydning i Retning af Forøgelse af de friskere og mindre udbredte Tilfælde, som det samlede Materiale udviser, bliver noget stærkere udtalt.

Lysbehandlingens Resultater.

Vi gaa nu over til det, vi i Indledningen have fremsat som vort Hovedformaal, at give en Fremstilling af de Resultater, der ere opnaaede ved Lysbehandlingen af vore 800 Tilfælde; tillige ville vi søge at bestemme, hvilken Indflydelse de forskellige Forhold, vi i det foregaaende have omtalt, have udøvet paa disse Resultater.

Idet vi begynde med en simpel Optælling efter de i Skemaerne opførte Betegnelser, for hvilke vi tidligere have gjort Rede, ville vi for at lette Oversigten samle dem i 5 Grupper, hvoraf Gruppe I omfatter de Tilfælde, der ved Opgørelsen vare tilsyneladende helbredede, Gruppe II dem, der skønnedes at have nær Udsigt til Helbredelse, Gruppe III dem, der vel ere absolut gunstigt paavirkede, men hvor Udsigten til fuldstændig Helbredelse er tvivlsom, Gruppe IV dem, for hvilke Lysbehandlingens Virkning har været ufyldestgørende, og Gruppe V omfatter dem, der ere døde eller have opgivet Behandlingen af Aarsager, der ikke kan lægges Methoden til Last.

Af vore 800 Tilfælde var ved Opgørelsen:

I.	Tilsyneladende helbredede	407	= 51 %.
	Deraf a) recidivfri i 2—6 Aar	122	
	b) Observation under 2 Aar..	285	
II.	Næsten helbredede	193	= 24 %.
III.	Væsentlig bedrede	89	= 11 %.
	Deraf a) „Partielt helbredede“	24	
	b) „Væsentlig bedrede“	65	
IV.	Ufyldestgørende paavirkede	40	= 5 %.
	Deraf a) „Forbigaaende Bedring“...	14	
	b) „Ringe Paavirkning“	12	
	c) „U. K. — Negativt Resultat“	14	
V.	Tabte	71	= 9 %.
	Deraf a) „U. K. — Død“	33	
	b) „U. K. — Sygdom“	13	
	c) „U. K. — Udeblevne“....	25	

Altsaa ialt: Helbredede 407, endnu under Behandling 308 og Behandlingen afbrudt (U. K.) 85.

Det falder straks i Øjnene, at Lysets gunstige

Virkning har været paafaldende konstant. For at vise dette talmæssigt maa vi se bort fra Gruppe V. Af de resterende 729 Tilfælde ere de 3 første Grupper med tilsammen 689 Tilfælde eller 94 % alle ubetinget gunstigt paavirkede, medens kun de 40 Tilfælde i 4. Gruppe, ialt 6 %, have haft ingen eller ringe Nytte af Lysbehandlingen.

I Tilslutning hertil maa vi nævne, at Lysbehandlingen ikke følges af skadelige Bivirkninger og aldrig giver Substanstab. Dette giver saavel Læger som Patienter en Følelse af Tryghed, der er af stor Værdi, og af mange Patienter føles som en velgørende Modsætning til, hvad de tidligere have gennemgaaet. Heri maa vel ogsaa søges en af Grundene til, at Antallet af dem, der ikke have gennemført Kuren (U. K. — Udeblevne), er saa overordentlig ringe, 25 = 3 %.

Vi ville dernæst nærmere undersøge de opnaaede Resultater, idet vi kort gennemgaa hver enkelt af de ovenfor opstillede Grupper.

I. Tilsyneladende helbredede.

Denne Gruppe omfatter ialt 407 Tilfælde, der ved Opgørelsen ikke frembød Sygdomstegn. Det er altsaa lidt over Halvdelen af samtlige Tilfælde, det er lykkedes os at føre saa vidt.

For Spørgsmaalet om definitiv Helbredelse er det selvfølgelig af Betydning, hvor lang Tid disse 407 Patienter have været recidivfri, og ved en Optælling vil man finde følgende Fordeling:

Recidivfri i over 4 Aar:	15.
— - 3—4 —:	48.
— - 2—3 —:	59.
— - $^3/_4$—2 —:	205.
Behandlede efter $^{31}/_{12}$ 1901:	80.

Som tidligere nævnt, have vi sat en Grænse ved 2 Aars Observationstid, og for de Patienter, der have været recidivfri i over 2 Aar — ialt 122 — have vi i et særligt Afsnit meddelt mere udførlige Sygehistorier. Hertil er endnu føjet 13 Sygehistorier over helbredede Patienter, der ere døde i Løbet af de første 2 Aar efter Behandlingens Ophør (disse Tilfælde ere i Skemaet betegnede ved „Helbredet * Død“). Observationstiden var for disses Vedkommende i 5 Tilfælde 1—1½ Aar, i 7 Tilfælde ½—1 Aar og i 1 Tilfælde under ½ Aar.

Naar vi opstille disse 407 Helbredede efter Alder og efter Sygdommens Varighed og Udbredning, finde vi følgende Fordeling:

Patienternes Alder.....	Under 15 Aar	52	=	12,5 %.
	15—25 —	161	=	40 %.
	25—45 —	151	=	37 %.
	Over 45 —	43	=	10,5 %.
Sygdomsvarigheden	Under 2 Aar	54	=	13 %.
	2—10 —	189	=	47 %.
	10—20 —	111	=	27 %.
	Over 20 —	53	=	13 %.
Hudlid. Udbredning	Smaa	Tilf. 179	=	44 %.
	Middelstore	— 123	=	30 %.
	Store	— 68	=	17 %.
	Meget udbredte	— 37	=	9 %.

Vi finde her det samme brogede Billede af alle Aldersklasser og Sygdomsgrader som i det samlede Materiale (se Tabellen Side 20). Dog vil man ved en Sammenligning se, at de friskere og mindre udbredte Tilfælde ere i Overvægt, medens det, som rimeligt er, er forholdsvis færre af de udbredte og invetererede Tilfælde, som det er lykkedes os at helbrede.

De Tal, som vi her møde, vise bedre end en lang Beskrivelse Lysmethodens Ydeevne. Af de Helbredede have 105 været store og meget udbredte Tilfælde; og 164 af Patienterne have haft deres Sygdom i over 10 Aar. Følgende Tabel viser den nærmere Fordeling:

Sygdomsvarighed	10—20 Aar....	111.
—	20—30 —	37.
—	30—40 —	13.
—	Over 40 —	3.

Vi skal endnu tilføje, at Slimhindelidelse findes lige saa hyppigt som i det samlede Materiale, nemlig i 293 Tilfælde (72 %), medens Lungetuberkulosen kun er fundet hos 39 af de Helbredte = 10 % (i det samlede Materiale var Tallet 16 %).

II. Næsten helbredede.

Denne Gruppe omfatter 193 Tilfælde, der ved Opgørelsen ikke helt vare færdige med Behandlingen, men som syntes Helbredelse nær. Her findes væsenlig saadanne Tilfælde, der af en eller anden Grund have været vanskelige og krævet en særlig langvarig Behandling.

Naar vi opstiller disse 193 Tilfælde efter Patienternes Alder og efter Sygdommens Varighed og Udbredning, finder vi følgende Forhold:

Patienternes Alder.....	Under 15 Aar	12	= 6 %.
	15—25 —	65	= 34 %.
	25—45 —	77	= 40 %.
	Over 45 —	39	= 20 %.
Sygdomsvarigheden....	Under 2 Aar	15	= 8 %.
	2—10 —	73	= 38 %.
	10—20 —	62	= 32 %.
	Over 20 —	43	= 22 %.

Hudlid. Udbredning....	Smaa	Tilfælde 30	= 16 %.
	Middelstore	— 56	= 29 %.
	Store	— 55	= 28 %.
	Meget udbredte	— 52	= 27 %.

Sammenholde vi disse Tal med de tilsvarende for de helbredte Patienter, se vi, at de ældre Aldersklasser og de udbredte og invetererede Tilfælde ere forholdsvis stærkt repræsenterede i denne Gruppe. — Slimhindelidelse findes i omtrent samme Forhold som i det samlede Materiale, nemlig i 143 Tilfælde (74 %), og det samme gælder Lungetuberkulosen, der er paavist i 33 Tilfælde (17 %).

Vi se altsaa, at Vanskeligheden for Behandlingen staar i et vist Forhold til Hudlidelsens Udbredning og Varighed. I en Del Tilfælde — og dette gælder navnlig de mindre udbredte — kunne vi imidlertid ogsaa paavise andre Grunde: saaledes har i 46 Tilfælde en uregelmæssig Behandling været medvirkende Aarsag, enten det nu skyldes Mangel paa Evne eller paa Vilje hos Patienten til at gennemføre Behandlingen med Energi. I 17 Tilfælde har en ondartet Slimhindelidelse givet Anledning til gentagne Udbrud og derved sinket Helbredelsen, i 18 Tilfælde endelig er Behandlingen ophørt, fordi Patienterne vare tilfredse med den opnaaede relative Helbredelse, eller fordi de foretrak at fortsætte Lysbehandligen i deres Hjemland.

III. Væsenlig bedrede.

Denne Gruppe omfatter 24 Partielt helbredede og 65 Væsenlig bedrede, ialt 89 Tilfælde, hvor Lysbehandlingen har haft en ubetinget gunstig Virkning, men hvor Udsigten til Helbredelse var mere tvivlsom. Her findes i endnu mere

udpræget Grad end i forrige Gruppe vore vanskelige og haardnakkede Tilfælde.

Naar vi opstille disse 89 Tilfælde efter Patienternes Alder og efter Sygdommens Varighed og Udbredning, finde vi følgende Forhold:

Patienternes Alder	Under 15 Aar	13	=	15 %.
	15—25 —	24	=	27 %.
	25—45 —	27	=	30 %.
	Over 45 —	25	=	28 %.
Sygdomsvarigheden	Under 2 Aar	4	=	5 %.
	2—10 —	33	=	37 %.
	10—20 —	27	=	30 %.
	Over 20 —	25	=	28 %.
Hudlid. Udbredning....	Smaa	Tilfælde 7	=	8 %.
	Middelstore	— 11	=	12 %.
	Store	— 32	=	36 %.
	Meget udbredte	— 39	=	44 %.

Sammenholde vi disse Tal med de tilsvarende for de foregaaende Grupper, finder vi en Overvægt for de ældre Aldersklasser og endnu mere iøjnefaldende for de udbredte og invetererede Tilfælde. Vi skal tilføje, at Slimhindelidelserne ere noget sjældnere — 60 Tilfælde = 67 % —, Lungetuberkulosen en Del hyppigere — 20 Tilfælde = 23 % — end i det samlede Materiale.

Vi se her tydelig, hvilken Betydning Hudlidelsens Udbredning har, idet det store Flertal indenfor denne Gruppe bestaar af store Tilfælde, der trods langvarig Behandling ikke have opnaaet Helbredelse. For de flestes Vedkommende er Udsigten til fuldstændig Helbredelse kun ringe, deres Sygdom

er saa vidt fremskreden, at de maa betragtes som Invalider. For disse Stakler, hvis Ansigt i Reglen er stærkt vansiret, frembyder Lysbehandlingen dog den store Fordel, at den næsten altid kan hindre Sygdommens videre Udbredning, og ofte kan bedre Tilstanden saa meget, at de kan føre en nogenlunde menneskelig Tilværelse og helt eller delvis udnytte deres Arbejdsevne.

For de faa mindre udbredte Tilfælde, der falder under denne Gruppe, kan i Reglen paavises særlige Grunde til, at Behandlingen er trukket i Langdrag, enten en uregelmæssig Behandling eller en ondartet Slimhindelidelse.

IV. Ufyldestgørende paavirkede.

Denne Gruppe omfatter ialt 40 Tilfælde, hvoraf 14 ere betegnede ved „Forbigaaende Bedring", 12 ved „Ringe Paavirkning", medens 14 have afbrudt Behandlingen („U. K. — Negativt Resultat").

Det fortjener at fremhæves, hvor smaa disse Tal ere — ialt kun 5 % af samtlige Tilfælde — og særlig, hvor faa Patienter, 14 = 2 %, der har maattet opgive Behandlingen paa Grund af for daarligt Resultat.

Forbigaaende Bedring: De her henførte 14 Tilfælde maa omtales for sig. De ere alle blevne bedrede ved Lysbehandlingen, men Sygdommen er hurtig brudt ud igen; ofte er det Gang paa Gang lykkedes at opnaa en tilsyneladende Helbredelse, men kun forbigaaende. Flertallet af disse Tilfælde — 11 af 14 — have været lidet udbredte og tilsyneladende ret gunstige Tilfælde.

Aarsagen til Recidiverne har i de fleste Tilfælde været ondartede Slimhindelidelser, som det ikke er lykkedes os at faa Bugt med (se Patient Nr. 17, 100, 138, 351, 364, 376, 450, 557), i et enkelt Tilfælde drejer det sig om Pauperisme, hvor Reci-

diverne ere komne i Tilslutning til gentagne akute Sygdomme (Nr. 288); men i de øvrige 5 Tilfælde have vi ikke kunnet paavise nogen særlig Aarsag til, at Sygdommen ikke har kunnet helbredes (Nr. 93, 112, 142, 153, 332).

Ringe Paavirkning og negativt Resultat. Herhen hører ialt 26 Tilfælde. Flertallet af disse Tilfælde, hvor Lysbehandlingen helt har svigtet, var særlig karakteriseret ved Lidelsens enorme Udbredning og den dybe Infiltration i Vævene (Nr. 4, 21, 23, 37, 47, 63, 109, 151, 186, 214, 223, 317, 340, 420, 685), men tilbage blive dog 11 Tilfælde af ringe Udstrækning, hvor vi ikke have kunnet paavise nogen særlig Aarsag til den ringe Virkning (Nr. 8, 69, 114, 146, 193, 305, 343, 458, 480, 498, 679).

Af de herhen hørende 26 Tilfælde ere 12 opførte under Betegnelsen „Ringe Paavirkning", medens 14 betegnes med „U. K. Negativt Resultat". Medens Virkningen paa disse Patienter har været omtrent ens, er Forskellen den, at de sidste 14 have opgivet Behandlingen, medens de første 12 endnu ere eller af og til komme under Behandling, fordi Lysbehandlingen dog kan hindre den videre Udbredning af Sygdommen og bedre Tilstanden noget.

Det kan her nævnes, at et forholdsvis stort Antal af disse daarlige Resultater falder paa Institutets første Tid, da Lysapparaterne vare svagere og Behandlingen i det hele mere famlende end senere. Denne „Forsøgstid" regne vi til Sommeren 1898, og herunder høre vore første 140 Patienter. Som det kan ses af de anførte Numre falder ikke mindre end 15 af denne Gruppes 40 Patienter indenfor Forsøgstiden.

V. Tabte.

Denne Gruppe omfatter ialt 71 Tilfælde, hvor Behandlingen er afbrudt af Grunde, der ikke kan regnes Metoden

til Last. I 46 af disse Tilfælde har Aarsagen været alvorlig Sygdom, der i 33 Tilfælde har haft dødelig Udgang til Følge, i 25 Tilfælde har der været anden Aarsag.

Lysbehandlingen har i de fleste af disse Tilfælde haft en gunstig Virkning. Ved et Gennemsyn af de enkelte Tilfælde vil man først finde 11 Tilfælde, hvor Behandlingen har været saa kort, at der ikke kan tales om nogen Virkning; af de øvrige 60 Tilfælde vare:

14 næsten helbredede,
35 væsenlig bedrede,
11 lidet paavirkede; af disse 11 Patienter vare 6 lidende af alvorlig Lungetuberkulose.

Ved U. K. Død og U. K. Sygdom er betegnet henholdsvis 33 og 13 Patienter, eller ialt 46. Som Aarsag indtager Lungetuberkulosen, som rimeligt er, den første Plads med 27 Tilfælde, hvoraf 21 døde; af de 27 Tilfælde falde 13 paa unge Mennesker under 25 Aar, der alle ere døde. Af andre Dødsaarsager, der er optraadt med nogen Hyppighed, kan nævnes Morbus cordis og Cancer, hver med 4 Tilfælde.

Det er naturligt, at der i denne Gruppe findes en Del ældre Individer — af de 46 vare 15 over 45 Aar gamle; ligeledes ere de store og invetererede Tilfælde i betydelig Overvægt.

Her skal endnu tilføjes, at der mellem de „Helbredede“ Patienter findes 15, der ere døde efter afsluttet Behandling (se Sygehistorie Nr. 47, 59 og 123—135). Dødsaarsagen var i 7 af disse Tilfælde intern Tuberkulose.

Ialt ere saaledes af vore 800 Patienter 58 afgaaede ved Døden, deraf 28 af intern Tuberkulose.

Ved U. K. Udebleven er betegnet 25 Patienter, der have opgivet Behandlingen, forinden et fuldt tilfredsstillende

Resultat var naaet. 5 af disse Patienter have forladt Institutet efter faa Timers Behandling uden at angive nogen Grund (Nr. 205, 397, 428, 457, 608). — I 10 Tilfælde er det Ligegyldighed og Mangel paa Energi hos Patienten selv, der har faaet dem til at holde op (Nr. 53, 57, 157, 168, 229, 255, 260, 284, 384, 501). — Endelig i 10 Tilfælde har økonomiske Vanskeligheder hindret Behandlingens Gennemførelse til Trods for, at Behandlingen er givet dem uden Vederlag (Nr. 10, 12, 166, 226, 281, 315, 339, 348, 336, 472). Dette Tal maa siges at være forbavsende ringe, under Hensyn til, at langt største Delen af vore Patienter tilhører de ubemidlede Samfundslag.

Hvilke Forhold have Betydning for Resultaterne?

Vi have i det foregaaende omtalt nogle af de Vanskeligheder, der have mødt os ved Behandlingen af vore Lupuspatienter; vi have set, at der var nogle Tilfælde, der trodsede Behandlingen, uden at man kunde paavise nogen særlig Grund dertil, men tillige, at disse Tilfælde vare paafaldende faa. Denne meget konstante Virkning af Lysbehandlingen ved Lupus have vi en Gang tidligere udtrykt med de Ord, at naar et Tilfælde af Lupus ikke paavirkes gunstigt af Lyset, kan man næsten fristes til at tvivle om Diagnosens Rigtighed. Skøndt denne Udtalelse er meget stærk, vil man dog af det foregaaende have set, at den ikke savner en vis Ret.

Af de Forhold, der have Indflydelse paa Resultaterne, er der intet, der paa langt nær har den Betydning som Hudlidelsens Udbredning og den ofte dermed følgende dybe Indtrængen i Vævene. Inden vi dog gaa over til en nærmere Redegørelse af dette Forhold, ville vi i al Korthed omtale de forskellige andre, mere eller mindre vigtige Momenter, som kunne faa Betydning for Resultaterne.

Patienternes Almentilstand eller Ernæringstilstand spiller som bekendt en ikke ringe Rolle ved Lupus, som ved

andre tuberkuløse Lidelser, og at Lysbehandlingens Resultater paavirkes uheldigt af Pauperisme og daarlige Ernæringsforhold, have vi ofte haft Lejlighed til at iagttage.

Samtidig Lungetuberkulose, som vi have kunnet paavise i 125 Tilfælde eller 16 % af samtlige 800, maa selvfølgelig betragtes som en uheldig Komplikation, og denne Sygdom har bevirket 28 Dødsfald. Største Parten af vore Tilfælde have imidlertid været ret godartede, og nogen større uheldig Indvirkning af denne Sygdom paa Hudlidelsens Helbredelse have vi ikke kunnet paavise talmæssigt.

Slimhindelupus have vi, som tidligere nævnt, fundet i 572 Tilfælde eller 72 % af samtlige 800. Vi skulle i dette Arbejde ikke komme nærmere ind paa denne meget alvorlige Lidelse, da den i de fleste Tilfælde ikke kan underkastes Lysbehandling. Vi skulle kun nævne, at Behandlingen kræver megen Omhu og Taalmodighed; sædvanlig vil man da ogsaa kunne opnaa en Helbredelse; men som vi paa flere Steder i det foregaaende have nævnt, og som vi senere ville se, er det meget hyppigt, at en ondartet Slimhindelidelse Gang paa Gang har ført til kutane Udbrud, og derved forsinket eller helt umuliggjort Helbredelsen af Hudlidelsen.

Sygdomsvarighedens Betydning for Helbredelsen beror væsenlig derpaa, at Hudlidelsen sædvanlig i Aarenes Løb tiltager jævnt i Udbredning, saa at de friske Tilfælde tillige oftest ere smaa, de invetererede tillige udbredte. Vi kunne saaledes nævne, at af de 82 Tilfælde paa under 2 Aars Varighed vare 60 smaa, 19 middelstore og kun 3 store, medens der mellem de 143 Tilfælde af over 20 Aars Varighed kun fandtes 14 smaa og 30 middelstore, derimod 46 store og 53 meget udbredte. — Ved nærmere at undersøge Sygdomsvarighedens Betydning i Tilfælde af samme Størrelse have vi fundet, at Resultaterne af Lysbehandlingen ere noget bedre for de friske end for de gamle. Dog skulle vi bemærke,

at saadanne Tilfælde, som i kort Tid opnaar en stor Udbredning, sædvanlig have en daarlig Prognose.

Ved at undersøge Alderens Indflydelse ved iøvrigt ensartede Tilfælde have vi fundet, at Chancerne for Helbredelse have været omtrent ens, naar Patienterne vare under 45 Aar, medens Forholdene have været noget ugunstigere for ældre Patienter.

Hudlidelsens Udbredning er som nævnt det Forhold, der har størst Betydning for Behandlingen og dens Resultater, saa at man sædvanlig kan sige, at jo mere udbredt Lidelsen er, des langvarigere er Behandlingen og des tvivlsommere Resultatet. Dette fremgaar tydeligt af nedenstaaende Tabel, hvor Tilfældene ere delte efter deres Udbredning og derefter atter i de forskellige Grupper, der betegne Resultaterne, med Tilføjelse af en procentisk Udregning.

Lidelsens Udbredn. Antal Tilfælde	Smaa 244	Middelstore 213	Store 184	Udbredte 159
I. Helbr. . . .	179 = 73 %	123 = 58 %	68 = 37 %	37 = 23 %
II. Næst. h. . .	30 = 12 %	56 = 26 %	55 = 30 %	52 = 33 %
III. Bedrede . .	7 = 3 %	11 = 5 %	32 = 17 %	39 = 25 %
IV. Ugunstige.	14 = 6 %	8 = 4 %	5 = 3 %	13 = 8 %
V. Tabte	14 = 6 %	15 = 7 %	24 = 13 %	18 = 11 %

Forskellen bliver mest iøjnefaldende, hvis vi sammenligne de to Yderpunkter, de smaa og de meget udbredte Tilfælde. Medens 73 % af de smaa ere helbredede, er kun 23 % af de udbredte naaede saa vidt; denne Forskel udjævnes vel noget, naar vi tage de næsten helbredede med; men, at deres Antal er saa stort blandt de udbredte Tilfælde, viser, at Behandlingen her ofte er særlig langvarig. Forskellen ligger dog ikke deri, at et særlig stort Antal af de udbredte Tilfælde kun paavirkes i ringe Grad af Lyset,

thi som man ser, have vi i et stort Antal Tilfælde opnaaet en væsenlig Bedring, men vi have tidligere nævnt, at Flertallet af de Tilfælde, der ere henførte til denne Gruppe, kun have ringe Udsigt til fuldstændig Helbredelse.

Vi ville ved en nærmere Omtale af disse to Ydergrupper, de smaa og de meget udbredte Tilfælde, søge at bestemme Grænsen for Lysbehandlingens Ydeevne.

„Meget udbredte Tilfælde".

Antallet er som nævnt 159. Fordelingen var:

Patienternes Alder:	under 15 Aar	6	Tilfælde =	4 %.
	15—25 —	51	— =	32 %.
	25—45 —	63	— =	39 %.
	over 45 —	39	— =	25 %.
Sygdomsvarigheden:	under 2 Aar	0	Tilfælde.	
	2—10 —	37	— =	24 %.
	10—20 —	69	— =	43 %.
	over 20 —	53	— =	33 %.
Lungetuberkulose er paavist i		34	— =	22 %.

Som man ser, tilhøre disse Patienter alle Aldersklasser, dog med stor Overvægt for de ældre. I $^3/_4$ af Tilfældene har Sygdommen bestaaet i over 10 Aar. — Det Resultat, som vi have opnaaet ved disse ondartede Sygdomstilfælde, er ret betegnende for, hvad Methoden kan yde, idet 89 af 159 eller 56 % ere tilsyneladende eller næsten helbredede; og hvor vanskelige Tilfældene have været, fremgaar maaske tydeligst af de Fotografier, der ere medtagne (se Tavle 2, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 24, 26, 28, 31, 36, 44, 46); men paa den anden Side er der dog en Del af disse Tilfælde, der ogsaa for Lysbehandlingen maa betragtes som uhelbredelige.

„Smaa Tilfælde".

Det samlede Tal var 244. Fordelingen var:

Patienternes Alder:	under 15 Aar	50	Tilfælde	= 20 %.
	15—25 —	82	—	= 34 %.
	25—45 —	88	—	= 36 %.
	over 45 —	24	—	= 10 %.
Sygdomsvarigheden:	under 2 Aar	62	Tilfælde	= 25 %.
	2—10 —	125	—	= 51 %.
	10—20 —	43	—	= 18 %.
	over 20 —	14	—	= 6 %.
Lungetuberkulose er paavist i		28	—	= 12 %.

Som man ser, ere alle Aldersklasser repræsenterede, de ældre dog forholdsvis svagt. Sygdomsvarigheden er i $^3/_4$ af Tilfældene under 10 Aar. Naar vi fradrage de 57 Tilfælde, hvor Sygdommen har bestaaet i over 10 Aar, faa vi til Rest 187. Disse Tilfælde interessere os særlig, da vi selvfølgelig fremtidig vente at faa Lupuspatienterne i Behandling, mens Tilfældene endnu ere smaa og friske, og vi ville derfor skænke dem en særlig Omtale.

Oversigt over de 187 „smaa" Tilfælde.

I. Helbredede var ialt 142 eller 76 %, deraf var
recidivfri i over 3 Aar 26.
— - 2—3 — 32.
— - $^3/_4$—2 — 67.
Behandlede efter $^{31}/_{12}$ 1901: 17.

II. Næsten helbredede var ialt 20 = 11 %.
Af disse have 2 forladt Institutet for i deres Hjem at

fortsætte Lysbehandlingen, og begge ere saa vidt vides nu helbredede. Naar vi for de øvrige skal se efter Grundene til den langvarige Behandling, finder vi omtalt

i 6 Tilfælde uregelmæssig Behandling,
- 10 — ondartet Slimhindelidelse (1 Tb. pulm.),
- 2 — var ingen særlig Grund at paavise.

III. Væsenlig bedrede var ialt 5 Tilfælde = 3 %.

I alle disse 5 Tilfælde var en ondartet Slimhindelidelse Skyld i den langtrukne Behandling.

IV. Ufyldestgørende paavirkede var ialt 10 = 5 %.

Hos alle havde Lysbehandlingen frembragt en forbigaaende Bedring. Aarsagen til de gentagne Recidiver var

i 5 Tilfælde ondartet Slimhindelidelse,
- 3 — andre tiltrædende Sygdomme,
medens i 2 — ingen særlig Grund var at paavise.

Kun én af disse Patienter har opgivet Behandlingen (U. K. Negativt Resultat).

V. Tabte var ialt 9 = 5 %.

Heraf ere 5 døde, 4 af Lungetuberkulose, 1 af Meningitis; de resterende 4 ere alle unge Mennesker mellem 16 og 18 Aar, der af Ligegyldighed have opgivet Behandlingen.

Naar vi samle disse Oplysninger, finde vi følgende:

Af samtlige 187 „smaa" Tilfælde med Sygdomsvarighed under 10 Aar vare ved Opgørelsen:
142 helbredede,
2 gaaet til Lysbeh. andetsteds (senere helbredede),
5 døde,
5 afbrudt Behandlingen (1 negativt Resultat),
33 endnu i Behandling.

Aarsagen til den langvarige Behandling var:

i 6	Tilfælde	en uregelmæssig Behandling,
- 20	—	en ondartet Slimhindelidelse,
- 3	—	alvorlig Sygdom,
kun - 4	—	kunde ingen særlig Grund paavises.

Vi have saaledes vel haft nogle Vanskeligheder at overvinde, men selve Hudlidelserne have vi i næsten alle disse Tilfælde kunnet faa Bugt med.

Behandlingens Varighed.

Det er umuligt at give bestemte Regler herfor. Da der i hver Séance kun behandles et lille Areal, vil Varigheden i første Linie være afhængig af Sygdommens Udbredning o: Arealets Størrelse; dernæst vil den være afhængig af Sygdommens Indtrængen i Dybden; jo dybere Infiltrationen er, desto langvarigere Behandlingen. Endelig vil Varigheden ofte være afhængig af uheldige Komplikationer. Som vi have set i det foregaaende kunne f. Eks. haardnakkede Slimhindelidelser, hvorfra Sygdommen den ene Gang efter den anden igen breder sig ud paa Huden, forsinke Helbredelsen overordentlig meget, endogsaa undertiden forhindre en fuldstændig Helbredelse; andre indtræffende Sygdomme, Pauperisme og daarlig Almenernæring, ville ogsaa udøve en uheldig Virkning og forlænge Behandlingens Varighed.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om Behandlingens Varighed maa iøvrigt adskilles to Ting, nemlig 1) den Tid, det tager, fra Behandlingen er begyndt til Patienten er helt rask, med andre Ord, Tiden fra den første Séance til den sidste Séance, og 2) Antallet af Séancer. — Med Hensyn til det første Synspunkt maa vi gøre opmærksom paa den Maade, hvorpaa Behandlingen foregaar. Patienten bliver

nemlig først underkastet en Hovedbehandling, derefter pauseres der, for at Behandlingsreaktionerne kunne falde til Ro, og for at det kan vise sig, om Hovedbehandlingen har været tilstrækkelig, eller der kræves Efterbehandling. I nogle Tilfælde er Hovedbehandlingen tilstrækkelig, men i de fleste er en eller mange Efterbehandlinger nødvendig, undertiden et overordentlig stort Antal. Behandlingen kan paa denne Maade strække sig gennem flere Aar, uden at derfor Séancernes Antal nødvendigvis behøver at blive meget stort. Paa den anden Side kan Séancernes Antal være forholdsvis stort, samtidig med at hele Varigheden er forholdsvis kort, nemlig i de Tilfælde, hvor Patienten er bleven helbredet ved første Behandling. Hvert af disse Forhold maa derfor betragtes for sig. Til Materiale for disse Undersøgelser kunne vi selvfølgelig kun bruge de helbredede Patienter. Herved vil Resultatet imidlertid blive langt gunstigere, end Virkeligheden er for det samlede Materiale, hvilket vi altsaa gøre bestemt opmærksom paa.

Hvad angaar Efterbehandlingernes Antal, giver vort Patientskema ingen nærmere Oplysninger; men ved at undersøge Forholdet efter vore Journaler have vi fundet, at 136 Patienter ere helbredede allerede ved første Behandling (Hovedbehandlingen) medens de øvrige Helbredede have krævet en eller flere Efterbehandlinger. — For hver eneste af Patienterne gælder det imidlertid, hvad der forøvrigt er fælles for alle konservative Behandlingsmethoder for Lupus, og man kan vel sige for alle Former af Tuberkulose, at der kræves en aarelang og omhyggelig Observation, inden Patienterne kunne betragtes som helbredede.

Antallet af Séancer, der ere nødvendige i de enkelte Tilfælde, er det umuligt paa Forhaand at beregne. I al Almindelighed kan man dog sige, at Antallet vil være nogenlunde afhængig af Sygdommens Udbredning, og vi maa derfor, naar vi ville have nogenlunde paalidelige Oplysninger, opstille

vore Tilfælde i Grupper efter Sygdommens Udbredning. For at opnaa en større Paalidelighed have vi af vore 407 „Helbredede“ udskudt alle dem, der ere behandlede efter 1. Jan. 1901 (ialt 80), de 327 resterende have altsaa alle været recidivfri i mindst $^3/_4$ Aar. I nedenstaaende Tabel have vi udregnet Gennemsnitsantallet af Séancer for disse 327 for hver af de 4 Størrelser. Patienterne ere opstillede i 8 Grupper; i første Rubrik findes det samlede Antal af helbredte Tilfælde indenfor hvert 100, dernæst er opført, hvor mange Tilfælde der findes af hver Størrelse med Tilføjelse af Gennemsnitsantallet af Séancer. Tabellen viser altsaa ikke alene, hvor stort Gennemsnitsantallet af Séancer har været for hver enkelt Størrelse, men ogsaa hvor stort Antallet har været i de forskellige Tidsperioder.

Nr.	1—100	—200	—300	—400	—500	—600	—700	—800	Ialt
Helbredede med mindst $^3/_4$ Aars Obs.	44	39	37	30	42	54	43	38	327
deraf smaa Tilf.	21	15	12	13	20	32	18	27	158
Gennemsn.Séancetal	129	87	61	49	59	41	34	29	59
Middelstore.	11	11	11	12	15	13	10	6	89
Séancetal.	199	178	93	102	79	89	57	47	108
Store.	10	8	6	3	5	7	9	5	53
Séancetal.	271	172	146	241	226	113	134	74	173
Udbredte.	2	5	8	2	2	2	6	0	27
Séancetal.	470	259	349	380	210	172	171		280

Ved denne Tabel lægge vi først Mærke til den store Forskel, der er paa Séancernes Antal for de forskellige Størrelser. For det samlede Antal „smaa“ Tilfælde er Gennemsnittet 59 Séancer, for „middelstore“ 108, for „store“ 173 og for „meget udbredte“ 280. Vi se imidlertid straks af Tabellen,

at disse Gennemsnitstal kun have en ganske relativ Værdi, thi der er et saa stort og regelmæssigt Fald af Gennemsnitstallene fra det 1ste Hundrede til det 8de Hundrede, at det totale Gennemsnit i Virkeligheden intet siger. Tabellen viser, at Gennemsnitsantallet af Séancer for „smaa“ Tilfælde er gaaet ned fra 129 til 29, for „middelstore“ fra 199 til 47, for „store“ fra 271 tll 74 og for „meget udbredte“ fra 470 til 171.

Naar vi nærmere undersøge, hvad Grunden kan være til denne store Nedgang, finde vi, at det ikke kan være andet end Methodens eller Teknikens Forbedring. Vi kunne nemlig vistnok udelukke alle de øvrige Faktorer, som der kan være Tale om. Tabellen viser, at Antallet af Tilfælde af hver Slags er nogenlunde ens i Begyndelsen og i Slutningen, og der er ingen Grund til at antage, at Tilfældene af samme Størrelse have været forskellige til de forskellige Tider. En anden Indvending kunde synes mere plausibel, nemlig den, at vi, som ovenfor omtalt, i Begyndelsen brugte ren Lysbehandling (til de første c. 130 Patienter) og senere kombinerede den med anden Behandling som forberedende Kur. Men naar vi se nærmere efter, viser det sig, at den kombinerede Behandling er brugt særlig ved de store Tilfælde, og at Behandlingen for de „smaa“ Tilfælde har været saa godt som udelukkende ren Lysbehandling (se iøvrigt Side 15). Da nu Faldet for de „smaa“ Tilfælde imidlertid er lige saa stort som for de øvrige Størrelser, have vi vel Lov til at gaa ud fra, at den kombinerede Behandling ikke heller for dem er Skyld i Faldet. Hvis den kombinerede Behandling havde haft en meget betydelig Indflydelse, maatte vi have ventet at se et forholdsvis stærkere Fald for de store Tilfældes Vedkommende. Da dette ikke er Tilfældet, maa vi sige, at vi ikke talmæssigt have kunnet iagttage nogen stor Betydning af de andre Behandlingsmethoder, som vi bruge til Hjælp for Lysmethoden. Denne

Opgørelse har derfor en ikke ringe Betydning for Bedømmelsen af, hvad der tilkommer Lyset, og hvad der tilkommer de øvrige Midler, som vi have anvendt.

Vi kunne altsaa ikke finde nogen anden Forklaring paa den store Nedgang i Séancerne end Methodens Forbedring. Denne Forbedring af Apparater og Lamper have vi selvfølgelig kunnet paavise rent fysisk, og vor umiddelbare Erfaring har ogsaa vist os dens store praktiske Betydning for Behandlingen; men først ved denne Tabel have vi faaet et bestemt, talmæssigt Udtryk for, hvor store Fremskridt der er sket.

Vor oprindelige Hensigt med denne Tabel var imidlertid at faa at vide, hvor stort et Antal af Séancer, der gennemsnitlig har været nødvendigt til at naa Helbredelse i de forskellige Tilfælde, som vi opstillede. Disse Tal har Tabellen vist os tydeligt nok. Men hvis man nu vil gaa videre og spørge, hvor mange Séancer kan man efter Methodens nuværende Standpunkt regne som Gennemsnit for Lysbehandling af et „lille“ Lupustilfælde, hvor mange for et „middelstort“ o. s. v., saa maa man tage sig i Agt for at betragte det i Tabellen opførte Gennemsnit for de sidste Hundreder som det rigtige. Som vi have fremhævet i det foregaaende, ere Tallene altfor gunstige, de angive i Virkeligheden kun Gennemsnitsantallet af Séancer for de gunstigst forløbne Tilfælde.

Vi maa endnu gøre opmærksom paa, hvilket man forøvrigt snart vil se ved at betragte det store Patientskema, at de her anførte Gennemsnit ere sammensatte af meget springende Tal. Medens der f. Eks. er smaa Tilfælde, som kun have krævet en enkelt eller ganske faa Séancer for at opnaa Helbredelse, er der andre af omtrent samme Størrelse, som have krævet indtil hundrede Séancer eller mere. Af de meget store Tilfælde er der ikke faa, navnlig i Begyndelsen, som have krævet tusinde eller flere Séancer. (De meget store Tal

ere imidlertid ikke repræsenterede i ovenstaaende Tabel, da de ikke endnu have naaet Helbredelse). Men til Trods for de meget varierende Tal kan man dog hurtig se af den forholdsvis store Regelmæssighed, som Tallene vise, at Hovedindtrykket maa være nogenlunde rigtigt.

Som et Moment, der spiller en stor Rolle og ofte har gjort Behandlingens Varighed længere og Antallet af Séancer større, end det var nødvendigt, maa vi nævne, at mange Patienter forsømme at møde til Efterbehandling i rette Tid og lade Sygdommen faa Lov til at brede sig for stærkt; dette gælder selvfølgelig særlig Patienter, der bo i lang Afstand fra Institutet, og som komme sjeldnere til Observation.

Saavel af denne som af flere andre Grunde bør man bestræbe sig for at faa Patienterne fuldstændig helbredede allerede ved første Behandling. Vi have, for at spare Patienternes Tid og Penge, vistnok mange Gange ladet dem ophøre med Behandlingen og rejse hjem noget for tidligt. I den senere Tid ere vi imidlertid komne mere bort herfra og beholde Patienterne, saavidt det er os muligt, i længere Tid under Behandling og nøje Observation allerede første Gang; dette er i Længden vistnok ogsaa det mest økonomiske for Patienterne, og det er desuden mere tilfredsstillende, saavel for Patient som for Læge, at opnaa Helbredelse allerede i første Omgang.

Hvad nu Spørgsmaalet om Bedømmelsen af denne Methode overfor Lupus vulgaris angaar, saa maa man huske vel paa, at den Opgave, Methoden her har været stillet overfor, maa betragtes som ganske exceptionel. Selv af den bedste Behandlingsmethode for en eller anden Sygdom kan man ikke forlange eller vente, at den skal kunne helbrede de mest forsømte og haabløse Tilfælde af vedkommende

Sygdom, opsamlede gennem en Række af Aar, og det er jo denne Opgave, Lysbehandlingen har haft, og det er derom, denne Redegørelse handler. Vil man være retfærdig, maa man derimod bedømme en Behandlingsmethode efter dens Virkning ved de Tilfælde, som inden alt for lang Tid efter Sygdommens Udbrud komme under Behandling, og dette vil for Lysmethoden ske, naar om en Række Aar de invetererede, store Lupustilfælde ikke, eller saa godt som ikke, mere findes. — Den Redegørelse, som findes S. 35—37 over alle vore „smaa" Tilfælde af under 10 Aars Varighed har i saa Henseende en ikke ringe Værdi.

Som vi have set af det foregaaende (Tabel S. 39), har Methoden imidlertid i det Tidsrum, som her omhandles, været i stadig Fremgang, og derfor kunne de Resultater, som vi have opnaaet, saavel ved de store og gamle, som ved de smaa og friske Tilfælde, ikke anses som fuldgyldige ved Fastsættelsen af Methodens reelle Værdi overfor Lupus.

Vi maa derfor til Slutning fremhæve, at de Resultater, som vi her have været i Stand til at offentliggøre, ere opnaaede ved Hjælp af en Methode, som dengang endnu ikke havde naaet sin nuværende, fulde Styrke samt ved et Materiale, som var exceptionelt vanskeligt, saa vanskeligt, at det paa Forhaand maatte stemples som den haardeste Prøve, en Helbredelsesmethode kunde stilles overfor.

* * *

I Anledning af det store Antal nye Apparater og Lamper, som i de senere Aar ere fremkomne, og som alle, saavidt vi vide, ere svagere end vore, nødes vi til at gøre opmærksom paa, at Resultaterne ere afhængige af Lysstyrken og Behandlingens Teknik. Hvis man vil opnaa de samme gunstige Resultater som vi, maa man derfor anvende Apparater

og Lamper af mindst samme Styrke som vore; men ikke nok hermed, der fordres ogsaa god Pasning af Lamperne, den mest pinlige Renholdelse af Apparaterne og stor Omhyggelighed fra Sygeplejerskernes Side. At ville anvende denne Methode uden at have studeret den praktisk vil vistnok kun medføre Skuffelser.

PATIENTSKEMA OG SYGEHISTORIER

UDARBEJDEDE AF

H. FORCHHAMMER OG **A. REYN**

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger					Sidst behandlet	Resultat
							1896—97	98	99	1900	01		
1	M.	46	8	**Middelstor.** H. Kind.	—	$^{20}/_{11}$ 95	—	—	—	—	—	Okt. 96	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 1. Behandl. 1895—96, ialt 5 Mdr.
2	M.	22	6	**Lille.** H. Kind.	—	$^{13}/_{4}$ 96	10	—	—	—	32	$^{7}/_{10}$ 01	**Helbredet** * *1896:* U. K., $^{22}/_{1}$ 01 Beh. genoptages. $^{20}/_{7}$ *02:* Ikke tydelige Sygdomstegn.
3	M.	17	8	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	—	$^{2}/_{5}$ „	330	185	—	23	178	—	**Næsten helbredet.** $^{10}/_{7}$ 02: Smukt Arvæv, kun paa Næsen enkelte Smaaknuder.
4	K.	34	18	**Meget udbredt.** H. Kind, Hals, h. Ø.	—	$^{4}/_{5}$ „	150	—	110	—	—	$^{31}/_{5}$ 99	**U. K. Negativt Resultat.** Haabløst Tilfælde. Kendelig Bedring.
5	M.	41	22	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{12}/_{8}$ „	100	79	28	36	38	$^{1}/_{6}$ 01	**Helbredet** * Uregelm. Behandling. $^{15}/_{9}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
6	K.	29	17	**Stor.** H. Kind.	—	$^{12}/_{8}$ „	200	239	223	177	129	—	**Næsten helbredet.** $^{2}/_{7}$ 02: Godt Arvæv. Enkelte Knuder i Randen.
7	M.	15	13	**Stor.** V. Kind.		$^{26}/_{8}$ „	100	75	118	8	38	$^{22}/_{5}$ 01	**Helbredet** * $^{7}/_{7}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
8	K.	9	5	**Middelstor.** V. Kind.	—	$^{10}/_{9}$ „	220	124	57	32	23	—	**Ringe Paavirkning.** Gentagne Frembrud af dybe Knuder.
9	K.	19	10	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød, Gane.	$^{19}/_{9}$ „	470	195	31	7	8	$^{16}/_{11}$ 01	**Helbredet** * Smukt Arvæv. Siden 99 kun enkelte smaa Knuder. $^{3}/_{4}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
10	K.	36	9	**Middelstor.** Næse, begge Kind.	—	$^{19}/_{9}$ „	50	—	—	—	—	$^{14}/_{11}$ 96	**U. K. Udebleven.** (Økonomiske Vanskeligheder). Kendelig Bedring.
11	M.	20	7	**Middelstor.** Næse, Overl., v. Kd.	Næsehule.	$^{8}/_{10}$ „	312	162	73	30	—	$^{31}/_{5}$ 00	**Helbredet** * $^{31}/_{5}$ 00: Ikke tydelige Sygdomstegn. (Ikke set senere).
12	K.	16	12	**Stor.** V. Kind, Halsen, h. Fod.	Næsehule.	$^{19}/_{11}$ „	100	186	64	—	—	$^{5}/_{12}$ 99	**U. K. Udebleven.** (Økonomiske Vanskeligheder). Kendelig Bedring.
13	M.	14	2	**Middelstor.** Næse, h. Kind.	Næsehule.	$^{28}/_{11}$ „	80	—	—	—	—	$^{1}/_{3}$ 97	**U. K. Død** 1897 af Tetanus. Næsten helbredet.
14	K.	7	5	**Lille.** H. Kind.	—	$^{9}/_{12}$ „	66	25	16	2	4	$^{5}/_{11}$ 01	**Helbredet** * $^{22}/_{8}$ 02: Smukt Ar. Ikke tydelige Sygdomstegn.

															fra de stærkt forsnævrede Næsebor.
18	K.	19	8	**Stor.** V. Kind.	—	$^{4}/_{1}$ „	200	63	38	—	6	—	**Næsten helbredet.** $^{22}/_{11}$ 01: Glat Ar, hvori enkelte Smaaknuder.
19	K.	6	2	**Lille.** H. Kind.	—	$^{15}/_{1}$ „	8	—	—	—	—	$^{13}/_{9}$ 97	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 3.
20	K.	46	7	**Lille.** Næsen.	Næsehule.	$^{16}/_{1}$ „	74	47	—	—	2	$^{4}/_{11}$ 01	**Helbredet** * $^{1}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
21	K.	25	11	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Pande, v. Øre, Hals.	Næsehule.	$^{16}/_{1}$ „	70	—	62	50	51	—	**Ringe Paavirkning.** (Uregelmæssig Behandling. Solbehandling i Hjemmet).
22	K.	30	$4^{1}/_{2}$	**Middelstor.** Næsen.	Næsehule.	$^{18}/_{1}$ „	140	134	—	—	—	$^{3}/_{12}$ 98	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 4.
23	M.	20	19	**Meget udbredt.** Begge Ører, Kinder, Hals.	—	$^{2}/_{2}$ „	290	246	147	230	244	$^{26}/_{6}$ 01	**U. K. Negativt Resultat.** Ondartet Tilfælde med ringe Udsigt til Helbredelse.
24	M.	18	7	**Stor.** V. Kind, Hals.	—	$^{2}/_{2}$ „	154	31	—	—	—	$^{12}/_{1}$ 98	**Næsten helbredet.** $^{11}/_{3}$ 01: Glat Arvæv. Endnu enkelte Knuder, som Pt. ikke ænser.
25	K.	13	4	**Stor.** V. Kind.	—	$^{3}/_{2}$ „	120	47	—	22	4	$^{8}/_{8}$ 01	**Helbredet** * Siden Mai 98: Smukt Arvæv, enkelte smaa Knuder. $^{9}/_{1}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
26	M.	50	25	**Meget udbredt.** V. Kind, Overlæbe, v. Øre, Hals.	—	$^{6}/_{2}$ „	111	80	—	—	—	—	**Væsentlig bedret.** 1898—1902 Solbehandling i Hjemmet. $^{10}/_{3}$ 02: Behandlingen genoptages.
27	K.	25	15	**Middelstor.** Næse, Kinder.	Tandk. 1901: Haarde Gane.	$^{6}/_{2}$ „	105	25	—	14	—	$^{22}/_{12}$ 00	**Helbredet** * $^{12}/_{5}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
28	M.	18	13	**Meget udbredt.** Pande, V. Kind, Øre, Hals.	—	$^{20}/_{2}$ „	90	16	260	230	197	—	**Væsentlig bedret.** (Behandling afbrudt $^{4}/_{6}$ 97—$^{13}/_{12}$ 98). $^{5}/_{5}$ 02: Overalt godt Arvæv, kun spredte Knuder.
29	M.	33	16	**Lille.** H. Kind.	—	$^{8}/_{3}$ „	26	—	—	—	—	$^{8}/_{4}$ 97	**U. K. Sygdom** (Tb. pulm.) Væsentlig Bedring.
30	M.	25	23	**Middelstor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{1}/_{4}$ „	107	—	—	—	—	$^{11}/_{6}$ 97	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 5.
31	K.	40	3	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{1}/_{4}$ „	90	33	—	—	11	$^{12}/_{7}$ 01	**Helbredet** * 1901: Recidiv: To smaa Knuder. $^{24}/_{2}$ 02: Ikke Sygdomstegn.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger					Sidst behandlet	Resultat
							1896—97	98	99	1900	01		
32	K.	23	11	**Stor.** H. Øre, Kind, Hals.	—	$^{17}/_{4}$ 97	175	307	179	134	107	—	**Partielt helbredet.** $^{4}/_{9}$ 02: God Ardannelse, endnu dyb lupøs Infiltration paa h. Kind.
33	K.	47	33	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	—	$^{4}/_{5}$ „	203	423	390	249	135	—	**Væsentlig bedret.** $^{4}/_{9}$ 02: God Ardannelse, spredte dybe Knuder.
34	K.	23	$6^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{11}/_{5}$ „	73	—	—	—	—	$^{7}/_{9}$ 97	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 6.
35	M.	6	2	**Middelstor.** V. Kind, Overlæbe.	—	$^{15}/_{5}$ „	95	18	25	48	48	—	**Væsentlig bedret.** (Uregelm. Behandling). $^{22}/_{4}$ 02: Glat Arvæv, enkelte dybe Smaaknuder.
36	M.	16	15	**Meget udbredt.** Begge Kind., Hage.	—	$^{19}/_{5}$ „	168	286	143	40	—	$^{25}/_{10}$ 00	**Næsten helbredet.** Siden $^{2}/_{9}$ 99 kun enkelte smaa Knuder, som Pt. ikke ænser.
37	M.	15	10	**Stor.** H Overextremitet.	—	$^{2}/_{6}$ „	151	69	—	—	—	$^{6}/_{5}$ 98	**U. K. Negativt Resultat.** Ringe Virkning.
38	K.	21	5	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule.	$^{4}/_{6}$ „	135	62	—	15	17	$^{22}/_{7}$ 01	**Helbredet** * 1900 $^{4}/_{1}$: Efter Erysipelas Recidiv; Enkelte smaa Knuder. $^{17}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
39	K.	15	2	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, h. Arm.	Næsehule, Tandkød, haarde Gane.	$^{4}/_{6}$ „	180	261	159	117	65	—	**Partielt helbredet** Gentagne Udbrud fra Slimhinderne. (Tb. pulm. Albuminuria).
* **40**	M.	20	11	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder	Næsehule.	$^{8}/_{6}$ „	160	142	55	—	—	$^{28}/_{8}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 7.
41	M.	15	3	**Middelstor.** Næse, Overl., v. Kind.	Næsehule.	$^{9}/_{6}$ „	80	9	46	—	—	$^{26}/_{6}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 8.
42	K.	38	20	**Meget udbredt.** H. Kind, Næse, 1898: V. Kind.	1900: Næsehule.	$^{14}/_{6}$ „	169	282	325	285	189	—	**Næsten helbredet.** De første Aar bredte Lidelsen sig trods Behandling. $^{18}/_{8}$ 02: Kun faa spredte Knuder.
43	K.	29	7	**Stor.** Næse, Overlæbe, Kinder.	Næsehule.	$^{22}/_{6}$ „	160 c.	230	65	15	26	—	**Næsten helbredet.** Siden 1900: Kun enkelte smaa Knuder.
44	M.	18	7	**Middelstor.** Næse, Overlæbe.	Næsehule, Tandk., Gane.	$^{24}/_{6}$ „	90	27	9	—	5	—	**Næsten helbredet.** Siden 1899 kun enkelte smaa Knuder ved h. Næseborsrand.
45	M.	25	$^{1}/_{4}$	**Lille.** Næse,	—	$^{6}/_{7}$ „	6	—	—	—	—	$^{18}/_{7}$ 97	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 9.

48	K.	41	20	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder	Næsehule, Svælg.	$^{31}/_{8}$ „	98	181	54	53	87	—	**Næsten helbredet.** Siden 1899 kun spredte Knuder, væsentligst ved Næseborsrandene.
49	K.	49	27	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder	—	$^{2}/_{9}$ „	66	49	—	—	—	$^{27}/_{4}$ 98	**U. K. Sygdom.** Ringe Virkning.
50	K.	39	29	**Stor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{9}/_{9}$ „	76	—	—	—	(8)	$^{9}/_{5}$ 98	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 11.
51	K.	39	12	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, v. Kind.	Næsehule.	$^{15}/_{9}$ „	89	138	52	51	31	—	**Helbredet** * Siden 1899 kun faa Knuder. $^{26}/_{6}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
52	K.	17	10	**Meget udbredt.** Næse, begge Kinder, h. Arm.	Næsehule, Mund, Svælg, Strube.	$^{16}/_{9}$ „	77	220	—	—	—	$^{20}/_{6}$ 98	**U. K. Død** $^{30}/_{6}$ 98 af Tb. pulm. Næsten helbredet.
53	K.	19	4	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule.	$^{18}/_{9}$ „	81	140	106	—	—	$^{19}/_{9}$ 99	**U. K. Udebleven.** Næsten helbredet. Senere Forværring. (Tb. pulm.)
54	K.	45	33	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Pande, begge Ører.	Næsehule.	$^{26}/_{9}$ „	82	273	159	66	31	—	**Næsten helbredet.** Smukt Arvæv. Siden 1900 kun faa spredte Knuder.
55	M.	32	20	**Lille.** Næse, v. Kind.	Næsehule, Tandkød.	$^{27}/_{9}$ „	53	14	—	—	—	$^{9}/_{3}$ 98	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 12.
56	K.	44	28	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Pande, begge Ører.	Næsehule, Tandk., Gane.	$^{29}/_{9}$ „	77	260	156	50	28	—	**Helbredet** * $^{21}/_{5}$ 02: Smukt Arvæv. Ikke tydelige Sygdomstegn.
57	K.	33	15	**Stor.** H. Kind.	—	$^{30}/_{9}$ „	48	157	—	—	—	$^{16}/_{8}$ 98	**U. K. Udebleven** (ikke senere set). Væsentlig Bedring.
58	K.	21	14	**Stor.** Næse, Kinder, Læber.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane.	$^{8}/_{10}$ „	71	260	—	80	147	—	**Partielt helbredet.** Læberne destruerede. Mundaabning stærkt forsnævret, gentagne Udbrud fra Mundslimhinden.
59	K.	43	2	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{9}/_{10}$ „	45	114	5	—	—	$^{5}/_{8}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 13.
60	K.	23	7	**Stor.** Næse, begge Kinder, Øjelaag, h. Haand, Arm.	Næsehule.	$^{18}/_{10}$ „	61	293	29	53	13	$^{13}/_{7}$ 01	**Helbredet** * **Død** Juni 02 (Tb. pulm.) Sygehistorie Nr. 123.

* Se Tavle I.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger					Sidst behandlet	Resultat
							1896—97	98	99	1900	01		
61	M.	12	$^3/_4$	**Stor.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule, Tandk., Gane.	$^{19}/_{10}$ 97	34	183	—	—	—	$^{14}/_6$ 98	**U. K. Død** 1899 af Tb. Ondartet Tilfælde med dybe subkutane og ossøse Lidelser.
62	K.	21	5	**Stor.** Halsen.	Næsehule.	$^{20}/_{10}$ „	62	136	36	12	8	—	**Næsten helbredet.** Siden 1899 kun enkelte smaa Knuder.
63	K.	53	52	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, h. Haand.	Næsehule.	$^{21}/_{10}$ „	56	266	159	32	—	$^{19}/_4$ 00	**U. K. Negativt Resultat.** (Haabløst Tilfælde). Kendelig Bedring: Infiltration og Ulceration aftaget.
64	K.	17	5	**Middelstor.** Begge Kinder.	—	$^{22}/_{10}$ „	43	109	23	—	—	$^6/_2$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 14.
65	K.	19	5	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød.	$^{28}/_{10}$ „	44	141	30	10	4	$^{12}/_7$ 01	**Helbredet** * Siden 1899: Smukt Arvæv, kun faa smaa Knuder. $^{18}/_1$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
66	K.	34	3	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{28}/_{10}$ „	47	145	70	139	—	$^4/_{12}$ 00	**Helbredet** * $^{28}/_5$ 02: Glat Arvæv. Ikke tydelige Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
★ 67	K.	68	33	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kind., Hage.	Næsehule.	$^2/_{11}$ „	50	137	41	—	—	$^{15}/_{12}$ 99	**Helbredet** * $^{23}/_7$ 02 Brev: Ansigtet holder sig frit. Kun et suspekt Parti paa v. Kind.
68	K.	61	30	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet.	Næsehule, Læber, Gane.	$^3/_{11}$ „	50	12	157	15	—	$^{11}/_5$ 00	**U. K. Død** $^{25}/_5$ 00 af Hjærtelidelse. Kendelig Bedring.
69	K.	49	22	**Lille.** H. Kind.	—	$^3/_{11}$ „	24	34	35	8	—	$^{20}/_6$ 00	**U. K. Negativt Resultat.** Forbigaaende Bedring, stadig Frembrud af dybe Knuder.
70	K.	16	10	**Lille.** Næse, 1898: Overlæbe, h. Kind.	Næsehule.	$^5/_{11}$ „	48	125	—	11	—	$^7/_4$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 15.
71	K.	27	8	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{10}/_{11}$ „	43	305	52	29	68	—	**Næsten helbredet.** Siden 1899 glat Arvæv, kun faa smaa Knuder. (Tb. pulm.)
72	M.	20	6	**Stor.** Næse, begge Kinder, v. Øre.	Næsehule, Tandkød.	$^{10}/_{11}$ „	43	305	104	—	40	$^4/_9$ 01	**Helbredet** * 1901: Lille Udbrud fra Næseslimhinden. $^{18}/_{12}$ 01: Ikke tydelige Sygdomstegn.

75	K.	33	7	**Middelstor.** Næse, begge Kind.	Tandkød. Næsehule? Tandkød.	$^{2}/_{12}$ „	25	46	38	—	—	$^{12}/_{7}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 17.
76	K.	20	6	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kind.	Næsehule, Tandk., Gane.	$^{4}/_{12}$ „	23	67	–	—	—	$^{5}/_{4}$ 98	**U. K. Død** 1898 af Tub. pulm. Ringe Virkning
77	K.	44	37	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Hals	Næsehule.	$^{4}/_{12}$ „	24	150	76	180	85	—	**Væsentlig bedret.** $^{6}/_{6}$ 02: Kun faa spredte Knuder.
78	K.	28	14	**Middelstor.** Næse, Overlæbe.	Tandkød, Gane, Svælg, Strube, Tunge.	$^{7}/_{12}$ „	17	223	62	29	—	$^{5}/_{12}$ 00	**Helbredet** * Siden 1898 er kun Tungelidelsen behandlet. (Tb. pulm.)
79	M.	18	8	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet.	Næsehule, Mund, Svælg, Strube.	$^{9}/_{12}$ „	19	268	254	77	82	—	**Partielt helbredet.** Læberne er totalt destruerede og Tilfældet er nærmest haabløst. (Tb. pulm.)
80	K.	26	9	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{10}/_{12}$ „	19	69	25	—	—	$^{3}/_{6}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 18.
81	K.	22	6	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{10}/_{12}$ „	18	133	32	—	—	$^{5}/_{4}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 19.
82	K.	30	14	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder og Ører.	Næsehule, Svælg.	$^{3}/_{1}$ 98	—	237	178	116	189	$^{28}/_{9}$ 01	**U. K. Død** Novbr. 1901 Cancer.
83	K.	27	15	**Lille.** H. Haand og Arm.	—	$^{4}/_{1}$ „	–	55	4	—	6	$^{10}/_{12}$ 01	**Helbredet** * 1901: En enkelt lille Knude. $^{30}/_{4}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
84	K.	57	25	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{5}/_{1}$ „	—	27	—	—	—	$^{4}/_{2}$ 98	**Næsten helbredet.** Siden 1898 kun enkelte smaa Knuder, som Pt. ikke ænser.
85	M.	24	9	**Middelstor.** Næse, begge Kind.	Næsehule.	$^{5}/_{1}$ „	—	140	24	15	—	$^{12}/_{5}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 20.
86	M.	11	$3^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse.	—	$^{7}/_{1}$ „	—	53	14	—	—	$^{13}/_{6}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 21.
* **87**	M.	11	2	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kind.	Næsehule, Overlæbe.	$^{11}/_{1}$ „	—	230	21	45	—	$^{19}/_{9}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 22.
88	K.	21	5	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kind.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane.	$^{12}/_{1}$ „	—	118	62	—	6	$^{8}/_{8}$ 01	**Helbredet** * Siden 1899 kun en tvivlsom Knude. $^{10}/_{2}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
89	M.	17	5	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kind.	Næsehule, Gane.	$^{20}/_{1}$ „	—	231	72	83	40	—	**Næsten helbredet.** $^{31}/_{5}$ 02: Kun enkelte spredte smaa Knuder.

* Se Tavle II, III & IV.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygdvarighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 98	99	1900	01	Sidst behandlet	Resultat
90	K.	20	12	**Meget udbredt.** Næse, Læber, Kinder, Hage.	Næsehule, Tandkød, Svælg, Strube.	$^{22}/_{1}$ 98	276	138	193	133	—	**Næsten helbredet.** $^{9}/_{7}$ 02: Godt Arvæv, kun faa spredte Knuder. (Tb. pulm.)
91	K.	12	9	**Middelstor.** V. Kind.	—	$^{24}/_{1}$ „	170	13	—	60	—	**Helbredet** * Behandlingen afbrudt fra $^{2}/_{2}$ 99—$^{9}/_{7}$ 01. $^{1}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
92	M.	44	$4^{1}/_{2}$	**Meget udbredt.** H. Øre, Kind og Hals.	—	$^{24}/_{1}$ „	291	289	254	210	—	**Næsten helbredet.** $^{28}/_{5}$ 02: Kun faa spredte Knuder.
93	K.	21	12	**Stor.** V. Kind, Overlæbe.	—	$^{31}/_{1}$ „	183	54	59	14	—	**Forbigaaende Bedring.** Gentagne Frembrud af dybe Knuder.
94	M.	8	8	**Lille.** H. Kind.	—	$^{31}/_{1}$ „	87	5	8	—	$^{23}/_{3}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 23.
95	K.	29	17	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{2}/_{2}$ „	144	11	50	10	$^{1}/_{4}$ 01	**Helbredet** * Siden $^{5}/_{4}$ 00: Kun enkelte Knuder ved v. Næseborsrand. $^{27}/_{7}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
96	K.	30	18	**Stor.** H. Øre, Kind, Hals.	—	$^{3}/_{2}$ „	264	114	157	128	—	**Partielt helbredet.** $^{2}/_{4}$ 02: Paa Kinden dyb Infiltration med spredte Knuder.
* **97**	K.	28	17	**Stor.** Næse, begge Kinder, Panden, Hage.	Næsehule.	$^{5}/_{2}$ „	231	32	-	—	$^{20}/_{8}$ 99	**Helbredet** * **Død** $^{17}/_{2}$ 00 af en Ørelidelse. Sygehistorie Nr. 124.
98	K.	62	54	**Lille.** H. Kind.	—	$^{10}/_{2}$ „	56	—		—	$^{24}/_{10}$ 98	**Næsten helbredet.** Siden Oktbr. 98 kun to smaa Knuder, der ikke ænses af Pt.
99	M.	22	10	**Lille.** Næsen.	Næsehule.	$^{11}/_{2}$ „	203	25	31	3	$^{4}/_{9}$ 01	**Helbredet** * Siden Novbr. 98 kun smaa Saar i Vestibl. og enk. Knuder paa Næseborsranden.
100	K.	36	10	**Lille.** Næse, h. Kind.	Næsehule.	$^{11}/_{2}$ „	196	—	32	64	—	**Forbigaaende Bedring.** (Uregelmæssig Behandling) Gentagne Udbrud fra Slimhinden.
101	K.	31	5	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{15}/_{2}$ „	106	19	—	—	$^{7}/_{8}$ 99	**Helbredet** * 1902: Lille Recidiv fra Slimhinden.
102	M.	13	5	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{18}/_{2}$ „	136	117	81	—	$^{28}/_{10}$ 00	**Helbredet** * $^{14}/_{5}$ 1902: Glat Arvæv, ikke Sygdomstegn.
103	K.	64	10	**Middelstor.** Beg-	—	$^{18}/_{2}$	129	10	31	02	$^{20}/_{7}$ 01	**U. K. Død** 1902 [illegible]

				ader.										
105	K.	32	$2^1/_4$	**Lille.** Næse.	**Næsehule,** Gane, Svælg.	$^{21}/_2$ „	198	83	31	39	—		**Væsentlig bedret.** Gentagne smaa Udbrud fra Næsehule. Lider af mb. cordis.
106	K.	16	4	**Stor.** V. Kind, 1899 Næse, Overlæbe, h. Kind.	**Næsehule,** Gane, Svælg, Strube. 1899: Læber, Tandkød.	$^{22}/_2$ „	162	130	188	169	—		**Partielt helbredet.** V. Kind helbredet siden Novbr. 98. 1899 frisk ondartet Udbrud fra Slimhinderne. Tb. pulm.
107	K.	21	12	**Stor.** Næse, begge Kinder, Overlæbe.	**Næsehule,** Tandkød, Gane.	$^{23}/_2$ „	223	110	103	32	—		**Næsten helbredet.** Siden Jan. 00 kun smaa Saar og Knuder om Næse og Mund.
108	K.	27	7	**Middelstor.** Næse, h. Øre, Hage, v. Arm.	**Næsehule,** Gane.	$^{24}/_2$ „	139	43	45		$^{26}/_4$ 00		**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 25.
109	M.	34	26	**Stor.** V. Kind, Hals.	—	$^{26}/_2$ „	152	96	—	-	$^{23}/_5$ 99		**Ringe Paavirkning.** Sammenhængende dybt infiltreret Affekt. 1902 Beh. genoptages.
110	K.	19	5	**Middelstor.** Næse, begge Kinder.	**Næsehule,** Tandkød, Strube.	$^{28}/_2$ „	251	56	62	36	—		**Næsten helbredet.** Siden Febr. 99 kun smaa Udbrud paa Næsen fra den ondartede Slimhindelidelse.
111	M.	23	12	**Meget udbredt.** Næse, Læber, Kinder, Hals.	**Næsehule,** Læber.	$^2/_3$ „	259	181	205	103	—		**Partielt helbredet.** Delvis solidt Arvæv, om Næse og Mund gentagne Udbrud. Tb. pulm.
112	M.	18	4	**Lille.** Næse, Overlæbe.	**Næsehule,** Gane.	$^5/_3$ „	197	111	217	157	—		**Forbigaaende Bedring.** Gentagne Udbrud.
113	K.	30	6	**Lille.** Næse, h. Kind.	**Næsehule,** Tandkød.	$^6/_3$ „	156	50	81	38	—		**Væsentlig bedret.** Gentagne Udbrud fra Næsehulen.
114	K.	52	1	**Lille.** Næse, h. Kind.	**Næsehule.**	$^7/_3$ „	217	137	48	—	$^{27}/_9$ 00		**U. K. Negativt Resultat.** Ringe Paavirkning.
115	K.	31	4	**Stor.** Næse, h. Kind, Overlæbe. 1900: V. Kind.	**Næsehule,** Strube.	$^{10}/_3$ „	66	—	185	18	$^2/_9$ 01		**Helbredet** * Afbrudt $^{27}/_5$ 98—$^5/_5$ 00 paa Grund af Tb. pulm. — $^5/_4$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
116	M.	17	15	**Middelstor.** H. Kind.	—	$^{14}/_3$ „	164	47	—	40	—		**Næsten helbredet.** Siden Decbr. 98 kun spredte dybe Knuder.
117	K.	21	10	**Middelstor.** Næse, h. Kind, Ovl.	**Næsehule.**	$^{14}/_3$ „	131	30	—	—	$^6/_4$ 99		**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 26.

* Se Tavle V & VI.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 98	99	1900	01	Sidst behandlet	Resultat
118	K.	15	2	**Middelstor.** Næse, h. Kind, Overlæbe, Hals.	Næsehule.	$^{16}/_{3}$ 98	168	151	129	24	—	**Næsten helbredet.** Siden Juni 1900 kun enkelte Knuder ved Næseborsranden.
119	K.	20	1	**Middelstor.** Næse, h. Kind, Overlæbe.	Næsehule, Tandkød.	$^{16}/_{3}$ „	189	56	22	46	$^{21}/_{9}$ 01	**Helbredet** * Siden $^{9}/_{1}$ 99 kun faa smaa Knuder. $^{14}/_{4}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
120	M.	20	5	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød, Gane.	$^{17}/_{3}$ „	235	52	181	140	—	**Partielt helbredet.** Delvis solidt Arvæv, haardnakket Affekt. om Næse og Mund. Tb. pulm.
121	K.	18	8	**Stor.** Begge Kinder, Hals.	—	$^{19}/_{3}$ „	185	61	43	65	—	**Partielt helbredet.** Delvis solidt Arvæv, paa v. Kind et enkelt Parti med dybe Knuder.
122	K.	16	5	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{19}/_{3}$ „	126	45	28	14		**Væsentlig bedret.** Gentagne Udbrud fra Slimhinden, uregelmæssig Behandling. Tb. pulm.
123	M.	16	14	**Stor.** Næse, begge Kinder, Overlæbe, Hals, h. Arm.	Næsehule.	$^{21}/_{3}$ „	204	22	52		$^{1}/_{5}$ 00	**Næsten helbredet.** $^{23}/_{7}$ 02: Solidt Arvæv, kun paa Halsen enkelte smaa Knuder.
* **124**	M.	17	4	**Middelstor.** Næse, h. Kind.	Næsehule, Gane, Svælg, Strube.	$^{22}/_{3}$ „	126		—		$^{22}/_{8}$ 98	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 27.
125	M.	43	12	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød, Gane.	$^{22}/_{3}$ „	218	147	89	91	—	**Partielt helbredet.** Delvis solidt Arvæv, stadige Udbrud fra Næsehulen.
126	M.	21	19	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, begge Ører, Hals.	Næsehule, Tandkød, Gane, Strube.	$^{23}/_{3}$ „	207	214	151	58	—	**Næsten helbredet.** Stærkt destruerende Tilfælde med næsten total Blindhed. $^{23}/_{7}$ 02: Solidt Arvæv, kun ved Læberne smaa Saar.
127	M.	23	7	**Stor.** Næse, begge Læber, h. Kind.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane, Svælg, Tunge	$^{25}/_{3}$ „	220	49	–	—	$^{11}/_{3}$ 99	**U. K. Død** $^{28}/_{3}$ 99 af Tb. miliar.

				begge Kinder, Hage, Hals.	Gane.								domstegn.
130	K.	32	12	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{16}/_{4}$ „	78	26	49	12	–	**Næsten helbredet.** $^{29}/_{8}$ 02: Næse, h. Kind fri, v. Kind 2 smaa Knuder.
131	K.	65	10	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Gane.	$^{18}/_{4}$ „	165	27	23	14	$^{23}/_{7}$ 01	**Helbredet** * Siden $^{17}/_{10}$ 98 kun faa spredte Knuder. $^{10}/_{5}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
132	K.	14	4	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{22}/_{4}$ „	105	35	52	59	—	**Næsten helbredet.** Langsom Fremgang, haardnakket Slimhindeaffect. $^{14}/_{7}$ 02: Enkelte smaa Knuder ved Næseborsranden.
* **133**	M.	20	11	**Meget udbredt.** Næse, Læber, begge Kinder, h. Albu, v. Laar.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane.	$^{28}/_{4}$ „	189	114	—	—	$^{6}/_{7}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 29.
134	M.	14	$^{1}/_{2}$	**Lille.** V. Kind.		$^{3}/_{5}$ „	6	11	18	20	$^{7}/_{8}$ 01	**Helbredet** * $^{21}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
135	K.	25	11	**Middelstor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule, Tandk., Gane, Svælg, Strube.	$^{4}/_{5}$ „	156	54	68	46	$^{28}/_{9}$ 01	**Helbredet** * Siden $^{4}/_{11}$ 98 kun faa spredte Knuder. $^{22}/_{6}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
136	K.	21	3	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{10}/_{5}$ „	105	35	2	4	—	**Helbredet** * Siden $^{31}/_{5}$ 99 kun en lille recidiverende Knude. $^{2}/_{5}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
137	K.	46	6	**Meget udbredt.** Næse, Læber, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød. 1900: Underlæbe, Gane.	$^{10}/_{5}$ „	169	107	142	133		**Partielt helbredet.** 1900: Ny ondartet Affekt. af Underlæben. $^{20}/_{1}$ 02: Næsten overalt Arvæv. Endnu Saar paa Underlæben, desuden enkelte Knuder.
138	K.	27	13	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød, Gane, Svælg.	$^{11}/_{5}$ „	190	126	55	92	—	**Forbigaaende Bedring.** Gentagne Udbrud fra den ondartede Slimhindelidelse.
* 139	K.	20	15	**Meget udbredt.** Næse, Læber, begge Kinder, Hage, Hals, h. Øre.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane.	$^{19}/_{5}$ „	168	150	84	36	—	**Næsten helbredet.** Ondartet Tilfælde, total Destruktion af Læber. $^{23}/_{8}$ 02: Godt Arvæv, kun faa tvivlsomme Knuder. Slimhinderne endnu ulcererede.
140	K.	16	3	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule, Tandkød.	$^{31}/_{5}$ „	86	44	68	11	$^{28}/_{5}$ 01	**Helbredet** * Siden $^{31}/_{1}$ 99 kun smaa Udbrud fra den haardnakkede Lidelse i Næsehulen.

* Se Tavle VII, VIII & IX.

No.	Kon	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 98	99	1900	01	Sidst behandlet	Resultat
* **141**	K.	30	15	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	1/6 98	131	—	—	—	29/10 98	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 30.
142	K.	13	4	**Lille.** H. Kind.	—	2/6 „	26	7	36	6	—	**Forbigaaende Bedring.** Uregelmæssig Behandling. Gentagne smaa Recidiver.
* **143**	K.	43	19	**Middelstor.** Næse, begge Kinder, Overlæbe.	Næsehule.	2/6 „	132	—	—	—	2/11 98	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 31.
144	K.	62	8	**Middelstor.** Næse, h. Kind, h. Haand	Næsehule.	3/6 „	123	—	8	—	2/7 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 32.
145	K.	39	8	**Lille.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	3/6 „	103	25	—	—	—	**Helbredet** * 1900—01: Solbehandling i Hjemmet. 30/6 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
146	K.	50	10	**Middelstor.** H. Tinding.	—	11/6 „	72	51	—	—	16/12 99	**U. K. Negativt Resultat.** Kun forbigaaende Bedring. Affekt. meget stærkt pigmenteret.
147	K.	8	2	**Lille.** V. Kind.	—	15/6 „	26	—	—	—	12/8 98	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 33.
148	K.	35	6	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe, Tandk., Strube	18/6 „	139	62	140	46	—	**Næsten helbredet.** Siden 1901 godt Arvæv, kun faa Knuder.
* **149**	M.	14	7	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane, Svælg, Strube.	20/6 „	126	98	2	—	6/1 00	**Helbredet** * **Død** 9/5 01 af Empyem. Sygehistorie Nr. 125.
* 150	K.	30	5	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød, Gane.	21/6 „	139	57	20	14	5/11 01	**Helbredet** * Siden 1899 kun et haardnakket Saar i v. Vestibulum og forreste Næseborsvinkel. 8/7 02: Ikke Sygdomstegn.
151	M.	58	30	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, begge Ører.	Næsehule, Gane.	21/6 „	157	—	—	—	22/12 98	**U. K. Negativt Resultat.** Ringe Paavirkning, haabløst Tilfælde.
* **152**	K.	24	20	**Meget udbredt.** Næse, begge Kin-	Næsehule.	22/6 „	165	152	91	—	25/9 00	**Helbredet** * **Død** 13/3 01 af Tb. pulm. Sygehistorie Nr. 126.

				begge Kinder.									rerende Infiltrationer.
154	K.	74	25	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{27}/_{6}$ „	105	—	8	—	—	**Næsten helbredet.** $^{17}/_{8}$ 00: Godt Arvæv, 2 smaa Knuder. $^{19}/_{4}$ 02: Enkelte smaa Knuder, Saar i Vestibulum.
155	K.	18	6	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{27}/_{6}$ „	132	17	2	—	—	**Helbredet.** * $^{25}/_{2}$ 02: Godt Arvæv, kun en enkelt Knude paa Overlæben. $^{10}/_{6}$ Brev: Ikke Sygdomstegn.
156	K.	14	6	**Stor.** Næse, Læber, begge Kinder.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane, Svælg, Strube.	$^{28}/_{6}$ „	159	217	79	135	—	**Partielt helbredet.** Delvis solidt Arvæv, stadig Udbrud om Næse og Mund fra den ondartede Slimhindeaffekt.
157	K.	34	16	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Strube.	$^{28}{}_{6}$ „	131	106	123	27	$^{20}/_{10}$ 01	**Næsten helbredet.** Siden $^{11}/_{7}$ 00 solidt Arvæv, kun faa spredte Knuder. $^{8}/_{7}$ 02: Enkelte spredte smaa Knuder.
158	K.	31	24	**Stor.** V. Kind, h. Øre, v. Arm og Haand.	—	$^{28}{}_{6}$ „	108	—	40	—	$^{29}/_{6}$ 00	**U. K. Udebleven.** Forbigaaende Bedring. Uregelmæssig Behandling.
159	K.	18	10	**Middelstor.** Næse, v. Kind.	Næsehule.	$^{29}/_{6}$ „	126	8	—	—	$^{10}/_{1}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 34.
160	K.	28	9	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, h. øvre Øjel.	Næsehule, Overlæbe, Tandk., Strube	$^{1}/_{7}$ „	130	107	—	—	$^{27}/_{9}$ 99	**U. K. Død** $^{1}/_{11}$ 00 af Tb. pulm. Siden $^{25}/_{2}$ 99 kun faa spredte Knuder.
161	K.	60	45	**Stor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{2}/_{7}$ „	81	—	—	—	$^{30}/_{9}$ 98	**Helbredet** * **Død** Marts 99 af Tb. pulm. Sygehistorie Nr. 127.
162	K.	27	8	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{5}/_{7}$ „	55	—	—	—	$^{5}/_{9}$ 98	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 35.
163	K.	17	$2^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse, v. Kind, v. Øjebryn, h. Arm.	—	$^{5}/_{7}$ „	67	24	—	—	$^{16}/_{12}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 36.
164	K.	24	6	**Lille.** Næse, v. Kind.	Næsehule, Tandkød.	$^{5}{}_{7}$ „	57	22	2	2	$^{13}/_{8}$ 01	**Næsten helbredet.** Siden $^{30}/_{4}$ 99 kun enkelte spredte Knuder. $^{6}/_{9}$ 02: En lille Knude.
165	K.	19	15	**Lille.** H. Kind.	—	$^{6}/_{7}$ „	5	—	—	—	$^{28}/_{7}$ 98	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 37.
166	K.	50	16	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet.	Næsehule, Læber.	$^{7}/_{7}$ „	80	98	—	—	$^{20}/_{11}$ 99	**U. K. Udebleven.** (Økonomiske Grunde); væsentlig bedret. (Tb. pulm.)
167	K.	31	$^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{8}{}_{7}$ „	93	23	25	5	$^{23}/_{3}$ 01	**Helbredet** * Gentagne smaa Udbrud fra Slimhinden. $^{7}/_{6}$ 02: Ikke Sygdomstegn.

* Se Tavle X, XI, XII, XIII & XIV.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger				Sidst behandlet	Resultat
							98	99	1900	01		
168	K.	24	19	**Middelstor.** V. Kind, v. Arm.	Næsehule.	$^{11}/_{7}$ 98	64	—	—	—	$^{13}/_{10}$ 98	**U. K. Udebleven** (Bortrejse). Næsten helbredet. $^{24}/_{10}$ 02: Paa Kinden kun en Knude.
169	K	22	9	**Middelstor.** Næse, begge Kinder, Overlæbe.	Næsehule, Svælg, Strube.	$^{18}/_{7}$ „	131	27	—	67	$^{18}/_{9}$ 01	**Helbredet*** Gentagne smaa Udbrud fra Slimhinderne. $^{7}/_{5}$ 02: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
170	K.	26	10	**Stor.** V. Kind, Hals.	—	$^{23}/_{7}$ „	79	—	26	—	$^{13}/_{6}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 38.
171	K	25	12	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{27}/_{7}$ „	78	—	—	—	$^{26}/_{10}$ 98	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 39.
172	K.	28	15	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	—	$^{29}/_{7}$ „	53	52	28	—	—	**Helbredet*** $^{15}/_{7}$ 02: Godt Arvæv, enkelte smaa Knuder. $^{29}/_{9}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
173	K.	36	10	**Middelstor.** Næse, h. Kind, Overlæbe.	Næsehule.	$^{6}/_{8}$ „	77	40	15	—	$^{27}/_{11}$ 00	**Helbredet*** **Død** $^{9}/_{12}$ 01 af Mb. cordis. Sygehistorie Nr. 128.
174	K.	36	$6^{1}/_{2}$	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, h. Tinding.	Næsehule.	$^{9}/_{8}$ „	53	52	49	2	$^{29}/_{11}$ 01	**Helbredet*** $^{29}/_{5}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
175	M.	44	$3^{1}/_{2}$	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{9}/_{8}$ „	124	33	—	—	$^{8}/_{2}$ 99	**Helbredet*** **Død** $^{13}/_{10}$ 99 af Tb. miliaris. Sygehistorie Nr. 129.
176	K.	45	$^{1}/_{2}$	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, v. Kind.	Næsehule.	$^{11}/_{8}$ „	133	75	—	—	$^{29}/_{4}$ 99	**U. K. Død** $^{27}/_{9}$ 99 af Mb. cordis. Ringe Paavirkning.
177	K.	34	19	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Hals, v. Arm.	Næsehule, Strube.	$^{11}/_{8}$ „	122	36	—	6	$^{17}/_{7}$ 01	**Næsten helbredet.** Siden $^{12}/_{12}$ 98 kun faa spredte Knuder. Meget lidende af Tb. pulm. $^{7}/_{5}$ 02 Brev: Tilfreds med Resultatet.
178	K.	33	20	**Stor.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule, Tandkød.	$^{11}/_{8}$ „	122	118	110	68	—	**Næsten helbredet.** $^{5}/_{9}$ 02: Solidt Arvæv, 3 tvivlsomme Knuder.
179	K.	66	20	**Stor.** Næse, begge Kinder	Næsehule.	$^{12}/_{8}$ „	53	—	74	26	—	**Næsten helbredet.** 1900 ret stort Recidiv. Siden ^{13} (X) [illegible] enkelte Knuder [illegible]

181	K.	37	8	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{13}/_{8}$ „	27	—	—	—	$^{13}/_{9}$ 98	**Helbredet.**	Sygehistorie Nr. 40.
182	K.	23	7	**Lille.** V. Kind.	—	$^{15}/_{8}$ „	29	—	—	—	$^{16}/_{11}$ 98	**Helbredet.**	Sygehistorie Nr. 41.
183	K.	29	20	**Stor.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule, Tandkød.	$^{16}/_{8}$ „	111	50	—	—	$^{28}/_{2}$ 99	**Helbredet.**	Sygehistorie Nr. 42.
184	M.	25	6	**Lille.** Næse, Overlæbe, V. Kind.	Næsehule.	$^{18}/_{8}$ „	45	—	—	—	$^{4}/_{11}$ 98	**Helbredet.**	Sygehistorie Nr. 43.
185	K.	20	5	**Meget udbredt.** Næse, Læber, begge Kinder, Hage, Hals, Bryst.	Næsehule, Læber, Tandkød.	$^{22}/_{8}$ „	113	228	200	170	—	**Næsten helbredet.**	Ondartet Tilfælde, voxede den første Tid trods Behandlingen. $^{24}/_{8}$ 02: Godt Arvæv, kun faa Knuder. Ved Næseborsrandene smaa Saar. (Tb. pulm.)
186	K.	23	8	**Meget udbredt.** Næse, Læber, begge Kinder.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane, Strube.	$^{22}/_{8}$ „	112	209	253	281	-	**Ringe Paavirkning.**	Stor Destruktion af Læberne og enorm Infiltration; kun ringe Udsigt til fuldstændig Helbredelse.
187	K.	52	33	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{2}/_{9}$ „	103	52	39	60	—	**Partielt helbredet.**	Gentagne Udbrud fra Næsehulen.
188	M.	17	8	**Meget udbredt.** Kapillitiet, Hals, begge Overextremiteter, v. nates.	-	$^{3}/_{9}$ „	73	310	142	—	$^{22}/_{6}$ 00	**Partielt helbredet.**	$^{28}/_{11}$ 00: Hovedet og Hals tilsyneladende helbredet. Extremiteterne i god Bedring.
189	K.	26	6	**Meget udbredt.** Kinder, Hage, Hals.	—	$^{6}/_{9}$ „	53	50	48	19	—	**Næsten helbredet.**	Uregelmæssig Behandling. $^{15}/_{8}$ 02: Godt Arvæv, enkelte smaa Knuder.
190	K.	45	10	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet.	Næsehule, Overlæbe.	$^{6}/_{9}$ „	100	258	—	—	$^{19}/_{11}$ 99	**U. K. Død**	$^{21}/_{12}$ 99 af Tb. pulm. Ringe Paavirkning.
191	M.	38	$^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse.	—	$^{5}/_{9}$ „	26	—	17	—	$^{22}/_{9}$ 00	**Helbredet.**	Sygehistorie Nr. 44. (Tb. pulm.)
192	K.	16	4	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{8}/_{9}$ „	79	2	23	—	$^{19}/_{12}$ 00	**Helbredet** *	Siden $^{6}{}_{12}$ 98 kun enkelte smaa Knuder. $^{29}/_{5}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
193	K.	44	8	**Middelstor.** Næse, V. Kind.	—	$^{7}/_{9}$ „	31	19	—	17	$^{3}/_{8}$ 01	**U. K. Negativt Resultat.**	Uregelmæssig Behandling med forbigaaende Bedring.
194	M	19	8	**Stor.** Næse, Overlæbe, V. Kind.	Næsehule, Strube.	$^{6}/_{9}$ „	99	11	—	—	$^{14}/_{1}$ 99	**U. K. Død**	Foraaret 99 af Tb. pulm. Ringe Paavirkning.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 98	99	1900	01	Sidst behandlet	Resultat
195	K.	45	$1^1/_2$	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	$^{12}/_9$ 98	94	107	66	63	—	**Næsten helbredet.** Uregelmæssig Behandling. $^{18}/_6$ 02: Kun paa Næsevingerne enkelte smaa Saar og Knuder.
196	K.	42	20	**Stor.** Næse, h. Kind.	—	$^{13}/_9$ „	78	89	49	36	—	**Næsten helbredet.** Siden $^{25}/_3$ 99 kun faa dybe Knuder. (Tb. pulm.)
197	M.	28	18	**Meget udbredt.** Hele Ansigt, h. Øre, Hals, begge Overextremiteter.	Næsehule, Svælg.	$^{13}/_9$ „	92	209	—	318	—	**Næsten helbredet.** Behandling afbrudt fra $^{12}/_8$ 99—$^8/_3$ 01. $^{31}/_7$ 02: Godt Arvæv, kun faa spredte Knuder. (Tb. pulm.)
198	K.	29	15	**Meget udbredt.** Næse, Læber, begge Kinder, Hage, Hals.	Næsehule, Tandkød.	$^{14}/_9$ „	65	206	104	6	$^{10}/_7$ 01	**Helbredet** * $^{20}/_7$ 01: Ikke tydelige Sygdomstegn; senere ikke set.
199	K.	45	35	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hage h. Arm.	Næsehule.	$^{20}/_9$ „	81	236	81	130	—	**Næsten helbredet.** $^{18}/_6$ 02: Godt Arvæv, ikke tydelige Knuder, enkelte tvivlsomme Pletter. (Tb. pulm.)
200	K.	37	18	**Middelstor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{26}/_9$ „	54	—	—	—	$^{26}/_{11}$ 98	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 45.
201	K.	18	1	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{26}/_9$ „	22	14	79	—	$^{14}/_{11}$ 00	**Helbredet** * $^{18}/_6$ 02: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
202	K.	22	8	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder	Næsehule, Gane.	$^{29}/_9$ „	80	127	129	98	—	**Væsentlig bedret.** Ondartet Slimhindelidelse, gentagne Udbrud paa Huden.
203	K.	56	23	**Stor.** Hele Ansigtet.	Næsehule.	$^4/_{10}$ „	27	—	—	—	$^5/_{11}$ 98	**U. K. Død** Septbr. 99. Tilfældet kompliceret med ulcus cancros. nasi.
204	K.	19	8	**Lille.** Næse, Hals.	Næsehule.	$^{10}/_{10}$ „	71	7	—	—	$^9/_1$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 46.
205	K.	27	14	**Lille.** H. Kind.	—	$^{10}/_{10}$ „	11	—	—	—	$^{24}/_{10}$ 98	**U. K. Udebleven.**
206	K.	12	1	**Lille.** Næse, Over-	Næsehule.	$^{14}/_{10}$ „	50	43	75	57	—	**Næsten helbredet** Ondartet Tilfælde med

208	K.	39	30	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{\cdot\cdot}/_{10}$ „	59	185	62	—	$^{\cdot}/_{9}$ 00	**Helbredet** $^{\cdot\cdot}$ $^{\cdot\cdot}/_{10}$ 02: Solidt Arvæv, ikke Sygdomstegn.
209	K.	38	20	**Stor.** H. Kind.	—	$^{22}/_{10}$ „	54	62	46	64	—	**Væsentlig bedret.** Dyb lupøs Infiltration, langsom Fremgang.
210	K.	13	2	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, v. Kind.	Næsehule, Tandkød.	$^{26}/_{10}$ „	56	22	—	—	$^{26}/_{1}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 47. (Tb. pulm.)
211	K.	23	5	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, v. Overarm.	Næsehule, Tandkød.	$^{28}/_{10}$ „	55	195	62	206	—	**Næsten helbredet.** Uregelmæssig Behandling. $^{5}/_{8}$ 02: Godt Arvæv, faa spredte Knuder. (Tb. pulm.)
✱ **212**	K.	29	13	**Meget udbredt.** Begge Kinder, Pande, Hals, begge Overextremiteter.	Næsehule, Tandkød, Strube.	$^{29}/_{10}$ „	72	309	245	270	—	**Helbredet.** (For Ansigtets Vedkommende). Sygehistorie Nr. 48.
213	M.	20	8	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{1}/_{11}$ „	52	64	—	—	$^{16}/_{3}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 49.
214	K.	15	2	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Krop, Extremiteter.	Næsehule, Gane, Strube.	$^{1}/_{11}$ „	26	122	438	329	—	**Ringe Paavirkning.** Haabløst Tilfælde, overalt spredte Affekt.; Lidelsen breder sig trods Behandling.
215	M.	37	10	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, begge Ører, Hals.	Næsehule, Gane.	$^{2}/_{11}$ „	51	212	179	188	—	**Næsten helbredet.** $^{9}/_{6}$ 02: Kun faa spredte Knuder.
216	K.	38	23	**Meget udbredt.** Næse, h. Kind, Pande, Hals, v. Arm og Fod.	—	$^{2}/_{11}$ „	51	289	—	—	$^{12}/_{12}$ 99	**U. K. Sygdom.** Kendelig Bedring.
217	K.	41	13	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød, Gane.	$^{7}/_{11}$ „	46	55	—	4	—	**Partielt helbredet.** Recidiv efter c. 2 Aar. Fra $^{16}/_{3}$ 99: Ikke Sygdomstegn. August 1901: Lille Saar i v. Næseborsvinkel. $^{19}/_{6}$ 02: Stort Saar samme Sted med Knuder i Omfanget. (Tb. pulm.).

✱ Se Tavle XV & XVI.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 98	99	1900	01	Sidst behandlet	Resultat
218	M.	34	20	**Stor.** Næse, Overlæbe, v. Kind, h. Tommel.	Næsehule, Overlæbe, Tandk., Gane, Svælg.	$^{8}/_{11}$ 98	46	101	—	—	$^{3}/_{5}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 50.
219	K.	21	7	**Meget udbredt.** V. Kind, Hage, Hals.	Tandkød.	$^{8}/_{11}$ „	46	22	40	40	—	**Helbredet** * Siden Januar 99 kun faa spredte Knuder. $^{21}/_{7}$ 02: Godt Arvæv. Ikke Sygdomstegn.
220	K.	36	28	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hage, Hals, v. Laar.	Næsehule, Læber.	$^{8}/_{11}$ „	46	179	31	39	—	**Næsten helbredet.** $^{4}/_{2}$ 02: Solidt Arvæv, enkelte smaa Knuder.
221	K.	20	3	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kind.	Næsehule. —	$^{8}/_{11}$ „	46	121	67	95	—	**Næsten helbredet.** $^{5}/_{6}$ 02: Solidt Arvæv, kun 1 tvivlsom Knude.
222	K.	14	14	**Meget udbredt.** V. Øre, Kind, Pande, Hals, v. Laar.		$^{11}/_{11}$ „	42	259	172	156	—	**Væsentlig bedret.** Langsom Fremgang. $^{6}/_{9}$ 02: Kun spredte Knuder.
223	M.	21	11	**Meget udbredt.** Næse, Læber, begge Kinder, Hage.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane, Tunge. Næsehule.	$^{14}/_{11}$ „	34	235	262	163	—	**Ringe Paavirkning.** Haabløst Tilfælde med stærk Destruction og dyb lupøs Infiltration.
224	K.	30	16	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, v. Kind.	Næsehule, Tandkød. —	$^{14}/_{11}$ „	41	116	28	23	—	**Næsten helbredet.** Siden Marts 99 kun faa spredte Knuder. $^{7}/_{4}$ 02: Godt Arvæv, kun paa prolab. sup. et lille Saar.
* **225**	K.	24	5	**Middelstor.** Næse, Overlæbe.		$^{14}/_{11}$ „	41	60	—	—	$^{15}/_{3}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 51.
226	K.	26	5	**Middelstor.** Næse, begge Kinder, Pande.	—	$^{16}/_{11}$ „	39	7	27	—	$^{15}/_{9}$ 00	**U. K. Udebleven.** Væsentlig bedret. Behandlingen afbrudt af økonomiske Grunde.
227	K.	49	10	**Meget udbredt.** Næse, begge Kin-		$^{19}/_{11}$ „	33	124	—	—	—	**Næsten helbredet.** Uregelmæssig Behandling. $^{11}/_{9}$ 02: Godt Arvæv, en Del fælste

				begge Kinder.									
229	M.	18	$2^1/_2$	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule, Tandkød.	$^{28}/_{11}$ „	29	40	—	—	$^{13}/_2$ 99	**U. K. Udebleven** uden at angive Grund. Væsentlig bedret; senere forværret.
230	K.	41	25	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Pande.	Næsehule, Overlæbe.	$^1/_{12}$ „	26	163	—	—	$^8/_{11}$ 99	**Næsten helbredet.** Afbrudt af økonomiske Grunde. $^{13}/_2$ 02: Godt Arvæv, hvori en Del spredte Knuder.
231	K.	65	20	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, øvre Øjelaag.	Næsehule.	$^2/_{12}$ „	25	71	30	109	—	**Næsten helbredet.** Uregelmæssig Behandling. $^{19}/_8$ 02: Kun enkelte Knuder.
232	M.	48	14	**Middelstor.** Næse, h. Kind.	Næsehule.	$^2/_{12}$ „	25	141	82	17	—	**Næsten helbredet.** Siden 1900 godt Arvæv, kun paa Næsen smaa recidiverende Saar. (Tb. pulm.).
233	K.	27	20	**Meget udbredt.** H. Haand og Arm, v. Ben.	—	$^2/_{12}$ „	25	332	83	—	$^3/_9$ 00	**Helbredet** * $^2/_4$ 02: Godt Arvæv, ikke tydelige Sygdomstegn.
234	K.	21	16	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, v. Øre.	Næsehule, Tandkød, Gane	$^3/_{12}$ „	24	100	68	59	—	**Næsten helbredet.** Foraaret 02 Tb. pulm., samtidig Udbrud af en Del friske Knuder.
235	M	23	15	**Middelstor.** Hals.	—	$^5/_{12}$ „	22	30	—	—	$^4/_2$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 53.
236	K.	38	31	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, øvre Øjelaag, h. Øre, Hals.	Næsehule.	$^5/_{12}$ „	15	192	206	310	—	**Næsten helbredet.** $^{19}/_9$ 02: Godt Arvæv, kun faa spredte Knuder.
237	M.	27	13	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	$^{10}/_{12}$ „	18	122	106	—	$^{19}/_{12}$ 00	**Helbredet** * $^{17}/_{12}$ 01: Ikke tydelige Sygdomstegn.
238	M.	18	10	**Lille.** Næse.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød, Gane.	$^{12}/_{12}$ „	17	60	—	—	$^{12}/_3$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 54.
* 239	K.	16	$2^1/_2$	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Hals.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane.	$^{15}/_{12}$ „	13	199	81	38	—	**Næsten helbredet.** Siden April 1900 godt Arvæv, kun enkelte spredte Knuder. (Tb. pulm.).

★ Se Tavle XVII & XVIII.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 98	99	1900	01	Sidst behandlet	Resultat
240	K.	20	5	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, V. Kind.	Næsehule.	$^{15}/_{12}$ 98	13	113	48	78	—	**Næsten helbredet.** Siden 1899 kun et haardnakket Saar i og ved v. Mundvig.
241	M.	17	12	**Meget udbredt.** Næse, Læber, begge Kinder, v. øvre Øjelaag, Hals.	Næsehule.	$^{17}/_{12}$ „	12	107	75	—	$^{26}/_{11}$ 00	**Helbredet** * $^{5}/_{4}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.).
242	K.	33	17	**Middelstor.** V. Kind.	Næsehule.	$^{28}/_{12}$ „	4	104	45	—	—	**Næsten helbredet.** Siden 1900 kun enkelte smaa Knnder.
243	M.	19	3	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule.	$^{28}/_{12}$ „	4	51	—	—	$^{28}/_{2}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 55.
* 244	M.	16	7	**Stor.** Næse, Læber, begge Kinder.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane.	$^{3}/_{1}$ 99	—	240	14	4	$^{6}/_{4}$ 01	**Helbredet** * $^{20}/_{5}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
245	K.	13	2	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{4}/_{1}$ „	—	94	—	—	$^{24}/_{4}$ 99	**Helbredet** * **Død** Juli 1900 af Tb. pulm. Sygehistorie Nr. 130.
246	K.	37	19	**Middelstor.** Næse, h. Kind.	—	$^{6}/_{1}$ „	—	69	13	4	$^{30}/_{8}$ 01	**Helbredet** * Siden Marts 99 kun faa Knuder. $^{30}/_{4}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
247	K.	55	20	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød.	$^{6}/_{1}$ „	—	97	2	41	—	**Helbredet** * Decbr. 1900: Lille Recidiv efter $1^{1}/_{2}$ Aar. $^{3}/_{7}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
248	K	19	6	**Stor.** Næse, Læber, begge Kinder.	Tandkød, Gane, Strube.	$^{6}/_{1}$ „	—	142	19	2	$^{20}/_{6}$ 01	**Helbredet** * $^{18}/_{6}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
249	K.	32	$3^{1}/_{2}$	**Stor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{7}/_{1}$ „	—	125	—	—	$^{7}/_{6}$ 99	**U. K. Død** Febr. 00. Næsten helbredet. $^{30}/_{9}$ 99 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
* **250**	K.	34	4	**Stor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{9}/_{1}$ „	—	101	—	—	$^{8}/_{5}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 56.
251	M.	20	10	**Meget udbredt.** Næse, Læber	Næsehule,	$^{9}/_{1}$ „	—	302	280	238	—	**Næsten helbredet.** $^{3}/_{4}$ 02: Overalt godt

				extremitet.									
* **252**	M.	6	3	**Lille.** V. Kind.	—	$^{10}/_{1}$ „	—	10	—	—	$^{11}/_{7}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 57.
253	M.	43	38	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, h. Øre, v. Albu.	Næsehule.	$^{11}/_{1}$ „	—	313	212	268	—	**Væsentlig bedret.** Svært Tilfælde med dyb Infiltration. $^{12}/_{10}$ 02 Obs.: God Ardannelse, endnu spredte Knuder.
254	K.	29	$^{3}/_{4}$	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{13}/_{1}$ „	—	45	—	—	$^{11}/_{3}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 58.
255	M.	49	10	**Middelstor.** V. Haand.	—	$^{14}/_{1}$ „	—	50	—	—	$^{11}/_{3}$ 99	**U. K. Udebleven.** Væsentlig bedret. $^{4}/_{12}$ 1900 Brev: Endnu Rester af Affectionen. Senere intet hørt.
256	K.	36	4	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, v. Kind.	Næsehule.	$^{18}/_{1}$ „	—	129	23	17	$^{12}/_{7}$ 01	**Helbredet** * Siden Mai 99 kun faa Knuder. $^{10}/_{12}$ 01 Brev: Ikke Sygdomstegn.
257	K.	44	10	**Stor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{19}/_{1}$ „	—	85	10	29	—	**Næsten helbredet.** Siden April 99 kun enkelte spredte Knuder. $^{1}/_{8}$ 02: Godt Arvæv, 2 hampefrøstore Saar.
258	M.	39	25	**Stor.** Begge Kinder, h. Øre og øvre Øjelaag, Hals.	—	$^{24}/_{1}$ „	—	62	—	—	$^{9}/_{5}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 59.
259	M.	4	$^{7}/_{12}$	**Lille.** H. Kind.	—	$^{25}/_{1}$ „	—	8	—	—	$^{23}/_{3}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 60.
260	K.	26	23	**Meget udbredt.** H. Arm og Fod.	—	$^{1}/_{2}$ „	—	75	-	—	$^{13}/_{5}$ 99	**U. K. Udebleven.** Kendelig Bedring.
261	M.	57	15	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Gane.	$^{1}/_{2}$ „	—	51	18	9	—	**Næsten helbredet.** Siden Juni 99 kun paa Næsen enkelte Knuder. (Tb. pulm.).
262	K.	17	8	**Stor.** Næse, Overlæbe, v. Kind, begge øvre Øjelaag, Hals.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane.	$^{1}/_{2}$ „	—	178	101	28	—	**Næsten helbredet.** Siden Septbr. 00 kun enkelte Knuder ved Næseborskanten. (Tb. pulm.).
263	M.	17	12	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, H. Haand og Fod.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane.	$^{1}/_{2}$ „	—	180	76	34	$^{3}/_{5}$ 01	**Helbredet** * Mai 02: Godt Arvæv, ikke tydelige Sygdomstegn.
264	K.	29	1	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{2}/_{2}$ „	—	55	—	—	$^{13}/_{4}$ 99	**Helbredet** * $^{4}/_{1}$ 00 Brev: Ikke Sygdomstegn. Ikke set senere.
265	K.	25	$2^{1}/_{2}$	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød, Gane.	$^{2}/_{2}$ „	—	140	10	—	$^{20}/_{11}$ 00	**Næsten helbredet.** Siden Juli 99 kun enkelte smaa Knuder. $^{20}/_{10}$ 02: Smukt Arvæv; ialt 5 smaa Knuder.

* Se Tavle XIX, XX & XXI.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1899	1900	1901	Sidst behandlet	Resultat
* 266	K.	23	7	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, v. Kind.	Næsehule.	$^{2}/_{2}$ 99	90	—	—	$^{19}/_{5}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 61.
267	M.	17	3	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, v. Kind.	Næsehule, Gane, Svælg.	$^{3}/_{2}$ „	101	123	—	—	**Helbredet** * Uregelmæssig Behandling. $^{7}/_{6}$ 02: Godt Arvæv. Ikke Sygdomstegn.
268	M.	$7^{1}/_{2}$	$3^{1}/_{2}$	**Middelstor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{3}/_{2}$ „	64	17	9	—	**Næsten helbredet.** Siden Aug. 99 kun faa spredte Knuder.
269	K.	12	2	**Middelstor.** V. Kind.	—	$^{8}/_{2}$ „	21	—	9	—	**Næsten helbredet.** Siden April 99 kun enkelte smaa Knuder.
270	K.	44	11	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, v. Arm.	—	$^{14}/_{2}$ „	191	53	51	—	**Væsentlig bedret.** Uregelmæssig Behandling. $^{7}/_{4}$ 02: Delvis godt Arvæv, kun paa Næsen en Del Knuder.
271	K.	23	7	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{15}/_{2}$ „	73	11	6	—	**Næsten helbredet.** Siden $^{20}/_{5}$ 99: Godt Arvæv, med gentagne Udbrud af faa, smaa Knuder.
272	K.	13	2	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{15}/_{2}$ „	123	14	16	—	**Helbredet** * Oprindelige Affekt. helet, paa Prolabium sup. af og til Fissurer og smaa Saar. $^{1}/_{10}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
273	M.	11	$1^{1}/_{2}$	**Middelstor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule, Gane.	$^{16}/_{2}$ „	18	—	102	—	**Næsten helbredet.** Udebleven $^{11}/_{4}$ 99—$^{2}/_{8}$ 01 paa Grund af Øjenlidelse. $^{11}/_{4}$ 02: Kun faa spredte Knuder.
274	K.	10	$^{5}/_{12}$	**Lille.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{18}/_{2}$ „	60	—	—	$^{11}/_{5}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 62.
275	K.	48	2	**Middelstor.** H. Kind.	Næsehule.	$^{20}/_{2}$ „	49	36	38	—	**Væsentlig bedret.** Uregelmæssig Behandling. Gentagne Udbrud af dybe Knuder.
* 276	M.	40	9	**Middelstor.**	Næsehule.	$^{20}/_{2}$ „	105	—	—	$^{23}/_{6}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 63.

				der, Pande.								
278	K.	20	2	**Lille.** Næse, h. Kind.	Næsehule.	$^{24}/_{2}$ „	37	9	5	$^{27}/_{7}$ 01	**Helbredet** *	$^{6}/_{1}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
279	K.	26	3	**Lille.** Næse, h. Kind.	Næsehule.	$^{27}/_{2}$ „	82	41	86	—	**Helbredet** *	Siden 00 kun ved Næseborsranden smaa Saar. $^{18}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomst.
280	K.	17	1	**Lille.** Næse. 01: Overlæbe, h. Kind.	Næsehule, Gane. 01: Strube.	$^{27}/_{2}$ „	102	80	25	$^{10}/_{8}$ 01	**U. K. Død**	Decbr. 01. Næsten helbredet. 01: Tb. pulm., samtidig lille Udbrud.
281	K.	45	4	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{3}/_{3}$ „	77	26	8	$^{4}/_{3}$ 01	**U. K. Udebleven**	af økonomiske Grunde. Næsten helbredet, siden Juni 99 kun faa spredte Knuder.
282	K.	29	15	**Middelstor.** Begge Ører, v. Arm.	Tandkød.	$^{6}/_{3}$ „	80	—	—	$^{7}/_{7}$ 99	**U. K. Sygdom**	Næsten helbredet. $^{10}/_{4}$ 02 Brev: Godt Arvæv, endnu enkelte Knuder.
283	K.	8	1	**Lille.** Næse, Overlæbe, v. Kind.	Næsehule.	$^{7}/_{3}$ „	30	—	—	$^{26}/_{6}$ 99	**Helbredet.**	Sygehistorie Nr. 64.
284	M.	14	10	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	$^{11}/_{3}$ „	234	205	146	—	**U. K. Udebleven.**	(Pauperisme). Væsentlig bedret.
285	K.	58	$6^{1}/_{2}$	**Stor.** Næse, begge Kinder, Hage, Hals.	Næsehule.	$^{20}/_{3}$ „	146	—	—	$^{19}/_{8}$ 99	**Helbredet** *	**Død** $^{27}/_{2}$ 00 af Pneumoni. Sygehistorie Nr. 131.
286	K.	39	27	**Middelstor.** V. Kind.	—	$^{24}/_{3}$ „	114	4	40	—	**Næsten helbredet.**	Siden Januar 00: Godt Arvæv, kun faa spredte Knuder.
287	K.	35	10	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule.	$^{27}/_{3}$ „	75	28	—	$^{7}/_{8}$ 00	**Næsten helbredet.**	$^{13}/_{7}$ 02. Enkelte tvivlsomme Knuder, som Pt. ikke ænser.
288	K.	30	5	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{5}/_{4}$ „	96	29	52	—	**Forbigaaende Bedring.**	Recidiv 2 Gange ved akut Sygdom. (Paurperisme).
289	K.	28	13	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød, Gane, Svælg.	$^{6}/_{4}$ „	214	265	266	—	**Væsentlig bedret.**	Ondartet Tilfælde, næppe Udsigt til Helbredelse.
* 290	K.	38	4	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet.	Næsehule, Overlæbe, Tandk., Gane.	$^{6}/_{4}$ „	153	77	14	$^{9}/_{9}$ 01	**Helbredet** *	$^{12}/_{3}$ 02: Ikke Sygdomstegn.

* Se Tavle XXII, XXIII & XXIV.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1899	1900	1901	Sidst behandlet	Resultat
291	M.	46	20	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, v. Øre.	Næsehule.	7/4 99	153	31	12	—	**Helbredet** * Siden Oktbr. 99 kun faa Knuder. 10/8 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
292	M.	25	13	**Stor.** H. Kind.	—	7/4 „	88	107	84	—	**Væsentlig bedret.** Langsom Fremgang. Dyb Infiltration med Udbrud af spredte Knuder.
293	M.	19	5	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	8/4 „	78	—	—	8/7 99	**U. K. Død** 2/5 00. **Næsten helbredet.** Tb. pulm. et laryngis.
294	K.	33	19	**Meget udbredt.** Næse, begge Kinder, v. Arm.	Næsehule.	10/4 „	73	88	37	—	**Næsten helbredet.** Siden April 00: Godt Arvæv, kun faa spredte Knuder. (Tb. pulm.).
295	K.	66	15	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe.	11/4 „	75	—	—	29/7 99	**Helbredet** Sygehistorie Nr. 65.
296	K.	33	10	**Lille.** Næse.	Næsehule.	12/4 „	53	24	18	4/6 01	**Helbredet** * Siden Juli 99 kun et lille Saar ved Næseborsranden. 28/5 02: Ikke Sygdomstegn.
297	K.	45	24	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, h. Øre, Hals.	—	12/4 „	222	336	125	—	**Væsentlig bedret.** 5/7 02: Godt Arvæv, en Del spredte Knuder.
298	M.	20	6	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule, Tandkød.	14/4 „	65	20	23	12/12 01	**Helbredet** * 18/6 02: Ikke Sygdomstegn.
299	K.	43	30	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, h. Kind, Hals.	Næsehule.	15/4 „	54	—	9	—	**Helbredet** * 22/4 02: Ansigtet frit, under Hagen 2 smaa Knuder. 3/9 02: Ikke Sygdomstegn.
300	K.	30	15	**Middelstor.** Begge Kinder, Hals.	Næsehule.	17/4 „	55	—	—	1/7 99	**Næsten helbredet.** Senere kun enkelte smaa Knuder, der er behandlede i Hjemmet paa anden Maade.
301	K.	58	35	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe,	Næsehule.	18/4 „	186	139	62	—	**Væsentlig bedret.** Ondartet Tilfælde med dyb Infiltrat. 12/8 02: I det hele godt Ar-

				ge Kinder, Hals, begge Overextr v. nates.	Gane.							spredte Knuder. (Tb. pulm.).
303	K.	59	16	**Middelstor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{21}/_{4}$ „	154	–	—	$^{25}/_{10}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 66.	
304	M.	24	2	**Meget udbredt.** Næse, v. Kind, h. øvre Øjelaag, Hals, begge Hænder.	Næsehule.	$^{22}/_{4}$ „	142	73	15	—	**Næsten helbredet.** $^{29}/_{4}$ 02: Delvis solidt Arvæv, kun paa Næse og Hænder enkelte Knuder.	
305	K.	33	5	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{24}/_{4}$ „	39	97	93	—	**Ringe Paavirkning.** Haardnakket Lidelse i Næsehulen og ved Næseborsranden.	
306	K.	31	6	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{24}/_{4}$ „	30	3	22	$^{7}/_{7}$ 01	**Helbredet** * Haardnakket Slimhindelidelse. $^{14}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.	
307	K.	14	3	**Meget udbredt.** Næse, Læber, begge Kinder, Hage, Hals.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane.	$^{24}/_{4}$ „	148	151	158	—	**Væsentlig bedret.** Ondartet Tilfælde med store Saarflader. $^{23}/_{6}$ 02: Overalt god Ardannelse, kun spredte Knuder. (Tb. pulm.).	
308	K.	18	5	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød, Svælg, Strube.	$^{24}/_{4}$ „	73	—	—	$^{31}/_{8}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 67.	
309	K.	4	4	**Lille.** H. Arm.	—	$^{25}/_{4}$ „	1	—	—	$^{25}/_{4}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 68.	
310	M.	13	2	**Lille.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule.	$^{26}/_{4}$ „	36	40	53	—	**Væsentlig bedret.** Uregelmæssig Behandling, haardnakket Lidelse i Næsehulen.	
311	K.	35	11	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, v. Øre, Hals, alle 4 Extremiteter.	Næsehule, Tandkød, Gane.	$^{26}/_{4}$ „	181	114	198		**Partielt helbredet.** God Ardannelse, Ansigtet frit, paa Extremiteterne ret talrige spredte Knuder. Tb. pulm.	
312	K.	17	12	**Middelstor.** Læber, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød.	$^{27}/_{4}$ „	92	40	9	—	**Næsten helbredet.** Haardnakket Slimhindelidelse med gentagne smaa Udbrud. (Tb. pulm.).	
313	K.	29	6	**Lille.** Næse.	Næsehule, Tandkød.	$^{27}/_{4}$ „	30	46	50	—	**Næsten helbredet.** Haardnakket Slimhindelidelse med gentagne smaa Udbrud.	
314	K.	52	44	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, h. Øre, Hals.	Tandkød.	$^{2}/_{5}$ „	198	284	217	—	**Væsentlig bedret.** Ondartet Tilfælde, sammenhængende dyb Infiltration. $^{9}/_{5}$ 02: God Ardannelse med spredte Knuder.	

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhinde-, lupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1899	1900	1901	Sidst behandlet	Resultat
315	M.	12	7	**Middelstor.** H. Kind, Hals, v. Arm.	—	$^{3}/_{5}$ 99	56	27	—	$^{18}/_{4}$ 00	**U. K. Udebleven** af økonomiske Grunde. Væsentlig bedret.
316	K.	65	34	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Strube.	$^{3}/_{5}$ „	42	12	45	—	**Væsentlig bedret.** Uregelmæssig Behandling. (Tb. pulm.) $^{18}/_{3}$ 03: Kun faa Knuder.
317	K.	45	12	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød.	$^{3}/_{5}$ „	127	157	141	—	**Ringe Paavirkning.** Ondartet Tilfælde, har bredt sig trods Behandlingen. $^{9}/_{1}$ 02: Delvis Ardannelse.
318	K.	40	11	**Stor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{4}/_{5}$ „	132	—	—	—	**Helbredet*** $^{3}/_{6}$ 02: Overalt godt Arvæv, kun paa h. Kind en ærtstor Knude.
319	K.	23	8	**Lille.** H. Kind.	—	$^{5}/_{5}$ „	30	—	—	$^{28}/_{8}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 69.
320	K.	22	4	**Lille.** Næse	Næsehule.	$^{6}/_{5}$ „	15	8	—	—	**Næsten helbredet.** Ondartet Slimhindelidelse med gentagne smaa Udbrud.
321	K.	45	19	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød.	$^{10}/_{5}$ „	96	88	—	—	**Væsentlig bedret.** Behandlingen afbrudt fra $^{27}/_{11}$ 00—$^{9}/_{9}$ 02
322	K.	19	1	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{11}/_{5}$ „	38	—	—	$^{10}/_{7}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 70.
323	K.	36	22	**Middelstor.** Næse, Overlæbe.	—	$^{12}/_{5}$ „	91	18	8	$^{24}/_{6}$ 01	**Helbredet*** $^{21}/_{4}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
324	M.	23	19	**Stor.** V. Kind, Hals.	—	$^{13}/_{5}$ „	52	62	—	$^{14}/_{5}$ 00	**Næsten helbredet.** $^{6}/_{11}$ 00: Godt Arvæv, kun faa Knuder, der ikke ænses.
325	K.	17	3	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{15}/_{5}$ „	64	—	—	$^{29}/_{7}$ 99	**U. K. Død** Juli 00 af Tb. pulm. Næsten helbredet.
326	K.	17	10	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hage, v. Øre, Hals, Skulder.	—	$^{18}/_{5}$ „	150	214	152	—	**Væsentlig bedret.** Sammenhængende Lidelse med dyb Infiltration og Arretraktion. $^{1}/_{7}$ 02: God Ardannelse med spredte Knuder.

				Hals, h. Læg.							
329	K.	27	12	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, v. Øre, Hals.	—	$^{18}/_{5}$ „	189	320	299	—	**Næsten helbredet.** $^{3}/_{5}$ 02: Godt Arvæv, kun faa smaa Knuder.
330	M.	24	17	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Hals	Næsehule.	$^{20}/_{5}$ „	183	113	—	$^{26}/_{10}$ 00	**U. K. Død** af Tb. pulm. Væsentlig Bedring.
* **331**	K.	18	4	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød.	$^{20}/_{5}$ „	125	—	(4)	$^{15}/_{10}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 72.
332	K.	46	30	**Middelstor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{24}/_{5}$ „	41	35	98	—	**Forbigaaende Bedring.** Gentagne ret betydelige Udbrud.
333	K.	41	6	**Middelstor.** Næse, v. Kind.	Næsehule, Tandkød, Gane.	$^{24}/_{5}$ „	77	16	13	—	**Næsten helbredet.** Siden Aug. 99 kun enkelte spredte Knuder.
334	K.	33	6	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{27}/_{5}$ „	52	—	—	—	**Helbredet** * $^{19}/_{4}$ 02: Lille Recidiv fra Slimhinden. $^{19}/_{8}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
335	K.	6	$1^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse.	—	$^{29}/_{5}$ „	22	21	—	$^{1}/_{10}$ 00	**Helbredet** Sygehistorie Nr. 73.
336	K.	21	7	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{30}/_{5}$ „	188	119	—	—	**Helbredet** * 01: Lysbehandling i Berlin. $^{1}/_{1}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
337	K.	57	20	**Middelstor.** Næse, h. Kind, Pande.	Næsehule.	$^{1}/_{6}$ „	132	57	27	$^{15}/_{10}$ 01	**Helbredet** * $^{17}/_{6}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
338	K.	41	12	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød.	$^{2}/_{6}$ „	184	44	24	$^{7}/_{7}$ 01	**Helbredet*** $^{20}/_{4}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
339	K.	41	20	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{2}/_{6}$ „	94	154	—	$^{20}/_{10}$ 00	**U. K. Udebleven.** (Økonomiske Grunde). Kendelig Bedring. (Tb. pulm.).
340	K.	55	30	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Hals	Næsehule, Tandkød.	$^{3}/_{6}$ „	181	262	186	$^{9}/_{5}$ 01	**U. K. Negativt Resultat.** Haabløst Tilfælde, kun ringe Fremgang.
341	M.	48	40	**Meget udbredt.** Begge Kinder, h. Øre.	—	$^{7}/_{6}$ „	154	—	—	$^{25}/_{8}$ 99	**Væsentlig bedret.** Fortsætter Lysbehandlingen i London.

* Se Tavle XXV.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1899	1900	1901	Sidst behandlet	Resultat
342	K.	44	10	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{7}/_{6}$ 99	36	8	32	—	**Næsten helbredet.** Ondartet Slimhindelidelse, med Saar ved Næseborsranden. (Tb. pulm.).
343	M.	24	6	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{8}/_{6}$ „	71	128	103	—	**Ringe Paavirkning.** Ondartet Tilfælde med stadig nye Lokalisationer, og ossøse Affektioner.
344	K.	48	17	**Lille.** Næse, h. Kind.	Næsehule.	$^{9}/_{6}$ „	53	27	32	$^{11}/_{9}$ 01	**Helbredet** * Gentagne smaa Udbrud fra Næsehulen. $^{29}/_{4}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
345	K.	70	8	**Stor.** Næse, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	$^{10}/_{6}$ „	91	70	32	—	**Partielt helbredet.** Delvis godt Arvæv, paa Næsen gentagne smaa Udbrud. (Tb. pulm.).
346	K.	37	6	**Lille.** H. Kind.	—	$^{14}/_{6}$ „	26	43	22	$^{14}/_{12}$ 01	**Helbredet** * Siden Marts 00 kun enkelte Knuder. $^{9}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
347	M.	9	$^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{14}/_{6}$ „	60	85	62	—	**Næsten helbredet.** Uregelmæssig Behandling. $^{23}/_{6}$ 02: Ved højre Næseborsrand et lille Saar. (Tb. pulm.).
348	M.	33	10	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	—	$^{14}/_{6}$ „	118	78	—	$^{27}/_{9}$ 00	**U. K. Udebleven.** (Økonomiske Grunde). Væsentlig bedret.
* 349	M.	25	10	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Hals	Næsehule.	$^{17}/_{6}$ „	168	129	8	—	**Næsten helbredet.** Siden 00 kun faa spredte Knuder. (Tb. pulm.)
350	M.	20	8	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Hals	Næsehule, Læber, Tandkød, Strube.	$^{17}/_{6}$ „	174	253	95	$^{9}/_{4}$ 01	**Helbredet** * $^{25}/_{6}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
351	K.	12	3	**Lille.** Næse, v. Kind.	Næsehule, Tandkød, Gane, Svælg.	$^{19}/_{6}$ „	71	27	32	—	**Forbigaaende Bedring.** Ondartet Slimhindelidelse med gentagne smaa Udbrud.
352	K.	26	10	**Lille.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{23}/_{6}$ „	53	6	6	—	**Næsten helbredet.** Siden Oktbr. 99 kun paa Næsen enkelte Knuder.
353	K.	48	11	**Middelstor.** Næse, Overlæbe	Næsehule.	$^{24}/_{6}$ „	102	38	33	—	**Væsentlig bedret.** Uregelmæssig Behand-

355	M.	24	4	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{27}/_{6}$ „	66	—	—	$^{11}/_{9}$ 99	**Næsten helbredet.**	Fortsat Lysbehandling i St. Petersborg.
356	K.	57	14	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals	Næsehule.	$^{28}/_{6}$ „	122	118	—	$^{12}/_{5}$ 00	**U. K. Død**	Novbr. 01 af Nyrelidelse og Tb. pulm. Væsentlig bedret.
357	K.	38	24	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Hals.	Næsehule, Gane, Strube.	$^{29}/_{6}$ „	127	55	—	$^{8}/_{11}$ 00	**U. K. Sygdom**	(Øjenlidelse, senere total Blindhed). Næsten helbredet. $^{1}/_{7}$ 01: Godt Arvæv, enkelte tvivlsomme Knuder.
358	K.	58	22	**Stor.** Næse, begge Kinder, v. Øre, Hals.	Næsehule.	$^{1}/_{7}$ „	77	47	—	$^{28}/_{4}$ 00	**Næsten helbredet.**	Siden 00 kun enkelte spredte Knuder. Ikke behandlet paa Grund af Sygdom (Tb. pulm.)
359	M.	14	7	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød, Gane.	$^{1}/_{7}$ „	83	61	42	–	**Partielt helbredet.**	Ondartet Slimhindelidelse med gentagne smaa Udbrud (Pauperisme).
360	M.	12	3	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Hals, Overextr.	Næsehule, Overlæbe, Tandk., Gane.	$^{3}/_{7}$ „	127	114	201	—	**Væsentlig bedret.**	Ondartet Tilfælde med dyb Infiltration. $^{6}/_{9}$ 02: Delvis god Ardannelse, kun spredte Knuder. (Tb. pulm.)
★ **361**	K.	27	14	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe, Tandk., Gane.	$^{3}/_{7}$ „	136	52	—	$^{9}/_{5}$ 00	**Helbredet.**	Sygehistorie Nr. 75.
362	M.	51	7	**Stor.** H. Kind.	—	$^{4}/_{7}$ „	80	80	110	-	**Næsten helbredet.**	Uregelmæssig Behandling. $^{26}/_{5}$ 02: Godt Arvæv, enkelte spredte Knuder.
363	K.	32	14	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{5}/_{7}$ „	40	—	—	$^{11}/_{9}$ 99	**Helbredet.**	Sygehistorie Nr. 76. (Tb. pulm.)
364	K.	16	9	**Middelstor.** Næse, Læber.	Læber, Tandkød, Gane.	$^{6}/_{7}$ „	101	95	92	—	**Forbigaaende Bedring.**	Ondartet Slimhindelidelse med gentagne smaa Udbrud.
365	K.	36	20	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, v. Øre, Hals, v. Underextrem.	Næsehule, Læber, Tandkød.	$^{6}/_{7}$ „	157	13	—	$^{9}/_{7}$ 00	**U. K. Sygdom**	Tb. pulm. Albuminuri). Kendelig bedret.
366	K.	32	10	**Lille.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{8}/_{7}$ „	34	—	—	$^{19}/_{8}$ 99	**Næsten helbredet.**	1901: Recidiv under Graviditet. $^{9}/_{9}$ 02: Kun faa spredte Knuder.
367	K.	26	13	**Middelstor.** V. Kind.	—	$^{10}/_{7}$ „	59	24	16	–	**Næsten helbredet.**	Siden Septbr. 99 kun enkelte smaa Knuder.

★ Se Tavle XXVI & XXVII.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1899	1900	1901	Sidst behandlet	Resultat
368	K.	16	4	**Lille.** H. Kind.	—	$^{11}/_{7}$ 99	23	—	—	$^{5}/_{9}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 77.
369	K.	26	6	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{13}/_{7}$ „	46	33	21	—	**Næsten helbredet.** Haardnakket Slimhindelidelse, gentagne smaa Udbrud. (Tb. pulm.)
370	K.	31	19	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{13}/_{7}$ „	116	—	—	$^{11}/_{11}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 78.
371	M.	39	20	**Lille.** Næse.	Næsehule, Tandkød.	$^{15}/_{7}$ „	76	26	—	$^{6}/_{9}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 79.
372	M.	14	9	**Meget udbredt.** Begge Kinder, Hage, Hals, v. Øre.	—	$^{17}/_{7}$ „	108	104	82	—	**Næsten helbredet.** $^{5}/_{4}$ 02 Brev: Godt Arvæv, kun enkelte Knuder. (Spondylit. cervic).
373	M.	22	7	**Stor.** Næse, Læber.	Næsehule, Læber, Gane, Strube.	$^{18}/_{7}$ „	84	113	—	$^{15}/_{10}$ 00	**Helbredet** * $^{15}/_{11}$ 00: Ikke Sygdomstegn. Ikke set senere.
374	K.	16	3	**Lille.** V. Kind.	—	$^{19}/_{7}$ „	25	—	—	$^{14}/_{9}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 80.
375	M.	27	23	**Stor.** V. Kind.	Næsehule, Tandkød.	$^{19}/_{7}$ „	52	24	24	—	**Næsten helbredet.** $^{3}/_{2}$ 02: Godt Arvæv, enkelte tvivlsomme Knuder.
376	K.	25	c. $\frac{1}{2}$	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{20}/_{7}$ „	61	46	69	—	**Forbigaaende Bedring.** Haardnakket Slimhindelidelse med gentagne smaa Udbrud.
377	K.	27	17	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, h. Øre, Hals.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød.	$^{20}/_{7}$ „	116	76	—	$^{18}/_{4}$ 00	**U. K. Død** Sommer 00 (Spondylit. cervic., Tb. pulm.). Næsten helbredet. $^{4}/_{6}$ 00: Godt Arvæv, faa spredte Knuder.
378	K.	40	26	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{21}/_{7}$ „	87	83	—	$^{31}/_{8}$ 00	**Næsten helbredet.** $^{14}/_{2}$ 02 Brev: Godt Arvæv, kun paa Næsen enkelte Knuder, der behandles i Hjemmet.
379	K.	36	6	**Middelstor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{25}/_{7}$ „	57	12	15	$^{24}/_{6}$ 01	**Helbredet** * $^{18}/_{4}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
380	K.	28	7	**Stor.** Næse, Overlæbe begge	Næsehule, Læber Tand-	$^{26}/_{7}$ „	32	66	21	—	**Væsentlig bedret.** Uregelmæssig Behand-

382	M.	23	2	**Middelstor.** Næse, Læber, Hals, v. Haand.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød, Gane, Svælg, Strube.	$^{29}/_{7}$ „	109	26	—	$^{31}/_{1}$ 00	**U. K. Død** April 00 af Tb. pulm. miliar. Væsentlig bedret.
383	K.	19	6	**Middelstor.** V. Arm.	—	$^{31}/_{7}$ „	54	—	—	$^{30}/_{9}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 81.
384	K.	16	$^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule, Tandkød, Gane, Svælg, Strube.	$^{31}/_{7}$ „	73	—	—	$^{12}/_{12}$ 99	**U. K. Udebleven.** Væsentlig bedret, senere anden Behandling. (Tb. pulm.)
385	K.	48	4	**Meget udbredt.** Næse, begge Kinder, Hals, begge Overextr.	Næsehule.	$^{2}/_{8}$ „	147	156	79	—	**Væsentlig bedret.** Dyb lupøs Infiltration. $^{25}/_{6}$ 02: Godt Arvæv, faa spredte Knuder.
386	K.	18	$2^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{4}/_{8}$ „	34	44	20		**U. K. Udebleven.** (Økonomiske Grunde). Væsentlig bedret.
387	M.	47	16	**Middelstor.** Næse, begge Kinder, h. Øre.	Næsehule.	$^{10}/_{8}$ „	84	3	52	—	**Helbredet** * $^{9}/_{5}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
388	K.	36	24	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{14}/_{8}$ „	52	—	—	$^{14}/_{10}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 82.
389	M.	10	$3^{1}/_{2}$	**Lille.** H. Kind.	—	$^{16}/_{8}$ „	21	—	—	$^{7}/_{12}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 83.
390	M.	24	10	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød, Gane.	$^{17}/_{8}$ „	104	73	—	$^{5}/_{6}$ 00	**Helbredet** * **Død** Juli 00 (Typhus?) Sygehistorie Nr. 132.
391	K.	24	8	**Middelstor.** V. Kind.	—	$^{18}/_{8}$ „	80	52	—	—	**Helbredet** * $^{10}/_{6}$ 02: Godt Arvæv, en lille Knude. $^{1}/_{8}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
392	K.	48	10	**Middelstor.** Næse, h. Kind.	Næsehule.	$^{19}/_{8}$ „	55	73	47	—	**Næsten helbredet.** Uregelm. Beh. $^{19}/_{6}$ 00: Godt Arvæv, 4 smaa Knuder. (Tb. pulm.).
393	M.	19	2	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	$^{19}/_{8}$ „	114	93	62	—	**Partielt helbredet.** $^{27}/_{5}$ 02: Kun paa Næsen nogle Knuder, iøvrigt godt Arvæv.
394	M.	61	1	**Middelstor.** H. Haand.	-	$^{21}/_{8}$ „	52	—	—	$^{21}/_{10}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 84.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1899	1900	1901	Sidst behandlet	Resultat
395	K.	18	7	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{31}/_{8}$ 99	23	46	23		**Næsten helbredet.** Haardnakket Slimhindelidelse med gentagne smaa Udbrud.
* 396	K.	32	22	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Hals.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane, Strube.	$^{31}/_{8}$ „	115	117	36	—	**Næsten helbredet.** $^{20}/_{9}$ 02: Overalt godt Arvæv, kun paa Overlæbens Prolabium et Par smaa Saar.
397	K.	17	5	**Lille.** V. Kind.	—	$^{1}/_{9}$ „	8	—	—	$^{10}/_{9}$ 99	**U. K. Udebleven** uden at angive Grund.
398	K.	44	22	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{1}/_{9}$ „	40	—	—	—	**Helbredet** * $^{28}/_{1}$ 02: Lille Recidiv. $^{10}/_{4}$ 02: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
399	K.	36	20	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{2}/_{9}$ „	55	26	—	$^{1}/_{2}$ 00	**U. K. Død** April 00 af Spondylit. Væsentlig bedret.
400	K.	15	9	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød.	$^{2}/_{9}$ „	87	140	—	$^{5}/_{12}$ 00	**Helbredet** * $^{7}/_{3}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
401	K.	48	10	**Stor.** H. Kind, Øre, Hals.	—	$^{2}/_{9}$ „	78	119	74	—	**Partielt helbredet.** $^{7}/_{5}$ 02: Godt Arvæv, paa Øret enkelte Knuder.
402	K.	9	$^{1}/_{3}$	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, V. Kind.	Næsehule, Tandkød, Gane.	$^{5}/_{9}$ „	7	3	2	—	**Væsentlig bedret.** Ondartet Slimhindelidelse, med gentagne smaa Udbrud.
* 403	K.	25	7	**Stor.** Næse, begge Kinder, h. Arm.	Næsehule.	$^{12}/_{9}$ „	97	89	23	—	**Næsten helbredet.** $^{28}/_{5}$ 02: Godt Arvæv, kun paa h. Kind 2 smaa Knuder.
404	K.	30	15	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Hals, begge Over- og h. Underextr.	Næsehule, Læber, Tandkød.	$^{13}/_{9}$ „	87	124	—	$^{5}/_{6}$ 00	**U. K. Død** $^{19}/_{6}$ 00 af akut Forvirring. Næsten helbredet.
405	K.	18	5	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{13}/_{9}$ „	26	33	81	—	**Næsten helbredet.** Behandling afbrudt $^{31}/_{3}$ 00—$^{1}/_{7}$ 01. $^{2}/_{5}$ 02: Godt Arvæv, enkelte tvivlsomme Knuder.
406	K.	16	$^{3}/_{4}$	**Lille.** Næse.	Næsehule	$^{13}/_{9}$	23			$^{10}/_{9}$ 00	**Helbredet**

409	K.	27	7	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød.	$^{19}/_{9}$ „	92	26	1	–	$^{1}/_{2}$ 00	**Helbredet** * Septbr. 00: Ikke Sygdomstegn, senere intet hørt.
410	K.	17	2	**Stor.** Næse, begge Kinder, Hals.	Næsehule, Strube.	$^{21}/_{9}$ „	90	225	34	—		**Næsten helbredet.** $^{20}/_{5}$ 02: Paa Næsen et lille Saar, iøvrigt godt Arvæv.
411	K.	16	$^{3}/_{4}$	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næseh., Gane, Svælg, Strube.	$^{22}/_{9}$ „	54	10			$^{1}/_{9}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 87.
412	M.	18	4	**Middelstor.** Næse, begge Kinder, v. øvre Øjel.	—	$^{26}/_{9}$ „	81	61	—		$^{28}/_{7}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 88.
413	K.	53	6	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{27}/_{9}$ „	82	46	(2)		$^{8}/_{3}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 89.
414	K.	10	5	**Lille.** Næse, Overlæbe, begge Kinder	Næsehule.	$^{28}/_{9}$ „	32	11	—		$^{28}/_{8}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 90.
415	K.	66	30	**Middelstor.** H. Kind.	—	$^{3}/_{10}$ „	37	81	65			**Helbredet** * $^{31}/_{5}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
416	M.	19	$1^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse.	Næsehule, Svælg.	$^{3}/_{10}$ „	67	12	—			**Helbredet** * $^{28}/_{4}$ 02: 2 tvivlsomme Smaaknuder. $^{5}/_{10}$ Brev: Ikke Sygdomstegn.
417	M.	12	$1^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse, v. Kind.	Næsehule, Tandkød Gane.	$^{6}/_{10}$ „	34	44	14		$^{3}/_{10}$ 01	**Helbredet** * $^{20}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
418	M.	27	17	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Hals, v. Haand.	Næsehule.	$^{7}/_{10}$ „	72	106	5		$^{9}/_{4}$ 01	**Næsten helbredet.** $^{6}/_{10}$ 01: I Ansigtet ikke Sygdomstegn. Haanden endnu angrebet.
419	K.	21	9	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane, Strube.	$^{7}/_{10}$ „	28	64	2		$^{12}/_{9}$ 01	**Helbredet** * $^{8}/_{4}$ 02: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.).
420	K.	47	11	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Hals.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane.	$^{10}/_{10}$ „	111	72	–		$^{9}/_{7}$ 00	**U. K. Negativt Resultat.** (Haabløst Tilfælde med Elephantiasis). Ringe Paavirkning. (Tb. pulm.)
421	K.	33	10	**Stor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{12}/_{10}$ „	70	116	56		$^{25}/_{8}$ 01	**Helbredet** * $^{26}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm)
422	K.	28	18	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet.	Næsehule, Læber, Gane, Strube.	$^{16}/_{10}$ „	51	282	155			**Væsentlig bedret.** Dybt infiltreret Affektion med ringe Udsigt til Helbredelse. (Tb. pulm.)

* Se Tavle XXVIII & XXIX.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1899	1900	1901	Sidst behandlet	Resultat
423	K.	45	30	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Haarbund, v. Øre, Hals, h. Haand	Næsehule.	$^{16}/_{10}$ 99	64	404	406	—	**Væsentlig bedret.** Ringe Udsigt til Helbredelse, da Almentilstanden er meget daarlig.
424	K.	16	4	**Middelstor.** Næse, Overlæbe.	Næsehule, Overlæbe, Tandk., Gane.	$^{17}/_{10}$ „	29	72	27	—	**Næsten helbredet.** Siden Septbr. 00: Godt Arvæv, kun ved v. Næseborsrand et haardnakket Saar. (Tb. pulm.)
425	K.	25	8	**Stor.** Næse, Læber, begge Kinder.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane.	$^{18}/_{10}$ „	26	67	—	$^{14}/_{7}$ 00	**Næsten helbredet.** $^{15}/_{8}$ 02 Brev: Godt Arvæv, enkelte friske Knuder, som Pt. ikke ænser.
426	K.	48	11	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød.	$^{19}/_{10}$ „	63	111	62	—	**Partielt helbredet.** $^{29}/_{5}$ 02: Paa Overlæben et stort Saar, iøvrigt kun enkelte Knuder.
427	K.	48	7	**Stor.** V. Kind, Øre, Hals.	—	$^{19}/_{10}$ „	57	29	—	$^{3}/_{2}$ 00	**U. K. Død** Oktbr. 00 af Canc. intestinal. Væsentlig bedret.
428	K.	27	12	**Stor.** Hals.	—	$^{20}/_{10}$ „	2	—	—	$^{21}/_{10}$ 99	**U. K. Udebleven.**
429	K.	49	14	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet.	Næsehule, Læber, Gane.	$^{23}/_{10}$ „	50	—	—	$^{22}/_{12}$ 99	**U. K. Sygdom.** (Tilfældet haabløst, Tb. pulm.) Pt næsten blind. Ringe Paavirkning.
430	K.	15	4	**Stor.** Næse, h. Kind, begge Overextr.	Næsehule.	$^{24}/_{10}$ „	58	177	148	—	**Væsentlig bedret.** $^{7}/_{1}$ 02: Delvis godt Arvæv. (Tb. pulm. Udbredt ossøs Tb.)
431	K.	50	2	**Lille.** Næse, v. Kind.	Næsehule, Gane.	$^{30}/_{10}$ „	36	34	—	$^{13}/_{10}$ 00	**Helbredet** * $^{14}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
432	K.	30	10	**Middelstor.** H. Kind.	Næsehule.	$^{1}/_{11}$ „	43	44	6	$^{23}/_{12}$ 01	**Helbredet** * Siden Marts 00 kun enkelte Knuder. $^{14}/_{4}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
433	K.	23	16	**Middelstor.** Næse, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	$^{1}/_{11}$ „	53	19	—	$^{14}/_{2}$ 00	**Helbredet** * $^{14}/_{4}$ 02: En enkelt Knude.
434	K.	20	4	**Middelstor.** Næse, Overlæbe,	Næsehule.	$^{6}/_{11}$ „	36	74	—	—	**Helbredet** * Recidiv. $^{18}/_{4}$ 02: Delvis godt Arvæv, paa Næsen en Del Knuder. $^{9}/_{6}$ 02:

436	M.	23	4	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{7}/_{11}$ „	26	32	—	$^{1}/_{10}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 92. (Tb. pulm.)
437	M.	18	5	**Middelstor.** V. Ø.	—	$^{7}/_{11}$ „	26	55	—	$^{28}/_{5}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 93.
✶ 438	K.	18	3	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, v. Kind.	Næsehule.	$^{7}/_{11}$ „	43	27	—	$^{27}/_{3}$ 00	**Helbredet** * Fra $^{27}/_{3}$ 00 i c. 2 Aar ingen Sygdomstegn $^{16}/_{8}$ 02: I sidste Tid stærk Afmagring; paa Næsen 2 friske Smaaknuder; helede $^{1}/_{11}$ 02 efter 10 Séancer Lysb.
439	K.	16	$2^{1}/_{2}$	**Lille.** Pande.	—	$^{9}/_{11}$ „	5	23	—	$^{7}/_{3}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 94.
440	K.	23	4	**Middelstor.** Næse, begge Kind.	Næsehule.	$^{13}/_{11}$ „	22	104	36	—	**Næsten helbredet.** Uregelmæssig Behandling.
441	K.	27	12	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{14}/_{11}$ „	26	20	10	$^{15}/_{11}$ 01	**Helbredet** * $^{2}/_{5}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
✶ 442	K.	38	$10^{1}/_{2}$	**Meget udbredt.** Næse, Læber, begge Kinder, Hage.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane.	$^{16}/_{11}$ „	32	247	95	—	**Næsten helbredet.** $^{1}/_{7}$ 02: Godt Arvæv, ialt 3 til 4 smaa Knuder.
✶ **443**	M.	21	9	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, h. Tinding.	Næsehule.	$^{21}/_{11}$ „	35	169	—	$^{21}/_{7}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 95.
444	K.	60	30	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, h. Kind, Tinding, h. Øre, Haarbund, Hals.	—	$^{22}/_{11}$ „	34	229	67	—	**Næsten helbredet.** $^{3}/_{4}$ 02: Godt Arvæv, faa spredte Knuder.
✶ **445**	K.	17	2	**Lille.** H. Kind.	-	$^{22}/_{11}$ „	6	27	—	$^{16}/_{3}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 96.
446	K.	10	8	**Lille.** H. Kind, v. Nates.	—	$^{25}/_{11}$ „	7	24	—	—	**Næsten helbredet.** $^{21}/_{8}$ 02: Godt Arvæv, et Par tvivlsomme Knuder.
447	K.	40	20	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{25}/_{11}$ „	22	43	—	$^{21}/_{4}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 97.
448	K.	37	26	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, h. Fod.	Næsehule, Læber.	$^{26}/_{11}$ „	21	196	174	—	**Væsentlig bedret.** $^{26}/_{6}$ 02: Overalt god Ardannelse, men endnu spredte Knuder, særlig omkring Munden.
✶ **449**	K.	22	6	**Middelstor.** Næse, Pande, h. Kind, h. Arm.	—	$^{27}/_{11}$ „	29	48	—	$^{10}/_{3}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 98.
450	K.	52	$1^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{28}/_{11}$ „	27	93	29	—	**Forbigaaende Bedring.** Gentagne Udbrud fra Næsehulen. $^{2}/_{4}$ 02: Et Par smaa Knuder.

✶ Se Tavle XXX, XXXI, XXXII, XXXIII & XXXIV.

No.	Kon	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1899	1900	1901	Sidst behandlet	Resultat
451	K.	21	$^1/_2$	**Lille.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule.	$^{28}/_{11}$ 99	28	121	59	—	**Helbredet** * Gentagne Udbrud fra Slimhinden. $^{27}/_6$ 02: Ikke Sygdomstegn.
452	K.	31	3	**Middelstor.** Næse, v. Kind.	Næsehule, Tandkød.	$^{28}/_{11}$ „	29	73	8	$^{11}/_{10}$ 01	**Helbredet** * $^{22}/_6$ 02: Ikke Sygdomstegn.
453	M.	10	2	**Lille.** V. Kind.	—	$^{28}/_{11}$ „	9	—	—	$^{15}/_{12}$ 99	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 99.
454	M.	18	12	**Middelstor.** Hals.	—	$^1/_{12}$ „	10	28	—	$^{15}/_2$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 100.
455	K.	34	22	**Stor.** Næse, Læber, begge Kinder, Hals.	Næsehule, Læber, Tandkød.	$^6/_{12}$ „	10	269	185	—	**Væsentlig bedret.** $^{18}/_6$ 02: Delvis god Ardannelse, ret talrige Knuder.
456	K.	54	20	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Pande, Haarbund, Hals, h. og v. Overextr., h. Underextr.	Næsehule.	$^6/_{12}$ „	21	225	54	—	**Væsentlig bedret.** Haabløst Tilfælde, med sammenhængende dyb Infiltration. Ringe Udsigt til fuldstændig Helbredelse.
457	M.	20	18	**Lille.** H. Kind.		$^7/_{12}$ „	8	—	—	$^{15}/_{12}$ 99	**U. K. Udebleven.** Ikke set senere.
458	M.	38	12	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^7/_{12}$ „	20	32	27	$^{27}/_2$ 01	**U. K. Negativt Resultat.** Forbigaaende Bedring, gentagne Udbrud.
459	K.	28	7	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^8/_{12}$ „	8	56	—	$^8/_8$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 101.
460	K.	44	10	**Lille.** H. Øre.	—	$^8/_{12}$ „	19	21	—	$^{26}/_1$ 00	**U. K. Sygdom.** Kendelig bedret.
461	K.	29	2	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{11}/_{12}$ „	11	50	—	$^{27}/_4$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 102.
462	M.	33	15	**Meget udbredt.** Næse, v. Øre, Hals, Bryst.	Næsehule, Læber, Tunge, Gane.	$^{12}/_{12}$ „	16	210	103	—	**Næsten helbredet.** $^9/_7$ 02: Overalt godt Arvæv, kun paa Øret faa smaa Knuder.
463	K.	24	15	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, v. Kind, h. Øre, Hals.	Næsehule, Overlæbe, Tandk., Gane.	$^3/_1$ 00	—	268	—	—	**Næsten helbredet.** $^1/_8$ 02: Smukt Arvæv, kun to smaa Knuder.
464	M.	28	19	**Middelstor.**	Gane, Svælg	$^4/$	—	108	52		**Væsentlig bedret.** Ung [illegible] Behand

				Næse, begge Kinder.	Overlæbe.							hindelidelse med smaa Udbrud. $^{30}/_{5}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
467	K.	45	6	**Middelstor.** Begge Kinder.	Næsehule.	$^{12}/_{1}$ „	—	77	—	$^{4}/_{7}$ 00	**Helbredet**	$^{18}/_{12}$ 00: Ikke Sygdomstegn, ikke set senere.
468	K.	19	5	**Stor.** Næse, Overlæbe, v. Kind, h. Skulder og Haand, h. Fod.	Næsehule, Overlæbe, Tandk., Gane.	$^{18}/_{1}$ „	—	209	59	—	**Helbredet**	$^{3}/_{7}$ 02: Godt Arvæv, ikke Sygdomstegn.
469	K.	34	18	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{22}/_{1}$ „	—	89	9	$^{12}/_{7}$ 01	**Helbredet**	$^{8}/_{5}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
470	K.	49	33	**Stor.** H. Kind, Hals.	—	$^{22}/_{1}$ „	—	173	59	$^{9}/_{5}$ 01	**Helbredet**	$^{22}/_{9}$ 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
* 471	K.	15	14	**Stor.** V. Haand og Arm.	—	$^{23}/_{1}$ „	—	209	38	$^{18}/_{6}$ 01	**Helbredet**	$^{20}/_{4}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
472	M.	28	13	**Lille.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule.	$^{24}/_{1}$ „	—	45	14	$^{12}/_{6}$ 01	**U. K. Udebleven.**	(Økonomiske Grunde.) Haardnakket Slimhindelidelse med gentagne smaa Udbrud.
473	M.	24	18	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Pande.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød.	$^{21}/_{1}$ „	—	142	—	—	**Næsten helbredet.**	Behandlingen afbrudt fra $^{5}/_{7}$ 00—$^{7}/_{6}$ 02.
* 474	K.	55	13	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Pande, Hals.	—	$^{29}/_{1}$ „	—	209	3	$^{22}/_{7}$ 01	**Helbredet**	$^{8}/_{7}$ 02: Smukt Arvæv, ikke Sygdomstegn.
475	K.	24	8	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{1}/_{2}$ „	—	39	—	$^{3}/_{4}$ 00	**Helbredet.**	Sygehistorie Nr. 103.
476	K.	46	15	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Pande, h. Underarm.	Næsehule.	$^{1}/_{2}$ „	—	227	89	$^{5}/_{10}$ 01	**Næsten helbredet.**	$^{11}/_{7}$ 02 Brev: Godt Arvæv, kun 2 tvivlsomme Knuder; er tilfreds med Resultatet.
477	K.	34	15	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{1}/_{2}$ „	—	42	13	$^{11}/_{5}$ 01	**Helbredet**	$^{6}/_{5}$ 02 Brev: I h. Næsebor et Saar til Næsevingens Rand, udvendig ikke Sygdomstegn.
478	K.	22	4	**Middelstor.** Næse, begge Kind.	Næsehule.	$^{2}/_{2}$ „	—	88	51	—	**Helbredet**	$^{9}/_{9}$ 02: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.)

* Se Tavle XXXV & XXXVI.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1900	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1901	Sidst behandlet	Resultat
479	M.	35	30	**Meget udbredt.** V. Kind, Øre, Hals.	—	$^{2}/_{2}$ 00	94	66	—	**Næsten helbredet.** $^{15}/_{1}$ 02: Godt Arvæv, kun paa Halsen spredte Knuder.
480	K.	50	4	**Middelstor.** Panden.	—	$^{3}/_{2}$ „	68	71	—	**U. K. Negativt Resultat.** Forbigaaende Bedring, stadig nye Udbrud.
481	M.	20	18	**Meget udbredt.** Begge Over-, h. Underextrem.	—	$^{6}/_{2}$ „	193	14	$^{26}/_{11}$ 01	**Helbredet** * 01: Kun enkelte Knuder. $^{25}/_{8}$ 02: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
482	M.	13	$^{1}/_{2}$	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, v. Laar.	Næsehule, Gane, Strube.	$^{8}/_{2}$ „	136	88	$^{23}/_{11}$ 01	**Væsentlig bedret.** (Pauperisme.) $^{22}/_{11}$ 01: Godt Arvæv, kun enkelte Knuder. Foraaret 02 atter flere Knuder.
483	M.	30	$4^{1}/_{2}$	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, h. Kind, Hals.	Næsehule, Overlæbe, Gane. 01: Strube.	$^{10}/_{2}$ „	268	124	-	**Næsten helbredet.** $^{10}/_{6}$ 02: Overalt godt Arvæv, kun paa Næsen enkelte Knuder.
484	K.	23	17	**Middelstor.** Begge Kinder, v. Tinding, begge Arme.	—	$^{15}/_{2}$ „	66	20	$^{16}/_{1}$ 01	**Helbredet** * **Død** Mai 02 af Hjærnebetændelse. Sygehistorie Nr. 133.
★ **485**	M.	6	$1^{1}/_{2}$	**Lille.** V. Kind.	—	$^{15}/_{2}$ „	11	—	$^{17}/_{4}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 104.
486	M.	28	9	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Øjelaag, Pande.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane, Strube.	$^{23}/_{2}$ „	357	548	—	**Væsentlig bedret.** Meget ondartet Tilfælde. $^{1}/_{7}$ 02: Overalt god Ardannelse, dog en Del dybe Knuder.
487	K.	52	20	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{26}/_{2}$ „	115	66	—	**Helbredet** * Uregelmæssig Behandling. $^{3}/_{8}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
488	M.	4	1	**Middelstor.** Hals, v. Over-, begge Underextr. (ialt 10 Smaapletter).	—	$^{27}/_{2}$ „	30	4	$^{22}/_{6}$ 01	**Helbredet** * $^{23}/_{8}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
489	K.	46	15	**Stor.** Næse, Over-	Næsehule	$^{2}/$	132	29	—	**Næsten helbredet** $^{11}/$ 01: Godt Arvæv

491	K.	38	26	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, v. Kind.	Næsehule, Tandkød.	$^{7}/_{3}$ „	147	—	$^{29}/_{8}$ 00	**Næsten helbredet.** $^{29}/_{7}$ 02 Brev: Godt Arvæv, kun paa Næsen et Par smaa Pletter, der behandles i Hjemmet.
492	K.	44	32	**Middelstor.** V. Kind.	—	$^{10}/_{3}$ „	85	—	$^{4}/_{12}$ 00	**Helbredet** * $^{1}/_{6}$ 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
493	K	67	52	**Stor.** Næse, begge Kinder.	—	$^{10}/_{3}$ „	7	—	$^{17}/_{3}$ 00	**U. K. Død** $^{26}/_{3}$ 00 (Influenza, Tb. pulm.).
494	K.	37	25	**Middelstor.** Næse, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	$^{10}/_{3}$ „	136	—	$^{7}/_{9}$ 00	**Næsten helbredet.** $^{10}/_{11}$ 01: Siden Behandlingen kun enkelte smaa Saar, som hun selv behandler.
495	K.	26	6	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{10}/_{3}$ „	63	—	$^{20}/_{7}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 105.
496	K.	26	14	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød, Gane.	$^{12}/_{3}$ „	154	27	—	**Helbredet** * $^{1}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
497	K.	34	12	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{15}/_{3}$ „	14	—	$^{1}/_{4}$ 00	**U. K. Sygdom** (Tb. pulm.)
498	M.	19	2	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	$^{19}/_{3}$ „	93	87	—	**Ringe Paavirkning.** Ondartet Tilfælde, har bredt sig lidt trods Behandling. (Tb. pulm)
499	K.	32	16	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{20}/_{3}$ „	191	15	$^{29}/_{5}$ 01	**Helbredet** * $^{2}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
500	M.	29	29	**Meget udbredt.** H. Kind, v. Over- og Underextr.	—	$^{23}/_{3}$ „	225	118	—	**Næsten helbredet.** $^{21}/_{7}$ 02 Brev: Ansigtet frit, paa Extremiteterne enkelte Knuder. (Tb. pulm.)
501	K.	41	17	**Meget udbredt.** Næse, begge Kinder, Pande, Haarbund, Hals.	—	$^{24}/_{3}$ „	108	—	$^{27}/_{7}$ 00	**U. K. Udebleven.** Væsentlig bedret. $^{12}/_{9}$ 01 Brev: Godt Arvæv, kun spredte Knuder.
502	K	51	8	**Meget udbredt.** Næse, Læber, begge Kinder, Ører, Hage, Hals.	Næsehule, Overlæbe.	$^{26}/_{3}$ „	168	—	$^{27}/_{10}$ 00	**U. K. Død** $^{7}/_{11}$ 00 (Tb. miliar.?) Kendelig bedret.

* Se Tavle XXXVII.

No.	Kon	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1900	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1901	Sidst behandlet	Resultat
503	M.	8	6	**Lille.** H. Arm.	--	$^{27}/_{3}$ 00	48	—	$^{17}/_{12}$ 00	**Helbredet** * $^{3}/_{4}$ 02: Godt Arvæv, 2 tvivlsomme Smaaknuder.
504	M.	35	2	**Stor.** Næse, Læber, h. Kind, øvre Øjelaag.	Næsehule, Læber, Gane, Strube.	$^{30}/_{3}$ „	276	—	$^{22}/_{9}$ 00	**U. K. Død.** Væsentlig bedret.
505	K.	18	4	**Lille.** Overlæbe.	Overlæbe, Tandkød, Gane	$^{30}/_{3}$ „	59	—	$^{20}/_{11}$ 00	**Helbredet** * $^{20}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
506	M.	19	2	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Læber, Tandkød, Gane, Svælg, Strube.	$^{31}/_{3}$ „	39	23	—	**Væsentlig bedret.** Ondartet Slimhindelidelse, med gentagne smaa Udbrud paa Huden. (Tb. pulm.)
507	K.	44	30	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Pande, Hals, v. Overextr., Krop.	—	$^{6}/_{4}$ „	131	50	—	**Næsten helbredet.** $^{2}/_{7}$ 02: Godt Arvæv, 5 spredte Smaaknuder.
508	K.	21	2	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{6}/_{4}$ „	60	—	$^{8}/_{9}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 106.
509	K.	10	10	**Lille.** V. Kind.	—	$^{7}/_{4}$ „	12	—	$^{8}/_{5}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 107.
510	M.	20	3	**Stor.** Næse, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	$^{9}/_{4}$ „	113	6	$^{2}/_{9}$ 01	**Helbredet** * $^{20}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
511	K.	18	$2^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse, v. Kind.	Næsehule.	$^{9}/_{4}$ „	65	—	$^{20}/_{7}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 108.
512	K.	40	10	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{9}/_{4}$ „	76	—	$^{19}/_{9}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 109.
513	K.	48	40	**Lille.** V. Øre.	—	$^{10}/_{4}$ „	42	32	—	**Væsentlig bedret.** Uregelmæssig Behandling. $^{1}/_{7}$ 02: Delvis godt Arvæv, endnu Knuder.
514	K.	36	4	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, v. Kind	Næsehule.	$^{14}/_{4}$ „	155	23	$^{27}/_{4}$ 01	**Helbredet** * 01: Smukt Ar, kun enkelte Knuder. $^{6}/_{4}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.

	517	M.	45	15	**Middelstor.** V. Haand.	—	$^{20}/_{4}$ „	51	7	—	**Næsten helbredet.** Uregelmæssig Behandling. $^{1}/_{4}$ 02: Godt Arvæv, i Randen spredte Knuder og smaa Saar.
	518	K.	23	$^{2}/_{12}$	**Lille.** Næse.	Næsehule, Svælg, Strube.	$^{23}/_{4}$ „	27	19	$^{21}/_{10}$ 01	**Helbredet** * (Ondartet Slimhindelidelse, Tb. pulm.). $^{26}/_{4}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
	519	K.	25	$1^{1}/_{2}$	**Middelstor.** Overlæbe, v. Kind.	—	$^{24}/_{4}$ „	48	—	$^{14}/_{7}$ 00	**Næsten helbredet.** $^{25}/_{7}$ 02: Atter nogle friske Knuder.
	520	K.	30	1	**Middelstor.** V. Kind.	—	$^{27}/_{4}$ „	39	39	$^{26}/_{10}$ 00	**Helbredet** * Siden Jan. 01: Kun enkelte tvivlsomme Knuder.
*	521	K.	22	7	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{27}/_{4}$ „	143	67	$^{2}/_{11}$ 01	**Helbredet** * $^{30}/_{5}$ 02: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
	522	M.	30	13	**Middelstor.** Næse, h. Øre.	Næsehule.	$^{30}/_{4}$ „	141	—	$^{24}/_{10}$ 00	**Helbredet** * $^{27}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
*	523	K.	22	2	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{30}/_{4}$ „	97	—	$^{30}/_{11}$ 00	**Helbredet** * $^{30}/_{8}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
	524	K.	24	$2^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse.	—	$^{1}/_{5}$ „	41	—	$^{18}/_{9}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 110.
	525	M.	40	4	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{4}/_{5}$ „	83	33	—	**Helbredet** * Uregelmæssig Behandling. $^{28}/_{5}$ 02: Overalt godt Arvæv, kun faa Knuder. $^{12}/_{10}$ Brev: Ikke Sygdomstegn.
	526	M.	18	8	**Meget udbredt.** V. Kind, v. Øre, v. Tinding, Haarbund, Hals, v. Skulder o. Haand, begge Underextr., Krop.	Gane, Strube.	$^{4}/_{5}$ „	166	315	—	**Væsentlig bedret.** $^{16}/_{8}$ 02: Overalt god Ardannelse, kun spredte Knuder.
*	527	M.	17	4	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød, Strube.	$^{10}/_{5}$ „	112	—	$^{3}/_{12}$ 00	**Helbredet** * $^{1}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
	528	M.	23	2	**Middelstor.** Næse.	Næsehule, Gane, Strube.	$^{11}/_{5}$ „	16	—	—	**Næsten helbredet.** Behandling afbrudt $^{28}/_{5}$ 00—$^{25}/_{2}$ 02. $^{9}/_{6}$ 02: Godt Arvæv, faa Knuder. (Tb. pulm.)
	529	M.	15	6	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, V. Kind.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød, Gane, Strube.	$^{15}/_{5}$ „	77	14	$^{6}/_{9}$ 01	**Helbredet** * Haardnakket Slimhindelidelse. Siden Novbr. 00: Huden fri. $^{9}/_{6}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.

* Se Tavle XXXVIII, XXXIX & XL.

No.	Kon	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1900	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1901	Sidst behandlet	Resultat
530	K.	32	7	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{16}/_{5}$ 00	118	11	$^{24}/_{9}$ 01	**Helbredet** * 01: Kun 1 tvivlsom Knude. $^{2}/_{6}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
531	M.	32	30	**Stor.** V. Over- og Underextr.	—	$^{22}/_{5}$ „	139	—	$^{27}/_{7}$ 00	**Næsten helbredet.** 01: Lysbehandling i St. Petersborg. $^{5}/_{1}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
532	K.	24	16	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	$^{26}/_{5}$ „	70	6	$^{9}/_{9}$ 01	**Helbredet** * 01: Smukt Arvæv, kun paa Halsen et Par Knuder. $^{18}/_{9}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
533	K.	30	12	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hage.	—	$^{28}/_{5}$ „	131	58	—	**Næsten helbredet.** Overalt godt Arvæv. Siden Oktbr. 00 kun spredte Knuder.
534	M.	21	17	**Meget udbredt.** H. Arm.	Næsehule.	$^{28}/_{5}$ „	148	193	—	**Væsentlig bedret.** $^{18}/_{6}$ 02: Overalt godt Arvæv, kun nogle spredte Knuder.
535	K.	52	25	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, begge Overextr.	Næsehule, Læber.	$^{2}/_{6}$ „	171	37	—	**Næsten helbredet.** $^{25}/_{6}$ 02: Overalt godt Arvæv, kun paa Læber og v. Haand nogle smaa Saar.
536	K.	27	20	**Middelstor.** Begge Kinder, h. Arm.	Næsehule.	$^{6}/_{6}$ „	40	—	$^{8}/_{8}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 111.
537	M.	16	$^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{7}/_{6}$ „	18	—	$^{30}/_{6}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 112.
538	M.	18	1	**Lille.** Næse.	Næsehule, Strube.	$^{7}/_{6}$ „	64	—	$^{30}/_{8}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 113.
539	K.	15	10	**Middelstor.** H. Kind, Hals.	—	$^{9}/_{6}$ „	31	4	$^{31}/_{8}$ 01	**Helbredet** * 01: Smukt Arvæv, kun en tvivlsom Knude. $^{25}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
540	K.	8	4	**Middelstor.** V. Kind, v. Haand.	—	$^{9}/_{6}$ „	43	62	$^{2}/_{12}$ 01	**Helbredet** * $^{15}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
541	K.	14	4	**Lille.** V. Kind.	—	$^{12}/_{6}$ „	15	—	$^{29}/_{10}$ 00	**Helbredet** * $^{9}/_{9}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
542	K.	20	2	**Lille.** H. Kind.						

544	K.	45	9	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, h. Øre.	Næsehule.	13/6 „	128	90	—	**Næsten helbredet.** 01: Smukt Arvæv, spredte Knuder. 8/7 02 Brev: Kun paa Øret nogle Knuder.
545	M.	21	19	**Stor.** H. Kind, Pande, Haarbund, Hals.	—	16/6 „	229	47	—	**Næsten helbredet.** Siden Decbr. 00 kun faa spredte Knuder.
546	K.	30	8	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Gane, Strube.	18/6 „	115	11	18/5 01	**Helbredet** * 01: Smukt Ar, faa spredte Knuder. 18/5 02: Ikke Sygdomstegn.
547	K.	21	4/12	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	19/6 „	38	24	—	**Næsten helbredet.** Uregelmæssig Behandling. 23/6 02: Overalt godt Arvæv, i Randen af v. Næsebor et lille Saar.
548	K.	48	5	**Lille.** Næse.	Næsehule.	20/6 „	22	26	1/10 01	**Helbredet** * 3/5 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
549	M.	50	2	**Middelstor.** Næse, v. Kind og Øre.	Næsehule.	20/6 „	63	17	—	**Næsten helbredet.** Siden Decbr. 00: Godt Arvæv; kun enkelte Knuder omkring en Taarefistel.
550	K.	44	4 1/2	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	25/6 „	64	43	—	**Væsentlig bedret.** Uregelmæssig Behandling. 10/4 02: Delvis godt Arvæv; en Del spredte Knuder.
551	K.	55	4 1/2	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe.	25/6 „	142	22	13/5 01	**Næsten helbredet.** 01: Smukt Arvæv, kun paa Næsen nogle Knuder. 3/10 02: Nogle spredte Knuder efter Ansigtsrosen.
552	K.	22	6	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	26/6 „	40	16	23/7 01	**Næsten helbredet.** 22/8 02: Godt Ar, kun en lille Knude.
553	K.	4	5/12	**Lille.** Næse.	—	27/6 „	1	—	27/6 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 114.
554	K.	45	21	**Lille.** Næse, h. Kind.	Næsehule.	27/6 „	45	—	8/9 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 115.
555	K.	60	21	**Middelstor.** Næse, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	2/7 „	80	—	—	**Helbredet** * 28/5 02: Ansigt frit, paa Halsen et Par tvivlsomme Pletter. 21/8 Brev: Ikke Sygdomstegn.
556	K.	11	3	**Lille.** V. Kind.	—	3/7 „	20	—	1/10 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 116.
557	K.	59	1/2	**Lille.** Næse.	Næsehule.	4/7 „	71	51	—	**Forbigaaende Bedring.** Gentagne Udbrud fra Slimhinden. (Tb. pulm.)

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1900	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1901	Sidst behandlet	Resultat
558	K.	41	1	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{6}/_{7}$ 00	48	—	$^{8}/_{9}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 117.
559	K.	62	1	**Lille.** Næse, h. Kind.	Næsehule.	$^{11}/_{7}$ „	54	32	—	**Næsten helbredet.** Haardnakket Slimhindelidelse. Siden 01 kun enkelte Knuder.
560	K.	24	10	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hage, v. Arm.	Næsehule, Tandkød, Gane.	$^{11}/_{7}$ „	137	11	—	**Helbredet** * Siden Decbr. 00: Huden fri, kun Slimhinder og Prolabium angrebne.
561	K.	7	$^{4}/_{12}$	**Lille.** V. Kind.	—	$^{12}/_{7}$ „	6	2	$^{2}/_{4}$ 01	**Helbredet** * $^{3}/_{4}$ 02: Arret næppe synlig, ikke Sygdomstegn.
562	K.	23	1	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{13}/_{7}$ „	40	—	$^{18}/_{9}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 118.
563	K.	20	$1^{1}/_{4}$	**Lille.** Næse, begge Kinder, h. Pegefinger.	—	$^{13}/_{7}$ „	58	—	$^{29}/_{9}$ 00	**Helbredet** * **Død** $^{30}/_{3}$ 01 af Tb. pulm. Sygehistorie Nr. 134.
564	K.	28	5	**Meget udbredt.** Næse, begge Kinder, Pande, begge Underarme, h. Haand.	Næsehule.	$^{16}/_{7}$ „	58	31	—	**Næsten helbredet.** Siden Novbr. 00: Godt Arvæv, kun spredte Knuder.
565	K.	34	12	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	$^{17}/_{7}$ „	84	40	—	**Næsten helbredet.** Siden Decbr. 00: Godt Arvæv, kun spredte Knuder.
566	M.	66	58	**Stor.** H. Arm.	—	$^{21}/_{7}$ „	88	—	$^{21}/_{11}$ 00	**U. K. Sygdom.** Væsentlig bedret, Affektionen kompliceret med Epitheliom. (Operation).
567	M.	38	19	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{21}/_{7}$ „	76	—	$^{5}/_{11}$ 00	**Helbredet** * $^{3}/_{1}$ 02: Godt Arvæv, ved h. Næseborsrand et lille Saar. $^{21}/_{7}$: Ikke Sygdomstegn.
568	K.	27	$3^{1}/_{2}$	**Middelstor.** Næse, begge Kind.	—	$^{21}/_{7}$ „	55	—	$^{11}/_{10}$ 00	**Helbredet** * $^{20}/_{4}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.

				Øvre Øjelaag, v. Arm.	Overlæbe.						
570	K.	31	10	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{26}/_{7}$ „	59	23	$^{24}/_{6}$ 01	**Helbredet** *	$^{30}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
571	K.	42	20	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe.	$^{28}/_{7}$ „	67	74	—	**Væsentlig bedret.**	Uregelmæssig Behandling.
572	K.	46	18	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, Hage.	Næsehule.	$^{30}/_{7}$ „	104	—	$^{11}/_{12}$ 00	**Helbredet** *	$^{29}/_{5}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
573	K.	44	9	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{6}/_{8}$ „	34	19	—	**Helbredet** *	$^{9}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
574	M.	25	10	**Lille.** Næse.	Næseh., Gane, Svælg, Strube.	$^{8}/_{8}$ „	46	—	$^{28}/_{9}$ 00	**Helbredet.**	Sygehistorie Nr. 119. (Tb. pulm.)
575	K.	27	11	**Middelstor.** V. Kind og Øre.	—	$^{9}/_{8}$ „	65	70	—	**Næsten helbredet.**	$^{21}/_{9}$ 02: Kinden fri, paa Øret enkelte Knuder.
576	K.	54	8	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{9}/_{8}$ „	45	38	—	**Næsten helbredet.**	Haardnakket Slimhindelidelse med gentagne smaa Udbrud.
577	M.	23	8	**Stor.** Begge Kinder, Hals, v. Fod.	Tandkød.	$^{11}/_{8}$ „	42	—	$^{10}/_{11}$ 00	**Helbredet** *	$^{19}/_{5}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
578	K.	18	8	**Meget udbredt.** Begge Kinder, Hals, Bryst.	—	$^{11}/_{8}$ „	107	84	—	**Helbredet** *	Siden Mai 01 kun enkelte smaa Knuder. $^{25}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
579	K.	62	44	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule.	$^{13}/_{8}$ „	38	4	$^{24}/_{9}$ 01	**Helbredet** *	$^{18}/_{9}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
580	K.	45	18	**Stor.** V. Haand og Arm.	—	$^{6}/_{7}$ „	103	57	—	**Helbredet** *	$^{8}/_{7}$ 02: Smukt Arvæv, ikke tydelige Sygdomstegn.
581	M.	22	17	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals, begge øverste Øjelaag.	Næsehule.	$^{31}/_{8}$ „	106	91	$^{11}/_{4}$ 01	**Helbredet** *	$^{28}/_{3}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
582	K.	11	$^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse, h. Kind.	Næsehule.	$^{1}/_{9}$ „	12	—	$^{29}/_{9}$ 00	**Helbredet.**	Sygehistorie Nr. 120.
583	M.	36	$1^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{3}/_{9}$ „	33	2	$^{17}/_{8}$ 01	**Helbredet** *	$^{23}/_{10}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn

* Se Tavle XLI.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1900	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1901	Sidst behandlet	Resultat
584	K.	25	23	**Middelstor.** H. Haand og Underarm.	—	$^{5}/_{9}$ 00	77	14	—	**Helbredet** * Siden Decbr. 00 kun en enkelt tvivlsom Plet. $^{7}/_{4}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
585	K.	29	5	**Lille.** H Kind.	Gane.	$^{7}/_{9}$ „	18	—	$^{6}/_{10}$ 00	**Helbredet** * $^{19}/_{9}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
586	K.	26	9	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, h. Kind, Hals, h. Arm.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød.	$^{7}/_{9}$ „	70	77	$^{23}/_{8}$ 01	**Helbredet** * $^{13}/_{9}$ 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
587	K.	5	3	**Lille.** V. Kind.	—	$^{15}/_{9}$ „	2	—	$^{24}/_{9}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 121.
588	K.	40	6	**Lille.** Næse. 1901: Hals.	Næsehule.	$^{15}/_{9}$ „	27	27	—	**Helbredet** * Haardnakket Slimhindelidelse med gentagne smaa Udbrud. $^{24}/_{4}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
589	K.	31	6	**Stor.** Næse, begge Kinder.	—	$^{19}/_{9}$ „	61	42	—	**Næsten helbredet.** Siden Febr. 01 godt Arvæv, kun faa spredte Knuder.
590	K.	22	1	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{19}/_{9}$ „	13	5	$^{4}/_{9}$ 01	**Helbredet** * $^{9}/_{3}$ 02: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
591	K.	32	11	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, v. Kind.	Næsehule.	$^{19}/_{9}$ „	26	27	—	**Næsten helbredet.** Siden Februar 01 kun enkelte Knuder. Haardnakket Slimhindelidelse.
592	M.	6	2	**Lille.** V. Kind.	—	$^{22}/_{9}$ „	4	5	$^{3}/_{8}$ 01	**Helbredet** * $^{8}/_{4}$ 02: Arret næppe synlig, ikke Sygdomstegn.
593	K.	21	6	**Lille.** Næse, Overlæbe, v. Øjelaag.	Næsehule.	$^{22}/_{9}$ „	41	5	$^{3}/_{4}$ 01	**Helbredet** * $^{5}/_{5}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
594	K.	22	2	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød.	$^{24}/_{9}$ „	84	83	—	**Næsten helbredet.** Siden Marts 01: Godt Arvæv, faa spredte Knuder. (Tb. pulm.)
595	K.	27	11	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{25}/_{9}$ „	19	17	—	**Helbredet** * $^{3}/_{7}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
596	K.	7	1	**Lille.** H. Arm.	—	$^{27}/_{9}$ „	2	—	$^{27}/_{9}$ 00	**Helbredet.** Sygehistorie Nr. 122.
597	M.	17	1	**Middelstor.**	Næsehule,	$^{28}/_{9}$ „	64	183	—	**Næsten helbredet** Godt Arvæv, Slimhinde-

				begge Kinder, Hals.							lige Sygdomstegn.
* 599	K.	34	10	**Middelstor.** Næse.	Næsehule.	1/10 „	51	45	26/6 01	**Helbredet** * 9/6 02: Godt Arvæv, ikke Sygdomstegn.
600	K.	26	19	**Lille.** V. Kind.	—	1/10 „	22	—	19/12 00	**Næsten helbredet.** 2/10 02: Smukt Arvæv, atter enkelte Knuder.
601	M.	12	3	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	3/10 „	52	60	—	**Væsentlig bedret.** Uregelmæssig Behandling. 19/6 02: Kun paa Overlæben tydelige Knuder.
602	K.	7	5	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	6/10 „	5	—	—	**Næsten helbredet.** Behandlingen afbrudt 11/10 00—13/1 02. 26/9 02: Godt Arvæv, enkelte smaa Knuder.
603	M.	45	24	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, Hals.	Næsehule, Læber, Tandkød.	6/10 „	72	167	3/12 01	**Helbredet** * 29/7 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
604	K.	11	7	**Lille.** Overlæbe, h. Kind.	—	9/10 „	25	61	12/12 01	**Helbredet** * 30/4 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
605	K.	37	5/12	**Lille.** H. Kind.	Næsehule.	9/10 „	8	—	17/11 00	**Helbredet** * 15/8 02: Ikke Sygdomstegn. Arret lidet synlig.
606	K.	19	1	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	10/10 „	40	3	4/1 01	**Helbredet** * 12/2 02: Lille Udbrud fra Slimhinden udenfor det oprindelig behandlede.
607	K.	33	4	**Stor.** H. Kind, Hage, Hals.	—	10/10 „	52	169	—	**Næsten helbredet.** 26/6 02: Godt Arvæv, faa spredte Knuder.
608	K.	22	20	**Middelstor.** V. Arm.	—	13/10 „	10	—	24/10 00	**U. K. Udebleven** uden at angive Grund.
609	K.	10	5	**Lille.** H. Kind.	—	17/10 „	6	—	23/10 00	**Helbredet** * 21/8 02: Ikke Sygdomstegn.
610	K.	37	14	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule.	18/10 „	65	77	15/4 01	**Næsten helbredet.** 21/12 01 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn. Foraar 02: Et Par Knuder, behandles i Hjemmet.
611	K.	38	4	**Lille.** Næse, h. Kind.	Næsehule.	20/10 „	35	—	8/12 00	**Helbredet** * 8/8 02: Ikke Sygdomstegn.
612	K.	32	16	**Stor.** V. Kind, Hals.	—	23/10 „	42	73	—	**Helbredet** * 12/5 02: Godt Arvæv, ikke tydelige Sygdomstegn.
613	K.	65	3 1/2	**Middelstor.** Næse, begge Kind.	Næsehule.	24/10 „	30	5	—	**Helbredet** * Foraaret 02: Ret stort Recidiv. 6/8: Ikke Sygdomstegn.
614	K.	29	14	**Lille.** Næse.	Næsehule.	27/10 „	15	15	2/3 01	**Helbredet** * 16/4 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.

* Se Tavle XLII.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1900	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1901	Sidst behandlet	Resultat
615	K.	25	1	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{30}/_{10}$ 00	15	31	$^{3}/_{7}$ 01	**Helbredet** * $^{2}/_{8}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
* 616	K.	18	$6^{1}/_{2}$	**Middelstor.** Næse, v. Kind.	—	$^{30}/_{10}$ „	19	4	$^{3}/_{1}$ 01	**Helbredet** * $^{17}/_{10}$ 02 Brev: Smukt Arvæv, ikke Sygdomstegn.
617	K.	27	20	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{2}/_{11}$ „	50	57	—	**Helbredet** * $^{5}/_{9}$ 01: Ikke tydelige Sygdomstegn.
618	K.	15	2	**Lille.** H. Øre, h. øvre Øjelaag, v. Arm.	—	$^{3}/_{11}$ „	22	39	—	**Næsten helbredet.** $^{9}/_{7}$ 02: Paa Øret en Knude, iøvrigt ikke Sygdomstegn.
* 619	K.	24	10	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, h. Kind, v. Øre, Hals, begge Arme, Krop.	Næsehule.	$^{5}/_{11}$ „	49	141	—	**Helbredet** * $^{5}/_{5}$ 02: Smukt Arvæv, ikke tydelige Sygdomstegn.
620	K.	47	11	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder og Ører.	Næsehule.	$^{5}/_{11}$ „	48	55	$^{9}/_{9}$ 01	**Helbredet** * $^{6}/_{9}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
621	M.	40	26	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	—	$^{8}/_{11}$ „	57	157	$^{14}/_{12}$ 01	**Helbredet** * $^{26}/_{7}$ 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
622	K.	4	$1^{1}/_{2}$	**Lille.** H. Kind.	—	$^{9}/_{11}$ „	6	4	$^{23}/_{9}$ 01	**Helbredet** * $^{1}/_{4}$ 02: Arret næppe synligt, ikke Sygdomstegn.
623	M.	26	10	**Middelstor.** Næse, begge Kinder, h. Arm.	Næsehule.	$^{9}/_{11}$ „	45	35	$^{16}/_{2}$ 01	**Helbredet** * $^{2}/_{3}$ 01: Ikke Sygdomstegn, senere ikke set.
624	K.	59	10	**Lille.** Hals.	—	$^{12}/_{11}$ „	9	21	—	**Næsten helbredet.** Siden April 01 kun enkelte smaa Knuder.
625	M.	25	20	**Middelstor.** Hals.	—	$^{13}/_{11}$ „	26	45	$^{30}/_{8}$ 01	**Helbredet** * $^{27}/_{12}$ 01 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
626	M.	40	3	**Stor.** Næse		$^{14}/_{11}$				

				Kinder.						
628	K.	20	1	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule, begge Tonsiller.	$^{17}/_{11}$ „	37	88	—	**Væsentlig bedret.** Haardnakket Slimhindelidelse med gentagne smaa Udbrud.
629	K.	47	15	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{20}/_{11}$ „	34	115	—	**Næsten helbredet.** Siden Marts 01 kun faa spredte Knuder.
630	K.	42	32	**Stor.** H. Kind, h. Haand.	—	$^{26}/_{11}$ „	32	83	$^{3}/_{8}$ 01	**Helbredet** * Siden Marts 01: Ansigtet frit, paa Haanden enkelte Knuder. $^{30}/_{5}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
631	K.	17	$1^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse.	Næsehule, Tandk., Gane.	$^{1}/_{12}$ „	23	8	$^{10}/_{1}$ 01	**Helbredet** * $^{25}/_{9}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
632	K.	23	15	**Stor.** Begge Kinder, Hals.	Strube.	$^{4}/_{12}$ „	16	127	$^{29}/_{7}$ 01	**Helbredet** * $^{3}/_{4}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
633	K.	27	$1^{1}/_{2}$	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule.	$^{10}/_{12}$ „	17	80	$^{23}/_{5}$ 01	**Helbredet** * $^{5}/_{5}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
634	K.	13	7	**Lille.** H. Arm.	—	$^{11}/_{12}$ „	10	—	$^{18}/_{12}$ 00	**Helbredet** * $^{3}/_{11}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
635	K.	18	4	**Middelstor.** H. Kind, Hals,	—	$^{13}/_{12}$ „	15	43	$^{18}/_{12}$ 01	**Helbredet** * $^{15}/_{4}$ 02 Ikke Sygdomstegn.
636	K.	33	21	**Middelstor.** H. Kind, Hals.	—	$^{14}/_{12}$ „	13	52	$^{9}/_{3}$ 01	**Helbredet** * $^{11}/_{7}$ 02: Godt Arvæv, ikke tydelige Sygdomstegn.
637	M.	12	$1^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse.	Næsehule, Tandk., Gane.	$^{14}/_{12}$ „	13	24	$^{26}/_{3}$ 01	**Helbredet** * $^{2}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn
538	K.	16	15	**Megetudbredt.** Begge Kinder, Hage, Hals, Krop	—	$^{17}/_{12}$ „	11	185	$^{12}/_{8}$ 01	**Helbredet** * $^{1}/_{7}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
639	M.	18	13	**Middelstor.** V. Kind, Hals.		$^{18}/_{12}$ „	10	15	$^{13}/_{3}$ 01	**Helbredet** * $^{24}/_{1}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
640	K.	33	3	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{18}/_{12}$ „	2	36	$^{21}/_{10}$ 01	**Helbredet** * $^{7}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
641	K.	40	20	**Megetudbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder. Pande, v. Arm.	Næsehule.	$^{2}/_{1}$ 01	—	183	$^{21}/_{10}$ 01	**Helbredet** * $^{22}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.

* Se Tavle XLIII & XLIV.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1901	Sidst behandlet	Resultat
642	K.	19	18	**Megetudbredt.** Begge Kinder, v. Øre, Hals, Krop.	—	$^{3}/_{1}$ 01	246	—	**Næsten helbredet.** Siden Juli 01 kun faa spredte Knuder. $^{8}/_{9}$ 02: Kun et Par tvivlsomme Pletter.
643	K.	44	23	**Megetudbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Pande, v. Arm.	Næsehule.	$^{3}/_{1}$ „	165	—	**Næsten helbredet.** Siden Juli 01 kun faa spredte Knuder. $^{1}/_{10}$ 02: I Panden et lille Saar. Ansigtet iøvrig frit.
644	K.	31	10	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{3}/_{1}$ „	57	$^{9}/_{3}$ 01	**Helbredet** * $^{6}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
645	K.	40	40	**Megetudbredt.** Hele Ansigtet, v. Øre, Hals.	—	$^{4}/_{1}$ „	144	—	**Væsentlig bedret.** Jævn Fremgang med Aftagen af Infiltration og Knuder.
646	M.	28	4	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{4}/_{1}$ „	71	$^{25}/_{6}$ 01	**Helbredet** * $^{17}/_{7}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
647	M.	35	30	**Megetudbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Ører, Hals.	Næsehule, Overlæbe.	$^{4}/_{1}$ „	227	—	**Helbredet** * Siden Juni 01 kun faa spredte Knuder. $^{14}/_{9}$ 02: Solidt Arvæv, ikke Sygdomstegn.
648	M	17	6	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, v. Kind.	Næsehule, Svælg.	$^{5}/_{1}$ „	69	$^{10}/_{5}$ 01	**Helbredet** * $^{11}/_{3}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
649	K.	62	10	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{5}/_{1}$ „	72	—	**Helbredet** * Siden Mai 01 kun faa spredte Knuder. $^{18}/_{8}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
650	M.	21	10	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{5}/_{1}$ „	73	$^{29}/_{6}$ 01	**Helbredet** * $^{20}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
651	K.	38	10	**Middelstor.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{6}/_{1}$ „	122	--	**Helbredet** * $^{11}/_{8}$ 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
652	K.	47	20	**Stor.** H. Kind.	—	$^{7}/_{1}$ „	61	$^{17}/_{5}$ 01	**Næsten helbredet.** $^{17}/_{7}$ 02: Kun enkelte

654	M.	15	10	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hage.	Overlæbe.	$^{10}/_{1}$ „	54	$^{3}/_{6}$ 01	**Helbredet** * $^{17}/_{8}$ 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
655	K.	22	3	**Lille.** H. Kind.	—	$^{16}/_{1}$ „	8	$^{26}/_{2}$ 01	**Helbredet** * $^{22}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
656	M.	47	43	**Meget udbredt.** V. Kind, Øre, Hals, v. Arm.	—	$^{16}/_{1}$ „	179	$^{30}/_{4}$ 01	**Væsentlig bedret.** Fortsat Lysbehandling i Hjemmet.
657	M.	18	6	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, h. Tinding, h. Haand, Krop.	Næsehule, Strube.	$^{16}/_{1}$ „	64	—	**Næsten helbredet.** Siden Mai 01 kun faa spredte Knuder. $^{1}/_{5}$ 02: Ansigtet frit. Paa Kroppen 2 Knuder.
658	K.	21	1	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{21}/_{1}$ „	55	$^{1}/_{5}$ 01	**Næsten helbredet.** $^{28}/_{11}$ 01 Brev: Ikke Sygdomstegn. $^{18}/_{7}$ 02: Atter nogle friske Knuder.
* 659	K.	40	2	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, h. Knæ.	Næsehule.	$^{21}/_{1}$ „	125	—	**Helbredet** * Siden Juni 01 kun faa spredte Knuder. $^{9}/_{6}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
660	M.	18	7	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals, Krop.	Næsehule.	$^{23}/_{1}$ „	224	—	**Næsten helbredet.** Siden Juli 01 kun spredte Knuder. $^{1}/_{8}$ 02: Ansigtet tilsyneladende frit.
661	M.	16	$2^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse, h. Kind og øvre Øjelaag.	Næsehule.	$^{23}/_{1}$ „	48	-	**Næsten helbredet.** Gentagne smaa Udbrud fra Næsehulen.
662	M	29	9	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule, Overlæbe.	$^{25}/_{1}$ „	107	$^{4}/_{7}$ 01	**Næsten helbredet.** Senere Lysbehandling i München.
663	K.	48	37	**Meget udbredt.** Hele Ansigtet, v. Øre, Hals.	Næsehule, Læber, Tandkød.	$^{25}/_{1}$ „	222	—	**Væsentlig bedret.** Tilfældet nærmest haabløst med store Destruktioner; næsten total Blindhed.
664	M.	46	11	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe, Tandkød, Gane, Svælg.	$^{26}/_{1}$ „	16	$^{15}/_{2}$ 01	**U. K. Død** $^{25}/_{2}$ 01 af Tb. pulm.

* Se Tavle XLV.

No.	Kon	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1901	Sidst behandlet	Resultat
665	K.	40	2	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{1}/_{2}$ 01	53	—	**Helbredet** * Siden April 01 kun enkelte Knuder. $^{3}/_{6}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
666	M.	23	15	**Meget udbredt.** H. Underextremitet.	—	$^{1}/_{2}$ „	98		**Væsentlig bedret.** Sammenhængende, dybt infiltreret Affektion. $^{1}/_{8}$ 02: God Ardannelse med spredte, ret talrige Knuder.
667	K.	45	40	**Meget udbredt.** V. Arm og Haand.	—	$^{5}/_{2}$ „	223	—	**Næsten helbredet.** $^{21}/_{4}$ 02: Haanden fri, paa Armen spredte Knuder.
668	M.	25	20	**Stor.** V. Arm og Haand.	—	$^{7}/_{2}$ „	97	$^{24}/_{5}$ 01	**Helbredet** * $^{11}/_{8}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
669	K.	4	1	**Lille.** V. Kind.	—	$^{12}/_{2}$ „	6	$^{28}/_{2}$ 01	**Helbredet** * $^{16}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn, Arret næppe synligt.
670	M.	19	8	**Middelstor.** Hals, begge Hænder.	—	$^{20}/_{2}$ „	25	—	**Næsten helbredet.** (Uregelmæssig Behandling). $^{7}/_{9}$ 02: Godt Arvæv, et Par smaa Knuder.
671	K.	20	8	**Middelstor.** Læber, v. Kind.	Læber.	$^{22}/_{2}$ „	54	—	**Helbredet** * Siden Septbr. 01: Huden fri, kun paa Læberne enkelte Knuder. $^{8}/_{8}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
672	M.	25	15	**Meget udbredt.** H. Kind, Hals, v. Haand og Fod.	—	$^{22}/_{2}$ „	132	$^{31}/_{7}$ 01	**Helbredet** * $^{9}/_{7}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
673	K.	21	17	**Middelstor.** V. Kind.	—	$^{23}/_{2}$ „	47	—	**Helbredet** * Uregelmæssig Behandling. $^{18}/_{7}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
674	K.	63	4	**Stor.** Næse, begge Kinder.	—	$^{2}/_{3}$ „	182	—	**Næsten helbredet.** Siden Aug. 01 kun faa spredte Knuder.
675	K.	42	8	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{5}/_{3}$ „	8	$^{12}/_{3}$ 01	**U. K. Død** $^{4}/_{4}$ 01 af Meningitis?
676	K	19	18	**Stor.** Begge Kinder, Hals, h. Arm.	—	$^{7}/_{3}$ „	88	—	**Helbredet** * Siden Aug. 01 kun enkelte smaa Knuder. $^{15}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
677	K.	44	22	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe,	—	$^{8}/_{3}$ „	273	—	**Væsentlig bedret.** Sammenhængende ulcereret Affektion. $^{12}/_{3}$ 02: Dgl. vis god Ar-

				læbe.	Gane.	/3 „	40	—	**Ringe Paavirkning.** Affektionen har bredt sig trods Behandling. (Tb. pulm.)
★ 680	M.	16	9	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	12/3 „	177	25/11 01	**Helbredet** * 19/7 02: Smukt Arvæv, ikke Sygdomstegn.
681	K.	45	1	**Lille.** Næse, Hals, h. Arm.	—	12/3 „	53	—	**Helbredet** * 15/7 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
682	K.	61	2	**Stor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	14/3 „	63	1/6 01	**U. K. Sygdom** (Tb. pulm.). Væsentlig bedret.
★ 683	K.	54	45	**Stor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	15/3 „	80	—	**Næsten helbredet.** 1/9 02: Kinderne fri, kun paa Næsen faa spredte Knuder.
684	K.	41	8	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, v. Øre, Hage, Hals.	—	19/3 „	203	—	**Partielt helbredet.** Siden Decbr. 01: Delvis godt Arvæv, kun spredte Knuder.
685	K.	54	16	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Pande.	Næsehule, Overlæbe, Gane.	20/3 „	105	17/7 01	**U. K. Negativt Resultat.** (Haabløst Tilfælde med sammenhængende, dyb Infiltration). Kendelig bedret.
686	K.	65	57	**Lille.** Næse.	Næsehule	23/3 „	11	—	**Næsten helbredet.** Foraar 02: Et lille Udbrud fra Næsehulen.
687	K.	22	9	**Middelstor.** Begge Kinder, h. Øre.	Tandkød, Strube.	23/3 „	17	13/4 01	**U. K. Død** Juni 01 af Tb. pulm.. Væsentlig bedret.
688	K.	30	4	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	23/3 „	62	18/6 01	**Helbredet** * 14/4 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
689	M.	55	18	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, v. Øre, Hals.	Næsehule, Overlæbe, Gane.	27/3 „	97	—	**Næsten helbredet.** Siden Juli 01 kun faa spredte Knuder.
690	K.	21	6	**Lille.** Næse, v. Kind, Pande.	Næsehule.	29/3 „	42	1/10 01	**Helbredet** * 2/7 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.

★ Se Tavle XLVI & XLVII.

No.	Kon	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1901	Sidst behandlet	Resultat
691	K.	27	1	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{2}/_{4}$ 01	67	—	**Næsten helbredet.** Siden Juli 01 kun faa spredte Knuder.
692	K.	40	27	**Stor.** Næse, Læber, begge Kinder, Hage.	Næsehule. Læber, Tandkød, Gane.	$^{3}/_{4}$ „	206	$^{30}/_{11}$ 01	**Helbredet** * $^{16}/_{9}$ 02: God Ardannelse, ikke tydelige Sygdomstegn.
693	K.	12	2	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{6}/_{4}$ „	22	$^{3}/_{7}$ 01	**Helbredet** * $^{4}/_{5}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
694	K.	25	16	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød, Gane.	$^{7}/_{4}$ „	193	—	**Næsten helbredet.** $^{1}/_{5}$ 02: Godt Arvæv, faa spredte Knuder.
695	M.	49	40	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, begge Arme.	Næsehule.	$^{10}/_{4}$ „	75	—	**Næsten helbredet.** Siden Juli 01 kun faa spredte Knuder.
696	K.	28	14	**Stor.** Næse, v. Kind, Hals, begge Overextremiteter.	—	$^{10}/_{4}$ „	101	—	**Næsten helbredet.** Uregelmæssig Behandling. Siden Septbr. 01 kun faa spredte Knuder. $^{28}/_{7}$ 02: Ansigtet frit.
697	K.	17	7	**Stor.** Næse, Læber, h. Kind, h. Øre, h. Haand, h. Læg.	Læber, Tandkød.	$^{12}/_{4}$ „	109	$^{7}/_{12}$ 01	**Helbredet** * $^{12}/_{3}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
698	M.	27	5	**Lille.** Næse.	Næsehule, Tandk., Gane.	$^{12}/_{4}$ „	68	$^{15}/_{7}$ 01	**Helbredet** * $^{27}/_{6}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
699	K.	32	4	**Lille.** Næse, v. Kind.	Næsehule.	$^{12}/_{4}$ „	52	—	**Næsten helbredet.** Foraar 02: Lille Udbrud fra Næsehulen.
700	K.	16	2	**Meget udbredt.** c. 50 Pletter (1 à 2 Cntm.) over hele Huden.	Næsehule, Tandkød, Gane.	$^{20}/_{4}$ „	149	—	**Helbredet** * $^{9}/_{4}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
701	K.	32	$11^{1}/_{2}$	**Lille.** Næse.	—	$^{22}/_{4}$ „	34	$^{24}/_{10}$ 01	**Helbredet** * $^{27}/_{8}$ 02: Ikke Sygdomstegn.

	705	K.	21	1	**Lille.** Næse.	Næsehule, Gane.	2 5 „	30	—	**Helbredet** * Foraar 02: Lille Udbrud fra Næsehulen. $^{9}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
	706	M.	22	10	**Meget udbredt.** Næse, begge Kinder, Hals.	Næsehule.	2 5 „	185	—	**Helbredet** * $^{18}/_{9}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
	707	M.	21	7	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Overlæbe, Tandk., Gane.	3 5 „	76	$^{12}{}_{12}$ 01	**Helbredet** * $^{31}{}_{7}$ 02: Godt Arvæv, ikke tydelige Sygdomstegn.
	708	M.	27	3	**Lille.** Næse.	Næsehule.	3 5 „	54	$^{7}{}_{8}$ 01	**Helbredet** * $^{21}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
*	709	K.	24	3	**Middelstor.** Næse, begge Kinder, v. Øre.		1 5 „	96	—	**Helbredet** * Siden Aug. 01 kun enkelte Knuder. $^{18}/_{9}$ 02: Smukt Arvæv, ikke Sygdomstegn.
	710	M.	23	10	**Stor.** Næse, Læber, begge Kinder, Hage.	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane.	1 5 „	63	$^{2}{}_{8}$ 01	**Helbredet** * $^{6}/_{7}$ 02: Godt Arvæv, ikke Sygdomstegn.
	711	M.	46	36	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, h. Kind, Hage, Hals.	—	6 5 „	199	$^{18}{}_{9}$ 01	**Væsentlig bedret.** Fortsætter Lysbehandling i Hjemmet (Sydrusland).
	712	M.	56	20	**Middelstor.** V. Kind.	—	6 5 „	95	—	**Væsentlig bedret.** Foraaret 02 lille Udbrud af friske Knuder. $^{3}/_{9}$ 02: Godt Arvæv, kun faa tydelige Knuder.
	713	K.	29	28	**Middelstor.** V. Haand.	—	7 5 „	86	$^{13}{}_{9}$ 01	**Næsten helbredet.** $^{19}/_{7}$ 02 Brev: Godt Arvæv, kun et enkelt lille skorpedækket Parti.
	714	K.	28	2	**Lille.** H. Kind.	—	9 5 „	17	—	**Helbredet** * Vinter 02 et Par smaa Knuder. $^{23}{}_{6}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
	715	K.	43	$^{1}/_{4}$	**Lille.** Næse.	Næsehule.	14 5 „	26	$^{2}{}_{7}$ 01	**Helbredet** * $^{7}/_{9}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
	716	K.	18	2	**Lille.** Næse.	—	17 5 „	2	$^{17}{}_{5}$ 01	**Helbredet** * $^{30}/_{4}$ 02: Ikke Sygdomstegn, næppe synligt Ar.
	717	K.	46	24	**Middelstor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	17 5 „	41	$^{19}{}_{7}$ 01	**Næsten helbredet.** $^{10}/_{7}$ 02: Overalt godt Arvæv, kun faa tydelige Smaaknuder.

* Se Tavle XLVIII.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygdvarighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1901	Sidst behandlet	Resultat
718	M.	36	20	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød, Gane, Svælg.	21/9 01	103	—	**Helbredet** * 10/7 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
719	K.	41	1	**Lille.** Næse.	Næsehule.	21/5 „	54	21/8 01	**Helbredet** * 17/4 02: Ikke Sygdomstegn.
720	K.	5	1	**Middelstor.** H. Kind, h. Arm.	—	23/5 „	46	—	**Helbredet** * 1/7 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
721	K.	41	12	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, v. Knæ.	Næsehule.	23/5 „	115	10/10 01	**Næsten helbredet.** 7/5 02 Brev: Overalt godt Arvæv, kun paa Næsen et lille Saar. (Tb. pulm.).
722	K.	17	10	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	25/5 „	147	11/12 01	**Helbredet** * 15/8 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
723	M.	49	40	**Meget udbredt.** Næse, v. Kind, Pande, v. Øre, Hals.	—	28/5 „	104	—	**Helbredet** * 13/8 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
724	M.	44	30	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, h. Kind, h. Øre, Hals.	—	3/6 „	154	18/9 01	**U. K. Sygdom** (Tb. pulm. gravis). Kendelig bedret.
725	K.	18	10	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, h. Kind.	Næsehule.	1/6 „	42	—	**Helbredet** * Vinter 02: Lille Udbrud. 23/8 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
726	K.	15	1½	**Middelstor.** Næse, v. Kind, v. Arm.	Næsehule.	5/6 „	35	14/12 01	**Helbredet** * 27/8 02: Ikke Sygdomstegn.
727	K.	19	1½	**Lille.** Næse.	Næsehule.	7/6 „	24	16/9 01	**Helbredet** * 16/5 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
728	M.	21	14	**Lille.** Næse, Overlæbe	Næsehule.	8/6 „	165	—	**Helbredet** * Vinter 02: En lille Knude paa Overlæben 28/5 02: Ikke Sygdomstegn.

				læbe, H. Kind.					Arvæv, et Par smaa Knuder. Lysbehandling i Stockholm.
732	K.	8	1	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, v. Fod.	Næsehule, Strube.	11 6 „	53	–	**Næsten helbredet.** Uregelmæssig Behandling (Coxitis). $^{17}/_{2}$ 02: Kun faa spredte Knuder.
733	K.	45	20	**Meget udbredt.** Næse, v. Kind, Hals.	-	11 6 „	135	$^{7}/_{11}$ 01	**Næsten helbredet.** $^{3}/_{6}$ 02 Brev: Godt Arvæv, kun faa tvivlsomme Knuder.
734	K.	38	32	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Tandkød.	13 6 „	55	$^{18}/_{10}$ 01	**Helbredet** * $^{11}/_{2}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
735	K	21	11	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	15 6 „	18	$^{27}/_{7}$ 01	**Helbredet** * $^{29}/_{7}$ 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
736	K.	43	16	**Lille.** Næse.	Næsehule.	17 6 „	25	$^{31}/_{7}$ 01	**Helbredet** * $^{1}/_{4}$ 02: Ikke Sygdomst. (Tb. pulm.)
737	M.	25	10	**Middelstor.** V. Kind.		18 6 „	30	$^{14}/_{8}$ 01	**Helbredet** * $^{1}/_{10}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
738	K.	28	20	**Middelstor.** V. Kind.	–	18 6 „	65	—	**Næsten helbredet.** Siden Aug. 01 kun faa, tvivlsomme Knuder.
739	K.	18	$^{3}/_{12}$	(Aldrig Hudaffektion).	Tandkød.	25 6 „	11	$^{27}/_{7}$ 01	*Helbredet* * $^{2}/_{8}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
740	M.	32	1	**Lille.** V. Haand.	—	28 6 „	5	$^{3}/_{7}$ 01	**Helbredet** * $^{1}/_{4}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
741	M.	11	4	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, v. Laar.	Næsehule, Overlæbe, Gane, Strube.	1 7 „	82	—	**Væsentlig bedret.** Uregelmæssig Behandling. (Tb. pulm.?)
742	K.	17	1	**Lille.** H. Kind, v. Haand.	-	2 7 „	30	$^{1}{}_{10}$ 01	**Helbredet** * $^{1}/_{9}$ 02: Ikke Sygdomstegn, næppe synligt Ar.
743	M.	61	12	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	5 7 „	72	$^{18}{}_{10}$ 01	**Helbredet** * $^{14}{}_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
744	K.	41	6	**Lille.** Næse.	Næsehule.	9 7 „	34	$^{22}{}_{8}$ 01	**Helbredet** * **Død** Marts 02 af Variola (i England). Sygehistorie Nr. 135.
745	M.	53	6	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hals.	Næsehule, Gane.	9 7 „	103	$^{16}{}_{10}$ 01	**Væsentlig bedret.** $^{2}/_{7}$ 02: Lidelsen har atter bredt sig noget. (Tb. pulm.)

No.	Kon	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1901	Sidst behandlet	Resultat
746	K.	35	30	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{16}/_{7}$ 01	56	$^{19}/_{10}$ 01	**Helbredet** * $^{20}/_{5}$ 02 Brev: Et lille Saar udenfor det tidligere behandlede Parti.
747	K.	1	$^{3}/_{4}$	**Middelstor.** H. Kind. Overlæbe, v. Skulder, h. Underextr., v. Læg, Krop.	—	$^{17}/_{7}$ „	8	—	**Næsten helbredet.** $^{1}/_{7}$ 02: Kun i 2 af de c 10 spredte Pletter endnu tvivlsomme Knuder.
748	K.	29	4	**Middelstor.** Næse, Overlæbe.	Næsehule, Gane.	$^{17}/_{7}$ „	82	—	**Helbredet** * Siden Decbr. 01 kun enkelte Knuder. $^{13}/_{6}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
749	K.	29	18	**Stor.** H. Haand og Arm.	—	$^{17}/_{7}$ „	64	$^{3}/_{10}$ 01	**Helbredet** * $^{21}/_{7}$ 02 Brev: Ikke Sygdomstegn.
750	K.	45	25	**Meget udbredt.** Næse, Læber, begge Kinder.	Næsehule, Læber.	$^{18}/_{7}$ „	154	—	**Helbredet** * Siden Novbr. 01 kun spredte Knuder. $^{15}/_{7}$ 02: Smukt Arvæv, ikke Sygdomstegn.
751	K.	18	12	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hage, Hals, begge Overext., v. Underextr., h. Fod, Krop.	Næsehule.	$^{19}/_{7}$ „	172	—	**Partielt helbredet.** $^{10}/_{9}$ 02: Ansigt og Hals fri, paa Extremiteterne delvis godt Arvæv, endnu en Del Knuder.
752	K.	17	2	**Stor.** Næse, Overlæbe, v. Kind, Hals, begge Overextr.	Næsehule, Gane, Svælg, Strube.	$^{1}/_{8}$ „	120	—	**Helbredet** * $^{28}/_{6}$ 02: Ikke Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
753	K.	17	11	**Meget udbredt.** V. Kind, Hals, h. Haand og Arm.	—	$^{3}/_{8}$ „	132	—	**Partielt helbredet.** $^{6}/_{9}$ 02: Ansigt og Hals fri, paa Extremiteterne endnu Knuder.
754	K.	50	3	**Lille.** Næse, h. Kind.	—	$^{20}/_{8}$ „	71	—	**Helbredet** * $^{27}/_{2}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
[illegible]									

				læbe, begge Kinder.					kun faa spredte Knuder.
758	K.	21	15	**Middelstor.** Begge Kinder, Hals.	Næsehule.	$^{24}/_{8}$ „	48	$^{8}/_{11}$ 01	**Helbredet** * $^{21}/_{4}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
759	K.	19	17	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Pande, h. Øre, Hage, Hals.	Næsehule, Overlæbe.	$^{26}/_{8}$ „	112	—	**Næsten helbredet.** $^{14}/_{7}$ 02: Godt Arvæv, kun faa spredte Knuder.
760	K.	30	1	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{27}/_{8}$ „	13	$^{21}/_{9}$ 01	**Helbredet** * $^{25}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
761	K.	44	17	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule, Tandk., Gane.	$^{27}/_{8}$ „	57	$^{22}/_{11}$ 01	**Helbredet** * $^{17}/_{5}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn. (Tb. pulm.)
762	K.	71	3	**Lille.** Næse, h. Kind.	Næsehule.	$^{27}/_{8}$ „	14	$^{27}/_{9}$ 01	**Helbredet** * $^{27}/_{8}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
763	M.	13	1	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{28}/_{8}$ „	42	$^{19}/_{11}$ 01	**Helbredet** * $^{25}/_{7}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
764	K.	52	20	**Middelstor.** Næse, begge Kinder.	Næsehule.	$^{29}/_{8}$ „	47	$^{31}/_{10}$ 01	**Næsten helbredet.** $^{5}/_{7}$ 02: H. Kind fri, paa Næse og v. Kind faa spredte Knuder.
765	K.	39	27	**Stor.** Næse, Læber, begge Kinder.	Næsehule, Læber, Gane.	$^{29}/_{8}$ „	41	-	**Næsten helbredet.** Uregelmæssig Behandling. Siden Novbr. 01 kun faa spredte Knuder.
766	K.	33	17	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{29}/_{8}$ „	64	—	**Helbredet** * $^{19}/_{7}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
767	K.	15	8	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule.	$^{30}/_{8}$ „	69	$^{29}/_{11}$ 01	**Helbredet** * $^{11}/_{10}$ 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
768	K	18	2	**Lille.** Næse	Næsehule.	$^{31}/_{8}$ „	50	$^{3}/_{12}$ 01	**Næsten helbredet.** $^{25}/_{8}$ 02: Lille Udbrud fra Næsehulen.
769	K.	19	11	**Middelstor.** Næse, h. Kind.	—	$^{2}/_{9}$ „	23	—	**Næsten helbredet.** Uregelmæssig Behandling. $^{15}/_{8}$ 02: Tre tvivlsomme Knuder.
770	K.	17	$2^{1}/_{2}$	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, h. Kind, Hals.	Næsehule.	$^{4}/_{9}$ „	73	—	**Helbredet** * $^{9}/_{7}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1901	Sidst behandlet	Resultat
771	M.	34	27	**Middelstor.** V. Kind og Øre, Hals, h. Arm.	—	$^{6}/_{9}$ 01	20	$^{1}/_{10}$ 01	**Væsentlig bedret.** $^{11}/_{8}$ 02 Brev: Kinden fri, paa Øret endnu Knuder.
772	K.	33	17	**Lille.** Næse.	Næsehule.	$^{11}/_{9}$ „	40	$^{11}/_{11}$ 01	**Helbredet** * $^{28}/_{6}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
773	M.	11	4	**Lille.** V. Kind.	—	$^{18}/_{9}$ „	17	$^{18}/_{11}$ 01	**Helbredet** * $^{22}/_{4}$ 02: Glat Arvæv. Udenfor det behandlede Parti en enkelt frisk Knude.
774	K.	10	8	**Lille.** V. Haand.	—	$^{18}/_{9}$ „	21	$^{25}/_{10}$ 01	**Helbredet** * $^{26}/_{10}$ 02: Ikke Sygdomstegn.
775	K.	17	16	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{19}/_{9}$ „	59	—	**Næsten helbredet.** Siden Novbr. 01 kun enkelte smaa Knuder.
776	M.	37	20	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Pande, Hage, Hals, begge Laar.	Næsehule.	$^{20}/_{9}$ „	96		**Næsten helbredet.** $^{4}/_{7}$ 02: Overalt godt Arvæv, kun faa spredte Knuder.
777	K.	12	1	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, h. Ben.	Næsehule.	$^{23}/_{9}$ „	10	—	**Væsentlig bedret.** Uregelmæssig Behandl. $^{26}/_{9}$ 02: Kinderne fri; iøvrig kun faa spredte Knuder.
778	K.	10	2	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{23}/_{9}$ „	51	—	**Helbredet** * Siden Decbr. 01 kun faa Knuder. $^{30}/_{9}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
779	K.	27	11	**Lille.** Hage.	—	$^{24}/_{9}$ „	19	$^{29}/_{10}$ 01	**Helbredet** * $^{2}/_{7}$ 02: Ikke tydelige Sygdomstegn.
780	K.	27	24	**Lille.** V. Kind.	—	$^{24}/_{9}$ „	23	$^{1}/_{11}$ 01	**Helbredet** * $^{5}/_{9}$ 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
781	K.	28	20	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	$^{26}/_{9}$ „	44	$^{9}/_{12}$ 01	**Helbredet** * $^{28}/_{5}$ 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
782	K.	18	1	**Lille.** Næse.	Næsehule, Strube.	$^{27}/_{9}$ „	9	$^{8}/_{10}$ 01	**U. K. Død** $^{17}/_{6}$ 02 af Tb. pulm. dupl, Væsentlig bedret. $^{8}/_{5}$ 02 Brev: Kun ubetyde-

				begge Kinder.					
785	K.	58	1	**Middelstor.** Næse.	Næsehule.	1/10 „	39	—	**Helbredet** * Uregelmæssig Behandling. 9/8 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.
786	M.	21	7	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, v. Kind.	Næsehule.	2/10 „	64	—	**Næsten helbredet.** Siden Decbr. 01: Næsen fri. 9/9 02: Kun et Par tvivlsomme Knuder.
787	K.	15	9	**Lille.** V. Øre.	—	4/10 „	20	—	**Væsentlig bedret.** Uregelmæssig Behandling. 2/6 02: Delvis godt Arvæv, paa Lobulus nogle Smaaknuder.
788	M.	23	7	**Lille.** Næse, v. Kind.	Næsehule.	12/10 „	40		**Helbredet** * Siden Febr. 02 ikke tydelige Sygdomstegn.
789	M.	39	30	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Næsehule, Gane, Strube.	12/10 „	76	—	**Væsentlig bedret.** Siden Decbr. 01 kun faa, tvivlsomme Knuder.
790	K.	40	20	**Middelstor.** H. Kind.	Næsehule.	15/10 „	40	—	**Næsten helbredet.** Siden Decbr. 01 kun faa smaa Knuder. 8/7 02: Godt Arvæv, en enkelt Knude. (Tb. pulm.).
791	M.	40	36	**Meget udbredt.** V. Kind, Øre, Hals.	—	16/10 „	63	—	**Næsten helbredet.** 4/7 02: Overalt godt Arvæv, kun faa, tvivlsomme Smaaknuder.
792	K.	22	12	**Stor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, h. Arm.	Næsehule, Overlæbe, Tandk., Strube	22/10 „	8	-	**Næsten helbredet.** Behandlingen afbrudt 30/10 01—2/7 02. 1/9 02: Kun faa tvivlsomme Knuder. (Tb. pulm. dupl. cavern.).
793	M.	16	1	**Lille.** Næse, v. Kind, Hals.	Næsehule.	4/11 „	43		**Næsten helbredet.** Siden Decbr. 01 kun enkelte smaa Knuder.
794	K.	48	7	**Lille.** Næse.	Næsehule.	4/11 „	63	- -	**Helbredet** * Siden Februar 02 ikke tydelige Sygdomstegn.
795	K.	34	1	**Lille.** Næse, Overlæbe.	Næsehule.	7/11 „	29	—	**Næsten helbredet.** Siden Decbr. 01 kun enkelte tvivlsomme Knuder.
796	K.	15	2	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, begge Kinder.	Tandkød.	7/11 „	47	—	**Helbredet** * Siden Mai 02 ikke tydelige Sygdomstegn.
797	K.	30	24	**Middelstor.** Næse, Overlæbe, v. Kind.	Næsehule.	9/11 „	12	—	**Næsten helbredet.** Uregelmæssig Behandling.
798	K.	44	3	**Middelstor.** Næse.	Næsehule.	13/11 „	26	13/12 01	**Helbredet** * 28/7 02 Brev: Ikke tydelige Sygdomstegn.

No.	Køn	Alder i Aar	Sygd.varighed i Aar	Hudlidelsens Udbredning og Sæde	Slimhindelupus	Behandlingen begyndt	Antal af enkelte Lysbehandlinger 1901	Sidst behandlet	Resultat
799	K.	14	14	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hage, Hals, v. Øre, v. øvre Øjelaag.	Næsehule, Læber.	$^{19}_{11}$ 01	29	—	**Væsentlig bedret.** $^{1}/_{10}$ 02: Overansigtet næsten frit, Partiet om Munden stadig ulcereret. (Tb. pulm.).
800	M.	21	7	**Meget udbredt.** Næse, Overlæbe, begge Kinder, Hage, Hals, v. Laar	Næsehule, Læber, Tandkød, Gane.	$^{21}_{11}$ „	39	—	**Næsten helbredet.** $^{12}/_{7}$ 02: Overalt god Ardannelse, kun faa, spredte Knuder. (Tb. pulm.).

SYGEHISTORIER

Sygehistorie Nr. 1.

Nr. 1, Mand, 46 Aar, København.

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 8 Aar af v. Kind, vokset jævnt trods energisk kirurgisk Behandling: Brænding, Udskrabning, Transplantation (i alt over 30 Chloroformnarkoser).

$^{20}/_{11}$ 95. Sundt Udseende. Paa h. Kind sammenhængende barnehaandstor Affektion, delvis aragtig med talrige Knuder. — Middelstort Tilfælde.

Lysbehand. $^{20}/_{11}$ 95–$^{1}/_{4}$ 96 (c. 4 Maaneder).

Oktober 1896 en ærtstor Knude.

Lysbehandl. (faa Séancer).

Siden Oktober 96 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{1}/_{7}$ 02: Glat Arvæv, Transplantationslapperne ret iøjnefaldende.

Sygehistorie Nr. 2.

Nr. 15, Kvinde, 21 Aar, København.

Ikke Tub. i Familien; selv skrantende som Barn (Øjenlidelse, Blegsot).

Lup. vulg. i 7 Aar af Næsen, udgaaet fra Næsehulen, langsom Vækst. Tidligere uregelmæssig Behandling: Udskrabning og Brænding uden synderlig Virkning.

$^{16}/_{12}$ 96. Sundt Udseende. Angrebet er bløde Næse med Svulst, Rødme og typiske Knuder; lille Defekt af h. Næsevinge. — Lille Tilfælde. — Næseborerne stærkt forsnævrede, Slimhindelidelsen udhelet.

Spredt Lysbeh. $^{16}/_{12}$ 96–$^{8}/_{7}$ 97 (98 Sé).

$^{17}/_{3}$ 98 Paa Næsetippen en hampefrøstor skorpet Knude.

Lysbehandl. $^{17}/_{3}$—$^{13}/_{6}$ 98 (25 Séancer).

Siden Juni 98 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{30}/_{8}$ 02: Lidet synligt Arvæv, Defekten som før Behandlingen.

Sygehistorie Nr. 3.

Nr. 19, Kvinde, 6 Aar, København.
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 2 Aar af h. Kind; behandlet 3 Gange med Udskrabning; forbigaaende Virkning.
$^{15}/_{1}$ 97. Sundt Udseende. Angrebet er h. Kind: en aragtig Plet (1 × 1,5 Cntm.) med tre typiske Knuder. — Lille Tilfælde.
Spredt Lysbehandl. $^{15}/_{1}$–$^{13}/_{9}$ 97 (8 Séancer).
Siden September 97 ikke Sygdomstegn. Sidst set Juni 1900: Næppe synligt Ar.

Sygehistorie Nr. 4.

Nr. 22, Kvinde, 30 Aar, Jylland (By).
Ikke Tub. i Familien; selv i det hele rask.
Lup vulg. i $4^{1}/_{2}$ *Aar*, kun behandlet med Salve.
$^{18}/_{1}$ 97. Sundt Udseende. Angrebet er Næsen: ret betydelig Defekt af Apex, Svulst, sammenhængende Saar (3 × 3 Cntm.) med Knuder i Omfanget. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen væsentlig udhelet Lidelse med stor Defekt i Sept. cartilag, (aldrig behandlet).
Lysbehandl. $^{18}/_{1}$–$^{4}/_{7}$ 97 (140 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattampons.
$^{24}/_{2}$ 98. Delvis Ardannelse, smaa Saar ved begge forreste Næseborsvinkler.
Lysbeh. $^{24}/_{2}$–$^{22}/_{6}$ og $^{13}/_{10}$–$^{3}/_{12}$ 98 (134 Sé).
Siden December 98 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{7}/_{6}$ 00: Glat Arvæv, naturlig Farve, den gamle Defekt kun lidet vansirende. Brev $^{11}/_{8}$ 02.
Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 5.

Nr. 30, Mand, 25 Aar, Fyen (Land).
Ikke Tub. i Familien; selv skrofuløse Øre- og Øjenlidelser.
Lup. vulg. i 23 Aar, begyndt paa Halsen, kort efter Vaccination. For 10 Aar siden blev Næsen og begge Kinder angrebne, — langsom Vækst. Behandlet i nogle Aar kirurgisk (Brænding, Excision og Transplant.), derefter Tuberkulin, i de senere Aar kun Lapisstift.
$^{1}/_{4}$ 97. Sundt Udseende. Angrebet er Næsen (ret stor Defekt, Arvæv med endel Knuder), og h. Kind (3 × 3 Cntm. med talrige

Knuder). Paa v. Kind og Hals Ar uden Knuder. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen er Lidelsen udhelet.

Lysbehandl. $^{1}/_{4}$–$^{11}/_{6}$ 97 (107 Séancer).

Siden Juni 97 ingen Sygdomstegn. Sidst set $^{15}/_{6}$ 02: Arrene efter Lysbehandl. næppe synlige.

Sygehistorie Nr. 6.

Nr. 34, Kvinde, 23 Aar, København.

Ikke Tub. i Familien; selv altid rask.

Lup. vulg. i $6^{1}/_{2}$ *Aar* af Næsen; behandlet med gentagne Brændinger og Udskrabninger, samt Transplantation.

$^{11}/_{5}$ 97. Sundt Udseende. Angrebet er Næsen (Betydelig Defekt, Arvæv med talrige Knuder) og Overlæben (kun faa Knuder). — Lille Tilfælde. — I Næsehulen er Lidelsen udhelet med Defekt af Sept. cartilag.

Lysbehandl. $^{11}/_{5}$–$^{7}/_{9}$ 97 (73 Séancer).

Siden September 97 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{18}/_{11}$ 02: Glat, hvidt Arvæv, Defekten som før Behandlingen (bærer Prothese).

Sygehistorie Nr. 7. (Se Tavle I).

Nr. 40, Mand, 20 Aar, Jylland (Land).

Moderen død af Tub. pulm.; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 11 Aar, begyndt paa Næsen; langsom Vækst; tidligere kun lidet behandlet.

$^{8}/_{6}$ 97. Ret sundt Udseende. Angrebet er i Sammenhæng Næsen med betydelig Defekt, hele Overlæben, begge Kinder (c. 3 Cntm). Lidelsen hypertrofisk, ulcerativ. — Stort Tilfælde. — I Næsehulen udbredt Lidelse med Defekt i Sept. cartilag.

Lysbehandl. $^{8}/_{6}$ 97–$^{20}/_{6}$ 98 (302 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk, Galvanokaut.

$^{7}/_{11}$ 98. Godt Arvæv, hvori enkelte Knuder og Smaasaar; i Næsehulen stadig Ulceration.

Spredt Lysbeh. til $^{28}/_{8}$ 99 (55 Séancer).

Siden August 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{13}/_{8}$ 02: Lidet synlig Arvæv, Defekten af Næsen ret betydelig.
Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 8.

Nr. 41, Mand, 15 Aar, Jylland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 3 Aar; udgaaet fra Næsehulen, bredte sig hurtig over Næsens og Overlæbens v. Side samt v. Kind; tidligere Behandling kun lidet energisk.

$^{9}/_{6}$ 97. Sundt Udseende. Angrebet er i Sammenhæng bløde Næses

v. Side, Overlæbens v. Halvdel og v. Kind (et Par Centimeter). Overalt skællende Knuder, lille Defekt af v. Næsevinge. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulens v. Side spredte Knuder.

Lysbehandl. $^{9}/_{6}$–$^{9}/_{9}$ 97 (80 Séancer).

$^{20}/_{2}$ 99. Lille Udbrud af friske Knuder.

Spredt Lysbeh. $^{20}/_{2}$–$^{26}/_{6}$ 99 (46 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

Siden Juni 99 ingen Sygdomstegn. Sidst set $^{1}/_{11}$ 02: Glat Arvæv, Defekten af Næsevingen lidet synlig.
Slimhindelidelsen næsten udhelet.

Sygehistorie Nr. 9.

Nr. 45, Mand, 25 Aar, Sjælland (By).
Familieforhold og tidligere Sundhedstilstand ukendt.
Lup. vulg. i $^{1}/_{2}$ *Aar* af Næsen; ikke tidligere behandlet.
$^{6}/_{7}$ 97. Angrebet er Næsen: en hampefrøstor Knude paa Undersiden af Skillevæggen. — Lille Tilfælde.

Spredt Lysbehandl. $^{6}/_{7}$–$^{13}/_{12}$ 97 (6 Séancer).

Siden December 97 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{17}/_{10}$ 99: Næppe synligt Ar.

Sygehistorie Nr. 10.

Nr. 46, Mand, 20 Aar, København.
Ikke Tub. i nærmeste Slægt; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 4 Aar af begge Ører, tidligere behandlet med Salve og Ignipunktur.
$^{27}/_{7}$ 97. Sundt Udseende. Angrebet er begge Ørers Rande med noget Substanstab og en Del smaa Knuder. — Lille Tilfælde.

Lysbehandl. $^{27}/_{7}$–$^{25}/_{9}$ 97 (54 Séancer).

$^{12}/_{3}$ 98. Godt Arvæv paa h. Øre, men paa v. to tydelige Knuder.

Spredt Lysbehandl. $^{12}/_{3}$–$^{7}/_{7}$ 98 (48 Séancer).

Siden Juli 98 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{1}/_{7}$ 99: Glat Arvæv. Brev $^{7}/_{8}$ 02.

Sygehistorie Nr. 11.

Nr. 50, Kvinde, 39 Aar, Færøerne.
Ikke Tub. i Familien; selv skrofuløs som Barn.
Lup. vulg. i 29 Aar, udgaaet fra Næsehulen, langsom Vækst over Næse og begge Kinder; tidligere energisk Behandling (mest Udskrabninger og Ætssalver) med delvis Udheling.
$^{9}/_{9}$ 97. Sundt Udseende. Angrebet er i Sammenhæng Næsen og begge Kinder i stor Udstrækning: Arvæv med talrige spredte Knuder, ret betydelig Defekt af Næsen. — Stort Tilfælde.

Lysbehandl. $^{9}/_{9}$–$^{10}/_{12}$ 97 (76 Séancer).

Siden Decemb. 97 ikke Sygdomstegn. (En lille Plet paa h. Kind udenfor det tidligere behandlede fik i 1901 Lysbehandling 8 Séancer). Sidst set $^{1}/_{9}$ 02: Overalt godt Arvæv.

Sygehistorie Nr. 12.

Nr. 55, Mand, 32 Aar, København.
Moderen død af Tub. pulm; selv skrofuløs som Barn.
Lup. vulg. i 20 Aar; begyndt paa Næsen, bredte sig langsomt til v. Kind; behandlet for 7 Aar siden med Tuberkulin, de sidste 2 Aar med Ignipunktur med ringe Virkning.
$^{27}/_{9}$ 97. Ret sundt Udseende. Angrebet er Næsens v. Halvdel og nærmeste Del af v. Kind: skællende Knuder, nogen Defekt af v. Næseborsrand. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen spredte Knuder og stor Perforation i Septum. Tandkødet i Overmunden angrebet.
Lysbehandl. $^{27}/_{9}$–$^{26}/_{11}$ 97 (53 Séancer).
$^{8}/_{2}$ 98. Godt Arvæv med to, tre smaa Knuder.
Lysbehandl. $^{8}/_{2}$–$^{9}/_{3}$ 98 (14 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.
Siden Marts 98 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{8}/_{11}$ 02: Lidet synligt Arvæv, Defekten som før Behandlingen.
Slimhindelidelsen næsten udhelet.

Sygehistorie Nr. 13.

Nr. 59, Kvinde, 43 Aar, Fyen (By).
Faderen død af Tub. pulm; selv skrofuløs som Barn.
Lup. vulg. i 2Aar af Næsen, langsom Vækst; tidligere ringe Behandling.
$^{9}/_{10}$ 97. Ret sundt Udseende. Angrebet er hele bløde Næse med Svulst og delvis sammenhængende Knudedannelse. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen spredte Knuder.
Spredt Lysbeh. $^{9}/_{10}$ 97–$^{30}/_{11}$ 98 (159 Sé).
Til Slimhinderne: Sublimattampons, Jod-Jodk., Galvanokaut.
$^{2}/_{8}$ 99. Godt Arvæv, hvori to smaa Knuder.
Lysbehandl. $^{2}/_{8}$–$^{5}/_{8}$ 99 (5 Séancer).
Siden August 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{18}/_{11}$ 01: Kun lidet synligt Arvæv, ingen Defekt. Brev $^{12}/_{8}$ 02.
Slimhindelidelsen næsten udhelet.

Sygehistorie Nr. 14.

Nr. 64, Kvinde, 17 Aar, Jylland (Land).
En Søster død af Tub. pulm.; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 5 Aar, begyndt paa h. Kind, vokset jævnt; v. Kind først nylig angrebet; tidligere homøopathisk behandlet.

$^{22}/_{10}$ 97. Sundt Udseende. Angrebet er h. Kind (sammenhængende Knuder 4 × 4 Cntm.) og v. Kind (et Ar med en ærtstor Knude). — Middelstort Tifælde.

Spredt Lysbeh. $^{22}/_{10}$ 97-$^{29}/_{10}$ 98 (152 Sé).

$^{8}/_{1}$ 99. Godt Arvæv med enkelte spredte Knuder.

Lysbehandl. $^{9}/_{1}$-$^{6}/_{2}$ 99 (23 Séancer).

Siden Februar 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{5}/_{3}$ 02: Arret lidet synligt.

Sygehistorie Nr. 15.

Nr. 70, Kvinde, 6 Aar, Jylland (Land).

Ikke Tub. i nærmeste Slægt; selv skrofuløs.

Lup. vulg. i 10 Aar af Næsen, vokset langsomt; i de sidste 3 Aar behandlet energisk med Galvanocaut. med ringe Virkning.

$^{5}/_{11}$ 97. Sundt Udseende. Angrebet er bløde Næses v. Del: Smaasaar, talrige Knuder, nogen Defekt af Næseborsranden. — Lille Tilfælde. — V. Næsebor stærkt forsnævret, Slimhinden fri.

Spredt Lysbeh. $^{5}/_{11}$ 97-$^{15}/_{6}$ 98 (148 Sé).

$^{8}/_{10}$ 98: Enkelte Knuder paa Næsen samt paa Overlæbe og h. Kind (ny Affektion). I Næsehulen spredte Knuder.

Lysbehandl. $^{8}/_{10}$-$^{5}/_{12}$ 98 (25 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk.

$^{13}/_{3}$ 00: Næse, Overlæbe fri, paa h. Kind 5 smaa Knuder.

Lysbehandl. $^{13}/_{3}$-$^{7}/_{4}$ 00 (11 Séancer).

Siden April 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{2}/_{7}$ 01: Lidet synligt Ar, Defekten kun ringe. Brev $^{8}/_{6}$ 02.

Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 16. (Se Tavle III.)

Nr. 74, Mand, 19 Aar, Sjælland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv skrofuløs som Barn.

Lup. vulg. i 13 Aar, udgaaet fra Næsehulen, bredte sig langsomt over Næsen, Overlæben og i de sidste Aar til begge Kinder. Tidligere ikke behandlet.

$^{16}/_{11}$ 97. Sundt Udseende. Angrebet er Næsen med betydelig Svulst og Rødme, talrige Knuder, Defekt og Ulceration af h. Alas Rand; Lidelsen naar ud over Overlæbens h. Halvdel og c. 10 Cntm. ud paa h. Kind; paa v. Kind et tøøre-stort, knudet Parti. — Stort Tilfælde. — I Næsehulen udbredt Ulceration, ligesaa paa Overlæbens Slimhinde og Tandkødet. Taarevejslidelse.

Lysbeh. $^{16}/_{11}$ 97-$^{21}/_{12}$ 98 (320 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattampons, Jod-Jodk, Galvanokaut.

Siden December 98 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{13}/_{2}$ 01: Arvævet lidet synligt, Defekten som før Behandlingen.
Slimhinderne næsten udhelede.

Sygehistorie Nr. 17.

Nr. 75, Kvinde, 33 Aar, gift, Læsø.
Ikke Tub. i Familien; selv skrofuløs som Barn.
Lup. vulg. i 7 Aar, begyndt paa Næsen, bredte sig langsomt til begge Kinder. Behandlet ret energisk med Lapisstift, Ætssalver og Udskrabning; kun forbigaaende Virkning.
$^{2}/_{12}$ 97. Sundt Udseende. Angrebet er Næsen og tilgrænsende Del af begge Kinder: talrige flade Knuder, noget Arvæv, ringe Defekt af v. Næsevinge. — Middelstort Tilfælde. — Næseborerne forsnævrede. I Næsehulen er Slimhindelidelsen udhelet; paa Overmundens Tandkød spredte Saar. Taarevejslidelse.
Lysbehandl. $^{2}/_{12}$ 97-$^{12}/_{2}$ 98 (71 Séancer).
$^{27}/_{5}$ 99. Godt Arvæv, med faa spredte Knuder.
Lysbehandl. $^{27}/_{5}$-$^{12}/_{7}$ 99 (38 Séancer).
Til Slimhinderne: Jod-Jodk., Galvanokaut.
Siden Juli 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{19}/_{8}$ 02.

Sygehistorie Nr. 18.

Nr. 80, Kvinde, 26 Aar, gift, Sjælland (Land).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup vulg. i 9 Aar af Næsen, udgaaet fra Næsehulen. Behandlet en Gang med Udskrabning, Recidiv efter 3 Aar.
$^{10}/_{12}$ 97. Sundt Udseende. Angrebet er hele bløde Næse med betydelig Svulst, talrige Knuder, Saar langs h. Næseborsrand, Sammensynkning af Skillevæggen. — Lille Tilfælde. — Næseborerne stærkt forsnævrede, Vestibulum og Slimhinden svullen, ulcereret.
Lysbehandl. $^{10}/_{12}$ 97-$^{4}/_{8}$ 98 (88 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp.
$^{3}/_{5}$ 99. H. Næseborsrand ulcereret med Knuder i Omfanget.
Lysbehandl. $^{3}/_{5}$-$^{3}/_{6}$ 99 (25 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp. Galvanokaut.
Siden Juni 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{18}/_{10}$ 02: Smukt Arvæv, Næsespidsen indsunket, Næseborerne forsnævrede.
Slimhinderne udhelede.

Sygehistorie Nr. 19.

Nr. 81, Kvinde, 22 Aar, Jylland (By).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 6 Aar af Næsen, langsom Vækst; gentagen energisk Behandling (Udskrabning, Kauterisation) med forbigaaende Virkning. $^{10}/_{12}$ 97. Sundt Udseende. Angrebet er bløde Næse med Rødme, Svulst og spredte Knuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen Saardannelse, stor Perforation i Septum cartilag.

Lysbeh. $^{10}/_{12}$ 97-$^{10}/_{3}$ 98, $^{14}/_{4}$-$^{11}/_{6}$ 98 (130 Sé).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

$^{28}/_{11}$ 98. Faa spredte Knuder.

Lysbeh. $^{28}/_{11}$ 98-$^{9}/_{1}$ 99, $^{20}/_{2}$-$^{5}/_{4}$ 99 (53 Sé).

Til Slimhinderne: Som tidligere.

Siden April 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{7}/_{2}$ 01: Solidt Arvæv. Brev $^{21}/_{11}$ 02.

Slimhindelidelsen næsten udhelet.

Sygehistorie Nr. 20.

Nr. 85, Mand, 24 Aar, Jylland (By).

Ikke Tub. i Familien, selv som Barn Halskirtelsvulst.

Lup. vulg. i 9 Aar, begyndt paa v. Kind, bredte sig hurtigt til Næsen og h. Kind; behandlet for 5 Aar siden energisk med Kauterisation med forbigaaende Virkning.

$^{5}/_{1}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er Næsen og nærmeste Del af begge Kinder; Arvæv med spredte Knuder og Saar; betydelig Defekt og Sammensynkning af bløde Næse. — Middelstort Tilfælde. — Næseborerne stærkt forsnævrede, Slimhinden synes fri. Taarevejslidelse.

Lysbeh. $^{5}/_{1}$-$^{5}/_{6}$, $^{13}/_{7}$-$^{21}/_{7}$ 98 (140 Séancer).

$^{5}/_{4}$ 99: Paa Næsen nogle friske Knuder.

Spredt Lysbehandl. $^{5}/_{4}$—$^{23}/_{6}$ 99 (24 Séancer).

$^{22}/_{1}$ og $^{8}/_{5}$ 00: Paa Næsen enkelte Knuder.

Lysbeh. $^{22}/_{1}$-$^{26}/_{1}$, $^{8}/_{5}$-$^{12}/_{5}$ 00 (15 Séancer).

Siden Maj 00 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{29}/_{9}$ 02.

Sygehistorie Nr. 21.

Nr 86, Mand, 11 Aar, Sjælland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv Halskirtelsvulst og Øreflod.

Lup. vulg. i 3$^{1}/_{2}$ Aar af Næsen; gentagne operative Behandlinger (delvis Fjærnelse af v. Næsevinge) med forbigaaende Virkning.

$^{7}/_{1}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er Næsespidsen og v. Næsevinge med talrige Smaaknuder, stor Defekt af Næsevingen. Lille Tilfælde.

Lysbehandl. $^{7}/_{1}$-$^{8}/_{3}$, $^{15}/_{6}$ $^{18}/_{6}$ 98 (53 Séancer).

$^{26}/_{5}$ 99: I alt c. 10 Smaaknuder.

Lysbehandl. $^{26}/_{5}$-$^{13}/_{6}$ 99 (14 Séancer).

Siden Juni 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{23}/_{9}$ 02: Solidt Arvæv, Defekten som før Behandlingen.

Sygehistorie Nr. 22. (Tavle IV).

Nr. 87, Mand, 11 Aar, Fyen (By).

Ikke Tub. i Familien; selv skrofuløs.

Lup. vulg. i 2 Aar, begyndt paa Næsen, hurtig Vækst ud paa Overlæbe og begge Kinder, behandlet med Salve, Lapis og Udskrabning uden Virkning.

$^{11}/_{1}$ 98. Daarligt Udseende; Halskirtelsvulst, Øreflod, Keratoconjunctivitis. Angrebet er i Sammenhæng bløde Næse, hele Overlæben og store Partier af begge Kinder; ulcerativ, destruerende Affektion. — Stort Tilfælde. — Næsehulens og Overlæbens Slimhinder angrebne.

Lysbehandl. $^{11}/_{1}$ 98–$^{19}/_{1}$ 99 (251 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

1899—1900. Paa Huden kun enkelte Knuder; stadig Behandling af den haardnakkede Slimhindelidelse.

Spredt Lysbehandl. til $^{19}/_{9}$ 00 (45 Séancer).

Siden September 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{29}/_{8}$ 01: Glat smukt Arvæv, Næsedefekten som før Behandlingen. Brev $^{13}/_{8}$ 02. Slimhindelidelsen næsten udhelet.

Sygehistorie Nr. 23.

Nr. 94, Mand, 8 Aar, Sjælland (Land).

Moderen død af Tub. pulm.; selv skrofuløs.

Lup. vulg. i 8 Aar af h. Kind, langsom Vækst; tidligere kun Salvebehandling, uden Virkning.

$^{31}/_{1}$ 98. Ret sundt Udseende, Halskirtelsvulst. Angrebet er h. Kind: en Plet, 3 × 2 Cntm., med dyb Infiltration og talrige Knuder. — Lille Tilfælde.

Spredt Lysbeh. $^{31}/_{1}$–$^{14}/_{10}$ 98 (87 Séancer).

$^{18}/_{12}$. Et Par Smaaknuder.

Lysbehandl. $^{18}/_{12}$–$^{20}/_{12}$ (5 Séancer).

$^{12}/_{2}$ 00. Fire smaa Knuder.

Spredt Lysbehandl. til $^{23}/_{3}$ 00 (8 Séancer).

Siden Marts 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{18}/_{3}$ 02: Glat, lidet synligt Ar.

Sygehistorie Nr. 24. (Tavle VI).

Nr. 104, Kvinde, 22 Aar, Langeland (Land).

Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 6 Aar, begyndt paa Næsen, ret hurtig Vækst til Overlæbe og begge Kinder; behandlet energisk med gentagne Udskrabninger og 3 Gange Excision og Transplantation, med forbigaaende Virkning.

$^{19}/_{2}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er i Sammenhæng hele Næsen og Overlæben samt nærmeste Del af begge Kinder. Ulcerativ, destruerende Affektion. — Stort Tilfælde. — Slimhindelidelse i Struben.
Lysbehandl. $^{19}/_{2}$–$^{18}/_{8}$ 98 (152 Séancer).
$^{15}/_{11}$ 98. Faa spredte Knuder. Paa Prolab. sup. et stort Saar.
Spr. Lysbeh. $^{15}/_{11}$ 98–$^{20}/_{1}$ 99, $^{3}/_{5}$–$^{30}/_{6}$ 99.
Til Saaret paa Prolabiet: Udskrabning 2 Gange. (ialt 45 Sé).
Siden Juni 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{18}/_{8}$ 00: Glat, smukt Arvæv, Defekten som før Behandlingen. Brev $^{2}/_{5}$ 02.
Slimhindelidelsen udhelet spontant.

Sygehistorie Nr. 25.

Nr. 108, Kvinde, 27 Aar, Jylland (Land).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 7 Aar, udgaaet fra Næsehulen, langsom Vækst over Næsen; i de sidste Aar Affektioner paa Hagen, h. Øre og v. Arm; stadig behandlet med Udskrabninger og Ætsmidler, med ringe Virkning. $^{24}/_{2}$ 98. Ret sundt Udseende. Angrebet er bløde Næse med Svulst, Knuder og Saar; paa Hagen et Ar hvori to Smaaknuder, paa h. Øres Rand et ærtstort og paa v. Arm et toørestort knudet Parti. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen udbredt Slimhindelidelse, med stor Perforation i Septum cartilag; paa haarde Gane ret udbredt Lidelse.
Lysbehandl. $^{24}/_{2}$–$^{21}/_{7}$ 98 (129 Séancer).
Til v. Arm: Pyrogallussalve.
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.
$^{4}/_{11}$ 98. Næse og Hage fri, paa h. Øre og v. Arm enkelte Smaaknuder.
Slimhinderne i Bedring.
Lysbehandl. $^{4}/_{11}$–$^{14}/_{11}$ 98 (10 Séancer).
$^{8}/_{6}$ 99. Paa Næsen og Øret nogle friske Knuder; paa Prolabium sup. et ærtstort Saar. Slimhinderne i fortsat Bedring.
Lysbehandl. $^{8}/_{6}$–$^{27}/_{7}$ 99 (43 Séancer).
$^{26}/_{1}$ 00. Paa Næse og h. Øre atter nogle Knuder; Hagen og v. Arm fri, ligesaa Prolabiet og Ganen; i Næsehulen kun spredte Knuder.
Spredt Lysbehandl. $^{26}/_{1}$–$^{26}/_{4}$ 00 (45 Séancer).
Til Næsehulen: Som tidligere.
Siden April 00 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{29}/_{5}$ 02.

Sygehistorie Nr. 26.

Nr. 117, Kvinde, 21 Aar, Jylland (Land).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 10 Aar, begyndt paa Næsen, langsom Vækst ud paa Overlæbe og h. Kind; tidligere kun ringe Behandling.
$^{14}/_{3}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er hele bløde Næse med Svulst, talrige Knuder og betydelig Defekt af h. Næsevinge; Lidelsen gaar ned paa Overlæbens h. Halvdel, og c. 3 Cntm. ud paa h. Kind med talrige Knuder. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen spredte Knuder og Perforation i Septum cartilag.

Lysbehandl. $^{14}/_{3}$–$^{13}/_{8}$ 98 (131 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Galvanokaut.

$^{23}/_{2}$ 99: Godt Arvæv, ialt 7—8 Smaaknuder. Næsehulen næsten udhelet.

Lysbehandl. $^{23}/_{2}$–$^{6}/_{4}$ 99 (30 Séancer).

Siden April 99 ikke Sygdomstegn, sidst set $^{30}/_{8}$ 01: Arvævet lidet synligt, Næsedefekten som før Behandlingen. Brev $^{6}/_{6}$ 02. Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 27. (Tavle VII).

Nr. 124, Mand, 17 Aar, Jylland (By).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere Øreflod og Ostitis ulnæ.
Lup. vulg. i 4 Aar, udgaaet fra Næsehulen, ret hurtig Vækst over Næsen og ud paa h. Kind; gentagne Udskrabninger med forbigaaende Virkning.
$^{22}/_{3}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er hele bløde Næse med Svulst, Knuder og Saar; paa h. Kind to godt ørestore, skorpede Pletter. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen udbredt Lidelse med Perforation af Sept. cartilag; bløde Gane med Uvula og Struben angrebne.

Lysbehandl. $^{22}/_{3}$–$^{22}/_{8}$ 98 (126 (Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

Siden August 98 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{8}/_{7}$ 01: Smukt, lidet synligt Arvæv. Brev $^{13}/_{5}$ 02. Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 28.

Nr. 128, Kvinde, 4 Aar, København.
Faderen død af Tub. pulm.; selv tilbøjelig til Hoste.
Lup. vulg. i 3 Aar af v. Kind; aldrig behandlet.
$^{4}/_{4}$ 98. Ret sundt Udseende, Halskirtelsvulst. Angrebet er v. Kind: en rundagtig Plet paa 3 Cntm., flad, med talrige Knuder. — Lille Tilfælde.

Lysbehandl. $^{4}/_{4}$–$^{2}/_{7}$ 98 (57 Séancer).

Siden Juli 98 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{23}/_{9}$ 02: Næppe synligt Arvæv.

Sygehistorie Nr. 29. (Tavle VIII).

Nr. 133, Mand, 20 Aar, Jylland (By).

5 Søskende tuberkuløse; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 11 Aar, udgaaet fra dybere Skrofulider paa Halsen, bredte sig ret hurtigt over begge Kinder, Læber og Næsen, senere paa h. Albu, og v. Laar.

$^{28}/_{4}$ 98. Sundt Udseende, Halskirtelsvulst. Angrebet er i Sammenhæng hele Næsen og Overlæben, Underlæben og begge Kinder i stor Udstrækning; betydelig Infiltration, sammenhængende Knuder og Saar, ret stor Defekt af bløde Næse. Paa h. Albu et rundagtigt, skorpet Parti, c. 3 Cntm., paa v. Laar en lignende Affektion. — Meget udbredt Tilfælde. — I Næsehulen udbredt Affektion med stor Perforation i Sept. cartilag, Læbeslimhinder, Tandkød og Gane angrebne. Taarevejslidelse.

Lysbehandl. $^{28}/_{4}$ 98-$^{6}/_{7}$ 99 (303 Séancer).
Pyrogallussalve.
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

Siden Juli 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{1}/_{10}$ 02: Overalt godt blødt Arvæv. Næsedefekten som før Behandlingen. Slimhindelidelserne udhelede.

Sygehistorie Nr. 30. (Tavle X).

Nr. 141, Kvinde, 30 Aar, gift. Jylland (By).

Moderen død af Tub. pulm., selv tidligere skrofuløs.

Lup. vulg. i 15 Aar, udgaaet fra Næsehulen, langsom Vækst over Næsen, Overlæben og begge Kinder. For 7 Aar siden energisk Behandling med Udskrabning og Thermokaut uden Virkning.

$^{1}/_{6}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er i Sammenhæng hele Næsen, Overlæben, store Partier af begge Kinder, med Svulst, Rødme og sammenhængende, skorpede Knuder. Nogen Defekt af begge Næsevinger. — Meget udbredt Tilfælde. — I Næsehulen udbredt Lidelse. Taarevejslidelse.

Lysbehandl. $^{1}/_{6}$-$^{29}/_{10}$ 98 (131 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

Siden Oktober 98 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{1}/_{10}$ 02: Overalt godt Arvæv, lidet iøjenfaldende; Næsedefekten som før Behandlingen. Slimhindelidelsen næsten udhelet.

Sygehistorie Nr. 31. (Tavle XI).

Nr. 143, Kvinde, 43 Aar, gift. Sønderjylland, (Land).

Faderen død af Tub. pulm., selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 19 Aar, udgaaet fra Næsehulen, holdt sig længe begrænset; i sidste Aar Vækst over bløde Næse og ud paa Overlæbe og begge Kinder. Kun ringe Behandling.

$^{2}/_{6}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er hele bløde Næse med Svulst, Ulceration og ret betydelig Defekt; nærmeste Del af Overlæbe og af begge Kinder rød, svullen med spredte Knuder. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen næsten udhelet Lidelse med stor Perforation i Septum cart. Taarevejslidelse.

Lysbehandl. $^{2}/_{6}$-$^{2}/_{11}$ 98 (132 Séancer).

$^{21}/_{6}$ 00: Overalt godt Arvæv. Paa h. Kind et Par Smaaknuder udenfor det tidligere behandlede.

Lysbehandl. $^{21}/_{6}$-$^{30}/_{6}$ 00 (9 Séancer).

Siden Juni 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{25}/_{6}$ 01: Smukt Arvæv. Defekten som før Behandlingen. Brev $^{27}/_{8}$ 02. Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr 32.

Nr. 144, Kvinde, 62 Aar, gift, Jylland (Land).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 8 Aar, begyndt paa h. Kind, langsom Vækst; for 4 Aar siden blev Næsen angrebet og samtidig h. Haands 3dje Finger. Tidligere kun ringe Behandling.
$^{3}/_{6}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er hele Næsen med Rødme, Svulst og talrige Knuder, nogen Defekt af begge Næsevinger. Midt paa h. Kind et Ar, hvori 2 Smaaknuder; paa h. Haands 3dje Finger en ret stor Affektion med talrige Knuder. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen udbredt Lidelse med stor Perforation i Sept. cart. Taarevejslidelse.

Lysbeh. $^{3}/_{6}$-$^{3}/_{9}$, $^{18}/_{10}$-$^{3}/_{11}$ 98 (123 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Galvanokaut.

$^{21}/_{6}$ 00: Godt Arvæv, en lille Knude.

Lysbehandl. $^{21}/_{6}$-$^{2}/_{7}$ 00 (8 Séancer).

Siden Juli 00 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{5}/_{7}$ 02.
Slimhindelidelsen ikke fuldstændig udhelet.

Sygehistorie Nr. 33.

Nr. 147, Kvinde, 8 Aar, København.
Ikke Tub i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 2 Aar af v. Kind; kun lidet behandlet.
$^{15}/_{6}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er v. Kind: en Plet, 2 × 1 Cntm., flad, med talrige Smaaknuder. — Lille Tilfælde.

Lysbehandl. $^{15}/_{6}$-$^{12}/_{8}$ 98 (26 Séancer).

Siden August 98 ikke Sygdomstegn Sidst set $^{30}/_{8}$ 01: Lidet synligt Arvæv. Brev $^{1}/_{11}$ 02.

Sygehistorie Nr. 34.

Nr. 159, Kvinde, 18 Aar, København.

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere Ørelidelse og Hoftebetændelse. *Lup. vulg. i 10 Aar*, udgaaet fra Næsehulen, har bredt sig over Næsen, lidt ud paa v. Kind trods energisk Behandling med Udskrabning, Kautherisation, Ætssalver (paa Kysthospitalet i 2 Aar). $^{29}/_{6}$ 98. Ret sundt Udseende. Angrebet er hele bløde Næse med Svulst, talrige Knuder, nogen Defekt af Næsevingerne. Paa v. Kind en ærtstor Knude. — Middelstort Tilfælde.

I Næsehulen er Lidelsen næsten udhelet med stor Perforation i Sept cart.

Lysbehandl. $^{29}/_{6}$ 98–$^{10}/_{1}$ 99 (134 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk.

Siden Januar 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{1}/_{6}$ 01. Lidet synligt Arvæv, Næsedefekten som før Behandlingen. Brev $^{22}/_{6}$ 02. Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 35.

Nr. 162, Kvinde, 27 Aar, Jylland (Land).

Faderen død af Tub; selv tidligere Halskirtelsvulst; Kyfoskoliose. *Lup. vulg. i 8 Aar*, udgaaet fra Næsehulen, har bredt sig langsomt over Næsen. Tidligere kun en enkelt Udskrabning med ringe Virkning.

$^{5}/_{7}$ 98. Sygeligt Udseende. Angrebet er bløde Næse med Arvæv, spredte Knuder og Saar; ret betydelig Defekt. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen spredte Knuder. Taarevejslidelse.

Lysbehandl. $^{5}/_{7}$–$^{5}/_{9}$ 98 (55 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk.

I Foraaret 1900 en enkelt Knude, behandlet i Hjemmet med Galvanokaut.

Siden Foraaret 1900 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{28}/_{8}$ 02.

Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 36.

Nr. 163, Kvinde, 17 Aar, Jylland (By).

En Broder død af Tub. pulm.; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i $2^{1}/_{2}$ *Aar*, begyndt paa Næsen, senere en Plet over v. Øjenbryn, ved v. Kæbevinkel og paa h. Arm. Tidligere kun ringe Behandling.

$^{5}/_{7}$ 98: Sundt Udseende. Spredt Affektion: Paa Næsespidsens v. Side c. 10 Smaaknuder, over v. Øjenbryn en godt ærtstor Plet

og en lignende ved v. Kæbevinkel; paa h. Overarm en hampefrøstor Knude. — Lille Tilfælde.

Lysbeh. $^{5}/_{7}$-$^{3}/_{9}$, $^{19}/_{10}$-$^{2}/_{11}$ 98 (67 Séancer).

$^{15}/_{11}$ 99. Næsen og Armen fri. Ved v. Øjenbryn og Kæbevinkel to smaa Knuder. Paa h. Kind en frisk Knude.

Lysbehandl. $^{15}/_{11}$-$^{16}/_{12}$ 99 (24 Séancer).

Siden December 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{25}/_{6}$ 02.

Sygehistorie Nr. 37.

Nr. 165, Kvinde, 19 Aar, Sjælland (By).

En Faster død af Tub. pulm.; selv skrofuløs som Barn.

Lup. vulg. i 15 Aar af h. Kind. Langsom Vækst, tidligere to Gange Kautherisation med delvis Udheling.

$^{6}/_{7}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er h. Kind: Et Ar, 2 × 2 Cntm., i hvis Rand en Del Knuder. — Lille Tilfælde.

Lysbehandl. $^{6}/_{7}$-$^{28}/_{7}$ 98 (5 Séancer).

Siden Juli 98 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{6}/_{5}$ 02: Lidet synligt Ar.

Sygehistorie Nr. 38.

Nr. 170, Kvinde, 26 Aar, Jylland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere Halskirtelsvulst.

Lup. vulg. i 10 Aar, begyndt paa v. Kind; ret hurtig Vækst over Kinden og Halsen. Behandlet energisk med Lapis, Udskrabning og Thermokaut med forbigaaende Bedring.

$^{23}/_{7}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er v. Kind i Udstrækning af 10 × 5 Cntm. med talrige skorpede Knuder, en Del Arvæv; paa Halsen et Ar, hvori to ærtstore Knuder. — Stort Tilfælde.

Lysbehandl. $^{23}/_{7}$-$^{22}/_{10}$ 98 (79 Séancer).

Pyrogallussalve.

$^{30}/_{4}$ 1900. Glat Arvæv, hvori 7 friske Smaaknuder.

Lysbehandl. $^{30}/_{4}$-$^{13}/_{6}$ 00 (26 Séancer).

Siden Juni 1900 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{3}/_{8}$ 02.

Sygehistorie Nr. 39.

Nr. 171, Kvinde, 25 Aar, gift. Jylland (Land).

Moderens Forældre døde af Tub. pulm., en Broder har Lupus vulg. (Pt. Nr. 99); selv skrofuløs som Barn.

Lup. vulg. i 12 Aar, begyndt paa Næsetippen, langsom Vækst over Næsen og Overlæben. Gentagen Behandling med Udskrabning, Thermokaut og Tuberkulin med forbigaaende Virkning.

$^{27}/_{7}$ 98. Noget anæmisk med Halskirtelsvulst. Angrebet er bløde Næse og Overlæbe med Rødme, Afskalning og spredte Knuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen spredte Knuder.

Lysbehandl. $^{27}/_{7}$–$^{26}/_{10}$ 98 (78 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk.

Siden Oktober 98 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{7}/_{3}$ 99: Lidet synligt Arvæv. Brev $^{28}/_{9}$ 02.

Slimhindelidelsen ikke fuldstændig udhelet.

Sygehistorie Nr. 40.

Nr. 181, Kvinde, 37 Aar, gift, Jylland (By).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 8 Aar af Næsen, udgaaet fra Næsehulen. Energisk Behandling med Udskrabning, Thermokaut og Ætssalver med forbigaaende Virkning.

$^{13}/_{8}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er Næsespidsen med Rødme, Smaaknuder og et lille Saar. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen spredt Affektion. Taarevejslidelse

Lysbehandl. $^{13}/_{8}$–$^{13}/_{9}$ 98 (27 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattampons.

Siden September 98 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{13}/_{5}$ 02.

Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 41.

Nr. 182, Kvinde, 23 Aar, Jylland (By).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 7 Aar af v. Kind, langsom Vækst; tidligere ikke behandlet.

$^{15}/_{8}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er v. Kind: en Plet, 2×1 Cntm., med sammenhængende skællende Knuder. — Lille Tilfælde. —

Spredt Lysbehandl. $^{15}/_{8}$–$^{16}/_{11}$ 98 (29 Sé).

Siden November 98 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{17}/_{7}$ 00: Arret kun lidet synligt. Brev $^{11}/_{8}$ 02.

Sygehistorie Nr. 42.

Nr. 183, Kvinde, 29 Aar, Fyen (Land).

Faderen død af Tub. pulm.; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 20 Aar, udgaaet fra Næsehulen, ret hurtig Vækst over Næsen, senere ud paa Overlæben og h. Kind. I 10 Aar energisk Behandling med Thermokaut, med forbigaaende Virkning. Senere ikke behandlet.

$^{16}/_{8}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er i Sammenhæng hele

Næsen (med Svulst, Rødme, Saar, Knuder og betydelig Defekt), Overlæbens midterste Del og h. Kind (3 × 5 Cntm.). — Stort Tilfælde. — I Næsehulen og paa Overmundens Tandkød spredt Affektion. Taarevejslidelse.

Lysbehandl. $^{16}/_{8}$ 98-$^{28}/_{2}$ 99 (161 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk.

Siden Februar 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{23}{}_{7}$ 02: Glat smukt Arvæv. Defekten som før Behandlingen.
Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 43.

Nr. 184, Mand, 25 Aar, Jylland (By).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 6 Aar, udgaaet fra Næsehulen; udvendig kun Smaapletter, der aldrig er behandlede.
$^{18}/_{8}$ 98: Sundt Udseende. Angrebet er Næsen med Svulst, Rødme og faa spredte Knuder; paa Overlæben og v. Kind enkelte spredte Knuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen udbredt Affektion med stor Perforation i Septum cart. Taarevejslidelse.

Lysbeh. $^{18}/_{8}$-$^{23}/_{9}$, $^{20}/_{10}$-$^{4}/_{11}$ 98 (45 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.
$^{18}/_{1}$ 99: Paa Overlæben to distinkte Pletter.

Galvanokaut.

Siden Januar 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{28}/_{9}$ 02: Lidet synligt Arvæv.
Slimhindelidelsen næsten udhelet.

Sygehistorie Nr. 44.

Nr. 191, Mand, 38 Aar, Jylland (By).
Ikke Tub. i Familien; selv i 4 Aar lidende af Tub. pulm.
Lup. vulg. i $^{1}/_{2}$ *Aar* af Næsen, ikke behandlet.
$^{5}/_{9}$ 98: Ret sundt Udseende; Affektion af v. Lungespids. Angrebet er Næsens Spids og v. Vinge med Rødme, talrige Knuder og ringe Defekt. — Lille Tilfælde. —

Lysbehandl. $^{5}/_{9}$-$^{4}/_{10}$ 98 (26 Séancer).

$^{14}/_{8}$ 00: Paa Næsevingen et lille Saar og to smaa Knuder.

Spredt Lysbehandl. til $^{22}/_{9}$ 00 (17 Séancer).

Siden September 1900 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{20}/_{10}$ 02.

Sygehistorie Nr. 45.

Nr. 200, Kvinde, 37 Aar, gift, Jylland (By).
Ikke Tub. i Familien; selv altid rask.

Lup. vulg. i 18 Aar, begyndt paa Næsen; langsom Vækst over Næsen og ud paa begge Kinder. Tidligere behandlet med Salver og gentagne Udskrabninger med forbigaaende Virkning.
$^{26}/_{9}$ 98: Sundt Udseende. Angrebet er næsten hele Næsen med Svulst og talrige Knuder; nogen Defekt af Næsevingerne. Lidelsen gaar ud paa begge Kinder med spredte Knuder. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen faa spredte Knuder.

Lysbehandl. $^{26}/_{9}$–$^{26}/_{11}$ 98 (54 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk.

Siden November 98 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{13}/_{5}$ 99. Lidet synligt Ar; Defekten som før Behandlingen. Brev $^{8}/_{8}$ 02. Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 46.

Nr. 204, Kvinde, 19 Aar, Jylland (Land).
Tre Brødre døde af Tub. pulm.; selv skrofuløs som Barn.
Lup. vulg. i 8 Aar af Næsen, langsom Vækst. Tidligere en enkelt Udskrabning med ringe Virkning. For nylig Affektion under Hagen.
$^{10}/_{10}$ 98: Sundt Udseende. Angrebet er Næsens Spids og delvis Næsevingerne med Svulst, et godt ærtstort Saar omgivet af Knuder; ringe Defekt af h. Næsevinge. Under Hagen en enkelt ærtstor Knuder. — Lille Tilfælde. — Næseborene forsnævrede. I Næsehulen Ar efter udhelet Lidelse.

Lysbehandl. $^{10}/_{10}$ 98–$^{9}/_{1}$ 99 (78 Séancer).

Siden Januar 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{10}/_{12}$ 01.

Sygehistorie Nr. 47.

Nr. 210, Kvinde, 13 Aar. Jylland (Land).
Ikke Tub. i Familien; selv skrofuløs fra 9-Aars Alderen: Halskirtelsvulst, Øjenlidelse; for 1 Aar siden Pleuritis.
Lup. vulg. i 2 Aar, begyndt paa h. Næsevinge, jævn Vækst. Operation med delvis Fjærnelse af Næsevingen, senere ikke behandlet. Om Slimhindelidelsen ingen Oplysninger.
$^{26}/_{10}$ 98: Sygeligt Udseende, Halskirtelsvulst, Infiltration af h. Lungespids. Angrebet er bløde Næse med Svulst, talrige Knuder, Defekt af h. Næsevinge og Destruktion af Skillevæggen. Ud paa v. Kind en lille Samling Knuder. Overlæbens h. Halvdel let svullen med smaa Knuder. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen stor Perforation i Sept. cartilag, Saar i h. Vestibulum, paa Slimhinden spredte Knuder. Tandkødet i Overmunden angrebet. Dobbeltsidig Taarevejslidelse.

Lysbehandl. $^{26}/_{10}$ 98–$^{26}/_{1}$ 99 (78 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Nitr. argent.
Siden Januar 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet.
Død Juni 1901 af Tarmtuberkulose.

Sygehistorie Nr. 48. (Se Tavle XV og XVI).
Nr. 212, Kvinde, 29 Aar, Jylland (Land).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 13 Aar, begyndt paa venstre Haand; for 6 Aar siden samtidig i Ansigtet og paa h. Haand, for 1 Aar siden paa v. Fod. Jævn Vækst. Gjentagen Behandling med Brænding, Udskrabning og Salver, med ringe Virkning.
$^{29}/_{10}$ 98: Sundt Udseende. Angrebet er: H. Kind, en Plet (8 × 3 Cntm.), v. Kind (5 × 3), Panden (2 × 2), under Hagen (2 × 2): flad sammenhængende Knudedannelse. Paa begge Hænder og Arme udbredt knudet Lidelse, paa v. Fod en Plet (2 × 2 Cntm.). — Meget udbredt Tilfælde. — I Næsehulen spredte Saar mest paa Septum cart.; paa Tandkødet i Undermunden Knudedannelse, Epiglottis svullen, ujævn, knudet.
Lysbeh. (Ansigt) $^{29}/_{10}$ 98–$^{18}/_{2}$ 99 (c. 100 Sé).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk.
Til Extremit.: Pyrogallol; senere Lysbehandl.
Siden Februar 99: I Ansigtet ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{8}/_{6}$ 02: I Ansigtet næppe synlige Ar, Hænderne ligesaa; paa Armene faa spredte Knuder.
Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 49.
Nr. 213, Mand, 20 Aar, Jylland (By).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere Halskirtelsvulst og Øjenlidelse.
Lup. vulg. i 8 Aar, udgaaet fra Næsehulen, bredte sig langsomt over Næsen til Kinderne og Overlæben. Behandlet et Aar paa Kysthospitalet, senere 3 Gange Hospitalsophold med gentagne Brændinger og Udskrabninger, alt med forbigaaende Virkning.
$^{1}/_{11}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er: Næsten hele Næsen, nærmeste Del af begge Kinder og Overlæben. Arvæv med talrige Knuder; stor Defekt af bløde Næse. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen er Skillevæggen destrueret, Næseaabningen stærkt forsnævret, Slimhinden ulcereret.
Lysbehandl. $^{1}/_{11}$ 98–$^{16}/_{3}$ 99 (116 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp.
Siden Marts 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{10}/_{6}$ 01: Solidt Arvæv, Defekten som før Behandlingen. Brev $^{22}/_{6}$ 02.
Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 50.

Nr. 218, Mand, 34 Aar, Fyn (Land).
Forældre og to Søskende døde af Tub.; selv i Barndommen Halskirtelsvulst.
Lup. vulg. i 20 Aar, udgaaet fra Næsehulen, bredte sig jævnt over Næsen til Overlæben (videre ind i Munden) og v. Kind. H. Tommel angrebet for 12 Aar siden. Behandling væsentlig intern, kun en enkelt Udskrabning.
$^{8}/_{11}$ 98: Ret sundt Udseende. Angrebet er: Bløde Næse, Overlæbens v. Halvdel, v. Kind (9 × 7 Cntm.): betydelig Infiltration, spredte Knuder og Saar, aragtig Defekt af Næse og Overlæbe. Paa h. Tommel en ulcerativ Affektion. — Stort Tilfælde. — Næseborerne stærkt forsnævrede. Slimhinderne paa Overlæbe, Tandkød, Gane og Svælg angrebne. Dobbeltsidig Taarevejslidelse.
Lysbehandl. $^{8}/_{11}$ 98–$^{3}/_{5}$ 99 (147 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.
Siden Maj 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{9}/_{5}$ 02.
Slimhindelidelsen ikke fuldstændig udhelet.

Sygehistorie Nr. 51. (Se Tavle XVII).

Nr. 225, Kvinde, 24 Aar, Jylland (Land).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 5 Aar, begyndt paa v. Næsevinge, ret hurtig Vækst over Næse og Overlæbe. Behandlet 4 Gange paa Sygehus med Udskrabning og Brænding; forbigaaende Virkning.
$^{14}/_{11}$ 98. Sundt Udseende, ringe Halskirtelsvulst. Angrebet er: Bløde Næse og Overlæbens v. Halvdel; hypertrofisk, ulcerativ Lidelse. — Middelstort Tilfælde. — Næseborene stærkt forsnævrede, paa Slimhinden i Næsehulen spredte Knuder. Tandkødet angrebet i Over- og Undermund.
Lysbehandl. $^{14}/_{11}$ 98–$^{15}/_{3}$ 99 (101 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.
Siden Marts 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{29}/_{5}$ 01: Smukt Arvæv, ringe Defekt med Indsænkning af v. Næsevinge. Brev $^{27}/_{8}$ 02. Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 52.

Nr. 228, Kvinde, 39 Aar, Jylland (Land).
Forældrene døde af Tub. pulm.; selv skrofuløs som Barn, jævnlig Hoste.
Lup. vulg. i 22 Aar, begyndt paa Næsen, langsom Udbredning til v. Kind, i de senere Aar ogsaa til h. Kind og Overlæbe. Tidligere stadig Behandling, mest med Udskrabning, med forbigaaende Bedring.

$^{28}/_{11}$ 98: Sygeligt Udseende, Tub. pulm., dext. Øjenlidelse med venstresidig Synstab. Angrebet er i Sammenhæng hele Næsen, Overlæben og begge Kinderne i stor Udstrækning. Affektionen dybt infiltreret, delvis aragtig med talrige Knuder og Saar; betydelig Defekt af bløde Næse. — Meget udbredt Tilfælde. — Næseborene stærkt forsnævrede, i Næsehulen er Lidelsen næsten udhelet.

Lysbehandl. $^{28}/_{11}$ 98-$^{28}/_{4}$ 99 (129 Séancer).
Pyrogallussalve.

Til Slimhinderne: Sublimattamp.

$^{27}/_{10}$ 99: Glat Arvæv med ialt 14 tydelige Knuder.

Lysbehandl. $^{27}/_{10}$-$^{21}/_{11}$ 99 (17 Séancer).

$^{23}/_{6}$ 00: Kun 4 smaa Knuder.

Spredt Lysbehandl. til $^{6}/_{9}$ 00 (28 Séancer).

Siden September 00 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{13}/_{11}$ 02.
Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 53.

Nr. 235, Mand, 23 Aar, København.
Faderen død af Tub.; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 15 Aar, udgaaet fra en suppurerende Halskirtel, langsom Vækst over Halsens Forflade; behandlet i flere Aar med Galvanokaut; delvis Udheling.
$^{5}/_{12}$ 98. Sundt Udseende, angrebet er: Halsens Forflade (7 × 9 Cntm). Arvæv med talrige større og mindre Knuder. — Middelstort Tilfælde.

Lysbehandl. $^{5}/_{12}$ 98-$^{4}/_{2}$ 99 (52 Séancer).

Siden Februar 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{21}/_{5}$ 02: Glat blødt Arvæv.

Sygehistorie Nr. 54.

Nr. 238, Mand, 18 Aar, Jylland (By).
Ikke Tub. i Familien; selv altid rask.
Lup. vulg. i 10 Aar, udgaaet fra Næsehulen, bredte sig hurtig over Næsen med betydelig Destruktion, behandlet for 8 Aar siden paa Kysthospitalet i $^{1}/_{2}$ Aar, derefter fri $1^{1}/_{2}$ Aar. For 4 Aar siden Hospitalsophold med kirurgisk Behandling, delvis Udheling.
$^{12}/_{12}$ 98. Sundt Udseende; angrebet er bløde Næse: Arvæv med betydelig Destruktion; langs Næseranden Svulst og Rødme. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen er Skillevæggen destrueret; uregim. fælles Næseaabning, udbredt Slimhindelidelse. Overlæbens Slimhinde og Tandkødet i Overmunden angrebne. Taarevejslidelse.

Lysbehandl. $^{12}/_{12}$ 98-$^{12}/_{3}$ 99 (77 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Galvanokaut.

Siden Marts 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet, sidst Brev $^{12}/_{5}$ 02.
Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 55.

Nr. 243, Mand, 19 Aar, København.
Ikke Tub. i Famlien; selv i Barndommen Halskirtelsvulst, Saar i Næsen, Taarevejslidelse.
Lup. vulg. i 3 Aar, udgaaet fra Næsehulen; begyndt som en lille Knude paa h. Kind, i den senere Tid hurtig Udbredning til Næse og Overlæbe. Ingen tidligere Behandling.
$^{28}/_{12}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er Næsen og Overlæben med Svulst og spredte Knuder; paa h. Kind en Plet, c. $1^{1}/_{2} \times 1^{1}/_{2}$ Cntm. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen skorpede Saar, stor Perforation i Septum cartilag.

Lysbehandl. $^{28}/_{12}$ 98-$^{28}/_{2}$ 99 (55 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattampons., Galvanokaut.

Siden Februar 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{11}/_{10}$ 00: Lidet synligt Arvæv. Brev $^{8}/_{8}$ 02.
Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 56. (Se Tavle XX).

Nr. 250, Kvinde, 34 Aar, gift, Falster (By).
Ikke Tub. i Familien, selv altid rask; i mange Aar Skorpedannelse i Næsen,
Lup. vulg. i 4 Aar, udgaaet fra Næsehulen, hurtig Udbredning over Næse og begge Kinder; tidligere ikke behandlet.
$^{9}/_{1}$ 99: Sundt Udseende, ringe Halskirtelsvulst; angrebet er i Sammenhæng hele Næsen og begge Kinder symmetrisk (c. 8×5 Cntm). Betydelig Svulst, overalt Knuder, ved Næseborsrandene Saardannelse. — Stort Tilfælde. — I Næsehulen spredte Saar og stor Perforation i Septum cartilag.

Lysbehandl. $^{9}/_{1}$-$^{8}/_{5}$ 99 (101 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

Siden Mai 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{17}/_{4}$ 01: Arvævet lidet synligt, ingen Defekt. Brev $^{30}/_{12}$ 01.

Sygehistorie Nr. 57. (Se Tavle XXI).

Nr. 252, Mand, 6 Aar, København.
Ikke Tub. i Familien; selv Pleuritis for 3 Aar siden.
Lup. vulg. i 3 Aar paa v. Kind, langsom Vækst; ikke tidligere behandlet.

$^{10}/_{1}$ 99: Sundt Udseende. Midt paa v. Kind en rund Plet, c. 2 Cntm., med sammenhængende Knuder. — Lille Tilfælde.

Spredt Lysbehandl. $^{10}/_{1}$-$^{11}/_{7}$ 99 (10 Séancer).

Siden Juli 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{15}/_{7}$ 02: Arret næppe synligt.

Sygehistorie Nr. 58.

Nr. 254, Kvinde, 29 Aar, Fyn (By).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask; i 6 Aar Saar og Skorper i Næsen.

Lup. vulg. i $^{3}/_{4}$ *Aar* af Næsen, udgaaet fra Næsehulen. Tidligere ikke behandlet.

$^{13}/_{1}$ 99: Ret sundt Udseende. Angrebet er Næsespidsen, med Svulst, Rødme og et ærtstort Saar. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen spredte Knuder og Saar.

Lysbehandl. $^{13}/_{1}$-$^{11}/_{3}$ 99 (45 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk.

Siden Marts 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{20}/_{7}$ 01: Arvævet næppe synligt, ingen Defekt. Brev $^{15}/_{7}$ 02.

Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 59.

Nr. 258, Mand, 39 Aar, Fyn (Land).

En Søster død af Tub.; selv i Barndommen suppurerende Halskirtler. *Lup. vulg. i 25 Aar,* udgaaet fra Halskirtlerne, bredte sig langsomt op paa begge Kinder, Næsen, h. Øre og h. øvre Øjelaag. Behandlet for 18 Aar siden paa Kysthospitalet, hvorefter varig Heling af Næsen, senere talrige Udskrabninger og Brændinger med ringe Virkning.

$^{24}/_{1}$ 99: Ret sundt Udseende. Angrebet er h. Øres nederste Del, Kinden foran Øret og videre i et Bælte ned paa Halsen til hen imod v. Kæbevinkel (Største Bredde 6 Cntm.); paa v. Kind en Plet, 8 × 3 Cntm., paa h. øvre Øjelaag et lille Saar med Knuder i Omfanget. Lidelsen flad, delvis aragtig med talrige Knuder; paa Næsen glat Arvæv uden Knuder. — Stort Tilfælde. — I Næsehulen Ar efter udhelet Lidelse.

Lysbeh. $^{24}/_{1}$-$^{11}/_{3}$; $^{19}/_{4}$-$^{9}/_{5}$ 99 (62 Séancer).

Siden Maj 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. **Død** Sommeren 01 af Sukkersyge.

Sygehistorie Nr. 60.

Nr. 259, Mand, 4 Aar, København.

Tub. i Familien; selv Halskirtelsvulst, Øjenlidelse og Øreflod.

Lup. vulg. i $^{1}/_{2}$ *Aar* paa v. Kind, ikke tidligere behandlet.

$^{25}/_{1}$ 99: Ret sundt Udseende, Halskirtelsvulst. Paa h. Kind en Plet, 2 × 1 Cntm.; svullen, rød, med Knuder. — Lille Tilfælde. — Spredt Lysbehandl. $^{25}/_{1}$–$^{23}/_{3}$ 99 (8 Séancer).
Siden Marts 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{30}/_{8}$ 01: Arret næppe synligt.

Sygehistorie Nr. 61. (Se Tavle XXII).
Nr. 266, Kvinde, 23 Aar, Sverig (Land).
Forældre og flere Søskende døde af Tub. Selv i Barndommen Kirtelsvulst og Øjenlidelse.
Lup. vulg. i 7 Aar, begyndt paa v. Næsevinge, bredte sig langsomt over bløde Næse, lidt ud paa Overlæben og v. Kind; samtidig Saar i Næsen. Kun behandlet med Husraad.
$^{2}/_{2}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er hele bløde Næse: Hypertrofisk, ulcerativ Lidelse; paa Overlæben Arvæv med nogle Knuder, paa v. Kind faa Knuder. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen udbredt Slimhindelidelse med Perforation i Septum cart. Dobbeltsidig Taarevejslidelse.
Lysbehandl. $^{2}/_{2}$–$^{19}/_{5}$ 99 (90 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk.
Siden Maj 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{3}/_{4}$ 02: Lidet synligt Arvæv, ingen Defekt.
Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 62.
Nr. 274, Kvinde, 10 Aar. Norge (By).
Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i $^{1}/_{2}$ Aar, begyndt (efter Mæslinger) paa Næseskillevæggen, bredte sig til Overlæben og Kinderne. Samtidig Spina ventosa og en subkutan Skrofulide paa Brystet.
$^{18}/_{2}$ 99: Sundt Udseende, talrige svulne Halskirtler. Angrebet er Næseskillevæggen, svullen, ulcereret; paa Overlæben og Kinderne enkelte smaa Knuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen enkelte Knuder.
Lysbehandl. $^{18}/_{2}$–$^{11}/_{5}$ 99 (60 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp.
Siden Maj 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{28}/_{7}$ 02.
Slimhindelidelsen udhelet, de andre tuberkuløse Lidelser helede spontant.

Sygehistorie Nr. 63. (Se Tavle XXIII).
Nr. 776, Mand, 40 Aar, Jylland (Land).
Ikke Tub. i Familien, selv altid rask; i mange Aar Taarevejslidelse.

Lup. vulg. i 9 Aar af Næsen, udgaaet fra Næsehulen; samtidig spredt Affektion paa Halsen.
Behandlet først med Udskrabning, hvorefter helet i 3 Aar, senere Tuberkulin med forbigaaende Virkning.
$^{20}/_{2}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er Næsen med stærk Infiltration, Knuder og skorpede Saar. Paa Halsens Forside 4 smaa, knudede Pletter. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen Svulst, Knuder og Saar.

Lysbehandl. $^{20}/_{2}$–$^{23}/_{6}$ 99 (105 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp, Galvanokaut.
Siden Juni 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{30}/_{5}$ 01: Lidet synligt Arvæv, ingen Defekt. Brev $^{6}/_{5}$ 02.
Slimhindelidelsen næsten udhelet.

Sygehistorie Nr. 64.

Nr. 283, Kvinde, 8 Aar, Jylland (Land).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 1 Aar, begyndt paa Næsen; i den senere Tid Udbredning til Overlæben og v. Kind. Behandlet paa Sygehus med Excision uden Bedring, senere Salvebehandling.
$^{7}/_{3}$ 99. Sundt Udseende, en Del Halskirtelsvulst. Angrebet er: Bløde Næse, som er stærk svullen med Knuder og Saar og ret stor Defekt af v. Næsevinge; paa Overlæbe og v. Kind nogle Knuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen faa, spredte Knuder.

Lysbehandl. $^{7}/_{3}$-$^{26}/_{6}$ 99 (30 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp.
Siden Juni 99 ikke Sygdomstegn. Set $^{21}/_{2}$ 00: Lidet synligt Arvæv, Defekten kun ringe. Sidst Brev $^{17}/_{8}$ 02.
Slimhindelidelsen næppe fuldstændig udhelet.

Sygehistorie Nr. 65.

Nr. 295, Kvinde, 66 Aar, gift, Sverig (By).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 15 Aar, udgaaet fra Næsehulen, holdt sig længe begrænset om Næseborerne, har i sidste Aar bredt sig over Næsen, Overlæben og Kinderne. Stadig Behandling: Udskrabning, Brænding og Ætssalver med forbigaaende Bedring.
$^{11}/_{4}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er: Bløde Næse, ret betydelig Defekt og Ulceration om Næseborerne, desuden spredte Knuder. Overlæben er stærkt svullen med store Saar; ud paa Kinderne

spredte Knuder. — Middelstort Tilfælde. — Næseborerne stærkt forsnævrede med Ulceration i Vestibulum; Overlæbens Slimhinde ulcereret.

Lysbehandl. $^{11}/_{4}$-$^{29}/_{7}$ 99 (75 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., nitras argentic.

Siden Juli 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidste Brev $^{21}/_{9}$ 02.

Sygehistorie Nr. 66.

Nr. 303, Kvinde, 59 Aar, gift, Jylland (Land).

2 Søstre døde af Tub. pulm.; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 16 Aar, udgaaet fra Næsehulen, bredte sig langsomt over Næsen, i de senere Aar ud paa begge Kinder. Tidligere kun ringe Behandling.

$^{21}/_{4}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er hele Næsen med Svulst, stor Ulceration, Knuder og nogen Defekt. Paa begge Kinder spredte Knuder og Saar. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen spredte Knuder, Perforation i Septum cart.

Lysbehandl. $^{21}/_{4}$-$^{25}/_{10}$ 99 (154 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp.

Siden Oktober 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{22}/_{2}$ 02.

Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 67.

Nr. 308, Kvinde, 18 Aar, Sjælland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv i Barndommen suppurerende Halskirtler. *Lup. vulg. i 5 Aar,* begyndt paa Næsen; langsom Vækst, i den sidste Tid til Overlæben og begge Kinder. Jævnlig behandlet med Galvanokaut, med ringe Virkning.

$^{21}/_{4}$ 99. Ret sundt Udseende. Angrebet er bløde Næse med Rødme, spredte Knuder og Smaasaar; Overlæben svullen med spredte Knuder, paa h. Kind 3—4, paa v. Kind 1 Knude. — Middelstort Tilfælde. I Næsehulen spredte Knuder. Overmundens Tandkød, Svælg og Strube angrebne.

Lysbehandl. $^{24}/_{4}$-$^{31}/_{8}$ 99 (73 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

Siden August 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{19}/_{12}$ 01: Lidet synligt Arvæv. Brev $^{13}/_{8}$ 02.

Slimhindelidelserne udhelede.

Sygehistorie Nr. 68.

Nr. 309, Kvinde, 4 Aar, København.

Ikke Tub. i Familien; selv altid rask.

Lup. vulg. i 4 Aar paa h. Arm; stadig behandlet med Lapis, Udskrabning og Galvanokaut, med delvis Udheling.
$^{25}/_{4}$ 99. Sundt Udseende. Paa h. Underarm et Ar, 2 × 1 Cntm., hvori en hampefrøstor Knude. — Lille Tilfælde. —
Lysbehandl. $^{25}/_{4}$ 99 ($^{1}/_{2}$ Time).
Siden April 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{6}/_{9}$ 01: Næppe synligt Ar.

Sygehistorie Nr 69.
Nr. 319, Kvinde 23 Aar, Sjælland (Land).
Moderen lider af Tub. pulm.; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 8 Aar af h. Kind; i de sidste Maaneder livlig Vækst; tidligere ingen Behandling.
$^{5}/_{5}$ 99. Sundt Udseende. Paa h. Kind en uregelmæssig Plet, 3 × 2 Ctm., delvis aragtig, med c. 15 hampefrøstore, overfladiske Knuder. — Lille Tilfælde. —
Lysbeh. $^{5}/_{5}$-$^{22}/_{6}$, $^{21}/_{8}$-$^{28}/_{8}$ 99 (30 Séancer).
Siden August 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{1}/_{5}$ 02: Lidet synligt Arvæv.

Sygehistorie Nr. 70.
Nr. 322, Kvinde, 19 Aar, Falster (By).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere skrofuløs: Halskirtelsvulst, Øjenlidelse og Saar i Næsen.
Lup. vulg. i 1 Aar, udgaaet fra Næsehulen, vokset langsomt ud over Næsen og Overlæben. Hudlidelsen ikke tidligere behandlet.
$^{11}/_{5}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er Næsespidsen og Midten af Overlæben med henholdsvis 10—15 og 3 Smaaknuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen udbredt Affektion med stor Perforation i Septum cart.
Lysbehandl. $^{11}/_{5}$-$^{10}/_{7}$ 99 (38 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.
Siden Juli 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{30}/_{7}$ 02: Næppe synligt Ar.
Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 71.
Nr. 327, Kvinde, 31 Aar, gift, Jylland (By).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask; i mange Aar Taarevejslidelse.
Lup. vulg. i 2 Aar af Næsen, udgaaet fra Næsehulen; tidligere behandlet med Lapis og en enkelt Udskrabning med ringe Virkning.
$^{17}/_{5}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er Næsens Spids og Skille-

væg med ialt c. 10 Smaaknuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen spredte Knuder. Taarevejslidelse.

Lysbeh. $^{17}/_{5}$-$^{30}/_{6}$, $^{20}/_{9}$-$^{20}/_{10}$ 99 (56 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Galvanokaut.

Siden Oktober 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{15}/_{4}$ 02.

Slimhindelidelsen ikke fuldstændig udhelet.

Sygehistorie Nr. 72. (Se Tavle XXV).

Nr. 331, Kvinde, 18 Aar, Jylland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv i Barndommen skrofuløs: suppurerende Halskirtler.

Lup. vulg. i 4 Aar, begyndt paa v. Kind, ret hurtig Vækst til Næsen, Overlæben og h. Kind; tidligere behandlet 3 Gange med Udskrabning og Thermokaut med forbigaaende Virkning; senere kun Husraad.

$^{20}/_{5}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er i Sammenhæng hele Næsen og et Parti af v. Kind, 4 × 5 Ctm.; paa Overlæbe og h. Kind kun faa Knuder. Lidelsen hypertrofisk ulcerativ. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen og paa Overmundens Tandkød spredte Knuder og Saar, lille Perforation i Septum cart.

Lysbehandl. $^{20}/_{5}$-$^{15}/_{10}$ 99 (125 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Galvanokaut.

Siden Oktober 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{30}/_{8}$ 01: Smukt, lidet synligt Arvæv (paa Overlæben udenfor den tidligere Affektion en lille frisk Knude, der svandt efter Lysbehandling, 4 Séancer). Brev $^{9}/_{5}$ 02.

Slimhindelidelsen synes udhelet.

Sygehistorie Nr. 73.

Nr. 335, Kvinde, 6 Aar, Sjælland (Land).

Ikke Tub. i Familen; selv Halskirtelsvulst og adenoide Vegetationer.

Lup. vulg. i $1^{1}/_{2}$ Aar af h. Kind; tidligere ingen Behandling.

$^{29}/_{5}$ 99. Sundt Udseende. Paa h. Kind en rundagtig Plet, c. 2 Ctm., i Midten Arvæv, i Randen talrige Knuder. — Lille Tilfælde.

Spredt Lysbehandl. til $^{4}/_{10}$ 99 (22 Séancer).

$^{12}/_{2}$ 00. Et Par Smaapletter.

Spredt Lysbehandl. til $^{1}/_{10}$ 00 (21 Séancer).

Siden Oktober 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{1}/_{10}$ 02: Lidet synligt Ar.

Sygehistorie Nr. 74.

Nr. 354, Mand, 30 Aar, Sjælland (Land).

Moderen død af Tub. pulm.; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 20 Aar, udgaaet fra Næsehulen, begyndt paa Næsen; langsom Vækst; senere Affektion af begge Kinder og v. Øre. Behandlet for 10 Aar siden paa Sygehus med Skarifikation og Pyrogallussalve, med forbigaaende Virkning; senere Tuberkulin uden Virkning, i de sidste Aar Thermokaut med delvis Udheling.
$^{27}/_{6}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er bløde Næse med Svulst og talrige Knuder; paa v. Kind en enkelt, paa h. Kind en Del spredte Knuder, paa v. Øres Rand nogle Knuder og ringe Defekt. Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen Ar efter spontant udhelet Lidelse.
Lysbehandl. $^{27}/_{6}$–$^{23}/_{9}$ 99 (73 Séancer).
Siden September 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{18}/_{5}$ 02.

Sygehistorie Nr. 75. (Se Tavle XXVII).
Nr. 361, Kvinde, 27 Aar. Jylland (Land).
I nærmeste Familie Tub.; selv tidligere skrofuløs: Halskirtelsvulst, Øjenlidelse.
Lup. vulg. i 14 Aar, begyndt paa Overlæben, vokset jævnt trods energisk Behandling, væsentlig med Udskrabning og Thermokaut; gentagne Hospitalsophold.
$^{3}/_{7}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er i Sammenhæng hele Næsen, Overlæben og store Partier af begge Kinder: Betydelig Infiltration delvis aragtig, med talrige Skorper og Saar, Defekt af bløde Næse. Stort Tilfælde. — Næseborerne forsnævrede. Slimhinden i Næsehule, Overlæbe, Tandkød og Gane angrebet. Taarevejslidelse.
Lysbehandl. $^{3}/_{7}$–$^{26}/_{1}$ 00 (156 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.
$^{5}/_{3}$ 00: Overalt godt Arvæv, kun faa dybe Knuder. Slimhinderne delvis udhelede.
Spredt Lysbehandl. til $^{9}/_{5}$ 00 (32 Séancer).
Siden Maj 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{29}/_{9}$ 02: Smukt Arvæv, Næsedefekten som før Behandlingen.
Slimhindelidelserne udhelede.

Sygehistorie Nr. 76.
Nr. 363, Kvinde, 32 Aar, gift, Jylland (Land).
Faderen og flere Søskende død af Tub.; selv skrofuløs som Barn; jævnlig Brystsymptoner.
Lup. vulg. i 14 Aar af Næsen, er ved energisk Behandling med Udskrabning og Ætsmidler holdt godt nede.
$^{5}/_{7}$ 99. Ret sundt Udseende; Infiltration af begge Lungespidser. Angrebet er bløde Næse med Svulst, Knuder og Smaasaar, ringe

Defekt. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen udhelet Affektion med stor Perforation i Septum cart.

Lysbehandl. $^{5}/_{7}$–$^{11}/_{9}$ 99 (40 Séancer).

Siden September 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{31}/_{8}$ 01: Lidet synligt Arvæv. Brev $^{29}/_{4}$ 02.
Slimhindelidelsen stadig udhelet.

Sygehistorie Nr. 77.

Nr. 368, Kvinde, 16 Aar, Sjælland (Land).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 4 Aar af h. Kind; i den sidste Tid i Vækst; ikke tidligere behandlet.
$^{11}/_{7}$ 99. Sundt Udseende. Paa h. Kind en rund Lupusplet, c. 1 Ctm., med skællende, sammenflydende Knuder. — Lille Tilfælde. —

Spredt Lysbehandl. til $^{5}/_{9}$ 99 (23 Séancer).

Siden September 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{9}/_{8}$ 02: Arret næppe synligt.

Sygehistorie Nr. 78.

Nr. 370, Kvinde, 31 Aar. Schweitz (By).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 19 Aar, begyndt paa h. Kind, holdt sig i 10 Aar som et lille Saar, der trods Behandling stadig brød op, bredte sig derefter til Næsen og for 4 Aar siden til Kinderne, trods stadig og energisk Behandling med Galvanokaut og Ætsmidler.
$^{13}/_{7}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er i Sammenhæng bløde Næse og nærmeste Del af Kinderne, symmetrisk c. 4 × 3 Ctm.: Overalt Arvæv med talrige Knuder, nogen Defekt af Næsevingerne; paa Overlæben en enkelt ærtstor Knude. — Middelstort Tilfælde. — Næseborerne forsnævrede. I Næsehulen Ar efter udhelet Lidelse.

Lysbehandl. $^{13}/_{7}$–$^{11}/_{11}$ 99 (116 Séancer).

$^{15}/_{3}$ 00: Smukt Arvæv, kun paa v. Næsevinge en enkelt lille Knude.

Lysbehandl. i Paris (faa Séancer).

Siden Foraar 00 ikke Sygdomstegn. Sidste Meddelelse April 01.

Sygehistorie Nr. 79.

Nr. 371, Mand, 39 Aar, Norge (By).
Moderen død af Tub. pulm.; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 20 Aar af Næsen, udgaaet fra Næsehulen. Tidligere Hospitalsophold i $1\,^{1}/_{2}$ Aar: kirurgisk Behandling med ringe Virkning; derefter behandlet med Ætsmidler. Delvis Udheling med stort Substanstab.
$^{15}/_{7}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er Næsen med stor Defekt,

kun faa Knuder og Smaasaar; paa Kinderne Ar efter udhelet Lidelse. — Lille Tilfælde. — Fælles uregelmæssig Næseaabning; i Næsehulen udbredt Slimhindelidelse med total Defekt af Septum cart. Tandkødet i Overmunden ulcereret.

Lysbehandl. $^{15}/_{7}$-$^{2}/_{11}$ 99 (76 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

$^{7}/_{7}$ 00: I Arvævet et Par skællende Smaaknuder. Næsehulen bedret, Tandkødet udhelet.

Spredt Lysbehand. til $^{6}/_{9}$ 00 (26 Séancer).

Til Slimhinderne: som tidligere.

Siden September 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{19}/_{12}$ 01: Udvendig intet mistænkeligt. Brev $^{6}/_{10}$ 02.
Slimhindelidelsen ikke fuldt udhelet.

Sygehistorie Nr. 80.

Nr. 374, Kvinde, 16 Aar, København.
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 3 Aar af v. Kind, i den sidste Tid stærkere Vækst; behandlet med Pyrogallussalve med ringe Virkning.
$^{19}/_{7}$ 99. Sundt Udseende. Paa v. Kind en rundagtig Plet, c. 2 Ctm., flad, med skællende, sammenflydende Knuder. — Lille Tilfælde. —

Lysbehandl. $^{19}/_{7}$-$^{14}/_{9}$ 99 (25 Séancer).

Siden September 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{13}/_{8}$ 02: Arret næppe synligt.

Sygehistorie Nr. 81.

Nr. 383, Kvinde, 19 Aar, København.
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 6 Aar af v. Arm, langsom Vækst; tidligere behandlet med Ætssalver, i sidste Aar stadig med Galvanokaut; delvis Udheling.
$^{31}/_{7}$ 99: Sundt Udseende. I v. Albuhule en Lupusplet, 3 × 4 Ctm., delvis aragtig med talrige flade Knuder, navnlig langs Randen. — Middelstort Tilfælde. —

Lysbehandl. $^{31}/_{7}$-$^{30}/_{9}$ 99 (54 Séancer).

Siden September 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{3}/_{7}$ 02: Glat, blødt Arvæv.

Sygehistorie Nr 82.

Nr. 388, Kvinde, 36 Aar, København.
Ikke Tub. i Familien; selv som Barn skrofuløs: Halskirtelsvulst, Øjenlidelse.
Lup. vulg. i 24 Aar, udgaaet fra Næsehulen; i de første Aar ret stærk Vækst over Næsen, Overlæben og Kinderne. For 16 Aar siden

energisk Behandling med gentagne Udskrabninger, med delvis Udheling; senere stadig Lapisudboring.
$^{14}/_{8}$ 99. Ret sundt Udseende. Angrebet er Næsen med ret stor Defekt, Arvæv og spredte Knuder; paa Kinderne og Overlæben en Del hvidlige Ar, hvori enkelte Smaaknuder. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen udbredt Ulceration med stor Perforation i Sept. cart.

Lysbehandl. $^{14}/_{8}$-$^{14}/_{10}$ 99 (52 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

Siden Oktober 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{16}/_{4}$ 02: Glat, blegt Arvæv. Defekten som før Behandlingen.
Slimhindelidelsen næsten udhelet.

Sygehistorie Nr. 83.

Nr. 389, Mand, 10 Aar, Jylland (By).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere ossøs Lidelse af v. Albu.
Lup. vulg. i $3^{1}/_{2}$ *Aar* af h. Kind; langsom Vækst; ingen Behandling.
$^{16}/_{8}$ 99. Sundt Udseende. Paa h. Kind en uregelmæssig Plet, 3 × 2 Ctm., med talrige, flade Knuder og et lille Saar. — Lille Tilfælde. —

Spredt Lysbehandl. til $^{7}/_{12}$ 99 (21 Séancer).

Siden December 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{19}/_{8}$ 02.

Sygehistorie Nr. 84.

Nr. 394, Mand, 61 Aar, København.
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 1 Aar af h. Haand (inficeret ved Slagtning); ret hurtig Vækst; behandlet med Borvand og Salver uden Virkning.
$^{21}/_{8}$ 99. Sundt Udseende. Paa h. Haandryg en godt tokronestor Affektion, overfladisk, infiltreret, med Smaasaar, diffus Pigment og enkelte typiske Knuder. — Middelstort Tilfælde. —

Lysbehandl. $^{21}/_{8}$-$^{21}/_{10}$ 99 (52 Séancer).

Siden Oktober 99 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{8}/_{11}$ 02: Næppe synligt Ar.

Sygehistorie Nr. 85.

Nr. 406, Kvinde, 16 Aar, Jylland (Land).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask, i de sidste 2 Aar Halskirtelsvulst og en Del spredte, subkutane Skrofulider, der er helede ved Udskrabning.
Lup. vulg. i $^{3}/_{4}$ *Aar* af Næsen, begyndt som et lille Saar; efter Thermokaut forbigaaende Heling.
$^{13}/_{9}$ 99. Sundt Udseende, nødstore Halskirtler, Ar efter Skrofulider.

Næsens Spids og v. Vinge rød, svullen, med nogle smaa Knuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulens v. Side spredte Knuder.
Lysbehandl. $^{13}/_{9}$–$^{10}/_{10}$ 99 (23 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp.
Siden Oktober 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{14}/_{4}$ 02.
Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 86.
Nr. 407, Kvinde, 38 Aar, gift, Bogø.
Tub. i Moderens Familie; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 7 Aar af Næsen; langsom Vækst; kun ringe Behandling. $^{15}/_{9}$ 99. Sundt Udseende. Hele bløde Næse svullen, med ret store, skorpede Saar og spredte Knuder; nogen Defekt af Næseborsrandene. Lille Tilfælde. — I Næsehulen er Slimhinden aragtig efter spontant udhelet Lidelse, nogen Skorpedannelse.
Lysbehandl. $^{15}/_{9}$–$^{4}/_{12}$ 99 (57 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp.
Siden December 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{1}/_{10}$ 02.

Sygehistorie Nr. 87.
Nr. 411, Kvinde 16 Aar, Jylland (Land).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i $^{3}/_{4}$ Aar af Næsen; behandlet med indifferent Salve. $^{22}/_{9}$ 99. Af Udseende mager og bleg. Næsens Underside rød, svullen, med et Saar paa 1 Ctm.; paa Overlæben et Par Smaaknuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen spredte Knuder. Bløde Gane, Uvula og forreste Ganebuer svulne, med smaa grynede Saar.
Spredt Lysbeh. $^{22}/_{9}$–$^{15}/_{12}$ 99 (54 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.
$^{9}/_{8}$ 00: Paa h. Næsevinge en lille Knude. Næsehulen fri; Gane og Svælg delvis udhelede.
Lysbehandl. $^{9}/_{8}$–$^{31}/_{8}$ 00 (10 Séancer).
Til Slimhinderne: Jod-Jodk., Galvanokaut.
Siden August 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{29}/_{10}$ 02: Lidet synligt Arvæv.
Slimhindelidelsen stadig i Behandling. $^{8}/_{5}$ 01: Frisk Lupus af Larynx, der senere spontant er næsten udhelet.

Sygehistorie Nr. 88.
Nr. 412, Mand, 18 Aar, Jylland (By).
Moderen død af Tub. pulm.; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 4 Aar, begyndte samtidig paa begge Kinder, holdt sig længe begrænset, i sidste 2 Aar Vækst over Kinderne, Næsen og v. øvre Øjelaag; behandlet i sidste Aar med Skarifikationer, hvorved Væksten er standset.

$^{26}/_{9}$ 99. Sundt Udseende. Spredt Affektion af bløde Næse og begge Kinders Midtparti: Ringe Infiltration, talrige skællende Knuder fra miliære til toørestore. Paa v. øvre Øjelaag en ærtstor Knude. — Middelstort Tilfælde. —

Lysbehandl. $^{26}/_{9}$ 99-$^{20}/_{1}$ 00 (92 Séancer).

Paa Kinderne: Pyrogallussalve.

$^{26}/_{5}$ 00. Glat Arvæv; enkelte diffust pigmenterede Partier.

Lysbehandl $^{26}/_{5}$-$^{23}/_{7}$ 00 (50 Séancer).

Siden Juli 00 ikke Sygdomstegn. Pt. er rejst til Amerika. Sidst Brev $^{27}/_{7}$ 02.

Sygehistorie Nr. 89.

Nr. 413, Kvinde, 53 Aar, gift, Jylland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv som Barn skrofuløs: Suppurerende Halskirtelsvulster.

Lup. vulg. i 6 Aar af Næsen, udgaaet fra Næsehulen; langsom Vækst; en enkelt Gang behandlet med Thermokaut, med ringe Virkning.

$^{27}/_{9}$ 99. Sundt Udseende. Bløde Næse svullen, svampet, med sammenflydende, delvis ulcererede Knuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen spredt Affektion.

Lysbehandl. $^{27}/_{9}$ 99-$^{8}/_{3}$ 00 (128 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk.

Siden Marts 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{30}/_{8}$ 01: Lidet synligt Arvæv. (Ved h. Kæbevinkel en næppe tilhelet, dybere Skrofulide; Lysbehandling, 2 Séancer). Brev $^{4}/_{5}$ 02. Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 90.

Nr. 414, Kvinde, 10 Aar, Jylland (By).

Faderen og flere Søskende tuberkuløse; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 5 Aar, begyndt paa Næsen, gentagen Behandling med Udskrabning, Lapisætsning, Hg.-Salve; forbigaaende Bedring med tiltagende Substanstab.

$^{28}/_{9}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er bløde Næse med betydelig Defekt, Rødme, Svulst og talrige Knuder. I Omfanget, paa begge Kinder og Overlæben enkelte Smaaknuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen er Lidelsen spontant udhelet med Perforation i Sept. cart.

Spredt Lysbehandl. $^{28}/_{9}$-$^{12}/_{12}$ 99 (32 Séancer).

$^{14}/_{8}$ 00. Glat, blødt Arvæv, Defekten som før Behandlingen. Paa Overlæben en frisk, ærtstor Knude.

Lysbehandl. til $^{28}/_{8}$ 00 (11 Séancer).

Siden August 00 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{3}/_{7}$ 02.

Slimhinden stadig fri.

Sygehistorie Nr. 91.

Nr. 435, Mand, 60 Aar. Jylland (By).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere tuberkuløse Ostiter af Underextremiteterne.

Lup. vulg. i 35 Aar, udgaaet fra Næsehulen; langsom Vækst over Næse, Overlæbe og Kinder; jævnlig behandlet med Udskrabning, Lapisætsning o. a., med delvis Udheling.

$^{6}/_{11}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er i Sammenhæng Næsen, Overlæben og begge Kinder i stor Udstrækning. Lidelsen aragtig, med betydelig Defekt af bløde Næse; kun spredte, skællende, overfladiske Knuder. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen Ar efter spontant udhelet Lidelse.

Lysbehandl. $^{6}/_{11}$–$^{29}/_{12}$ 99 (29 Séancer).

Siden December 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{9}/_{12}$ 01.

Sygehistorie Nr. 92.

Nr. 436, Mand, 23 Aar, Fyn (Land).

Faderen død af Tub. pulm.; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 4 Aar af Næsen; langsom Vækst; stadig behandlet med Lapisætsning med delvis Udheling.

$^{7}/_{11}$ 99. Sundt Udseende. Paa Næsespidsen Arvæv, hvori en Del Smaaknuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen spredte Knuder.

Spredt Lysbeh. $^{7}/_{11}$ 99–$^{5}/_{5}$ 00 (56 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

$^{5}/_{5}$ 00. Febris rheumatica. $^{7}/_{6}$ 00. Hæmoptysis. $^{1}/_{10}$ 00. Glat Arvæv; paa h. Næsevinge en tvivlsom Pigmentplet; Næsehulen fri; Almentilstanden god.

Lysbehandl. $^{1}/_{10}$ 00 (2 Séancer).

Siden Oktober 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{28}/_{12}$ 02: Lidet synligt Arvæv.

Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 93.

Nr. 437, Mand, 18 Aar, Jylland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 5 Aar af v. Øre; jævn Vækst, trods stadig Behandling med Ætssalver.

$^{7}/_{11}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er v. Øre in toto med talrige, delvis skorpede Knuder; ret stor Defekt af Helixranden. — Middelstort Tilfælde. —

Lysbehandl. $^{7}/_{11}$–$^{7}/_{12}$ 99 (26 Séancer).

$^{10}/_{3}$ 00. Godt Arvæv; kun paa Lobulus tydelige Knuder.

Lysbehandl. $^{10}/_{3}$–$^{28}/_{5}$ 00 (55 Séancer).

Siden Maj 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{28}/_{12}$ 01: Glat Arvæv. Defekten som før Behandlingen. Brev $^{11}/_{7}$ 02.

Sygehistorie Nr. 94.

Nr. 439, Kvinde, 16 Aar, Jylland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere skrofuløs: Subkutane og ossøse Affektioner.

Lup. vulg. i $2^{1}/_{2}$ *Aar* i Panden; langsom Vækst; ringe Behandling.

$^{9}/_{11}$ 99. Sundt Udseende; spredte Ar efter ovennævnte Lidelser. Midt i Panden en rundagtig Lupusplet, c. 2 Ctm., med sammenflydende, skællende, prominerende Knuder. — Lille Tilfælde.

Spredt Lysbeh. $^{9}/_{11}$ 99–$^{7}/_{3}$ 00 (28 Séancer).

Pyrogallussalve (en Gang i 4 Dage).

Siden Marts 00 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{15}/_{7}$ 02.

Sygehistorie Nr. 95 (Tavle XXXII).

Nr. 443, Mand, 21 Aar, Jylland (Land).

En Kusine lider af Lup. vulg. (Pt. Nr. 210); selv tidligere Spondylitis dorsalis.

Lup. vulg. i 9 Aar, begyndt paa Næsen; ret hurtig Vækst ud over Overlæben og Kinderne. En Gang Udskrabning med forbigaaende Bedring, senere behandlet med Jodoform, hvorunder Udbredningen synes standset.

$^{21}/_{11}$ 99. Ret sundt Udseende; Kyfosis dorsalis. Angrebet er i Sammenhæng næsten hele Næsen og Overlæben, store Partier af Kinderne (7 × 7 Ctm. paa hver): Sammenflydende, prominerende, skællende Knuder, spredt Arvæv, Defekt af begge Næsevinger. I h. Tinding en rundagtig Lupusplet paa 2 Ctm. — Stort Tilfælde. — I Næsehulen er Lidelsen spontant udhelet med Perforation i Septum cart.

Lysbehandl. $^{21}/_{11}$ 99–$^{21}/_{7}$ 00 (204 Séancer).

Siden Juli 00 ikke Sygdomstegn. Set $^{30}/_{8}$ 01: Glat, lidet synligt Arvæv, Næsedefekten som før Behandlingen. Sidst Brev $^{15}/_{7}$ 02. Slimhinderne stadig fri.

Sygehistorie Nr. 96. (Tavle XXXIII).

Nr. 445, Kvinde, 17 Aar, Jylland (By).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 2 Aar af h. Kind; begyndt i Arret efter en subkutan Skrofulide; behandlet med Lapisætsning med forbigaaende Virkning. $^{22}/_{11}$ 99. Sundt Udseende; paa h. Kind tæt ved Øjet 2 uregelmæssige Ar, hvori 5—6 smaa Knuder. — Lille Tilfælde. —

Spredt Lysbeh. $^{22}/_{11}$ 99-$^{16}/_{3}$ 00 (33 Sé).

Siden Marts 00 ikke Sygdomstegn. Set $^{30}/_{8}$ 01. Glat, næppe synligt Ar. Sidst Brev $^{13}/_{7}$ 02.

Sygehistorie Nr. 97.

Nr. 447, Kvinde, 40 Aar, Fyen (Land).

Faderen og flere Slægtninge døde af Tub. pulm.; selv tidligere rask. *Lup. vulg. i 20 Aar* af Næsen, udgaaet fra Næsehulen; stadig behandlet med Thermokaut; forbigaaende Udheling med tiltagende Substanstab.

$^{25}/_{11}$ 99. Sundt Udseende; angrebet er bløde Næse med betydelig Defekt, næsten fuldstændig Tillukning af Næseborerne, Arvæv med faa skællende Knuder. — Lille Tilfælde. — Næsehulen kan ikke overses; Perforation i Sept. cart.

Spredt Lysbehandl. $^{25}/_{11}$ 99-$^{21}/_{4}$ 00 (65 Sé).

Siden April 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{9}/_{8}$ 02. Glat Arvæv, (der er gjort plastisk Operation med ringe Resultat). Slimhindelidelsen synes udhelet.

Sygehistorie Nr. 98. (Tavle XXXIV).

Nr. 449, Kvinde, 22 Aar, Jylland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 6 Aar; begyndt paa v. Næsevinge, omtrent samtidig paa h. Arm, senere Smaapletter i Panden og paa h. Kind; langsom Vækst; behandlet med Udskrabning og Lapisætsning med ringe Virkning. $^{27}/_{11}$ 99. Sundt Udseende. Spredt Affektion; paa Næsens Spids og v. Vinge en Plet paa 2 × 3 Ctm., med sammenflydende Knuder; desuden paa Næseroden, Panden og h. Kind ialt 7 indtil ærtstore, flade, knudede Pletter; paa h. Overarm en lignende Plet, 1 × $1^{1}/_{2}$ Ctm. — Middelstort Tilfælde. —

Lysbehandl. $^{27}/_{11}$ 99-$^{10}/_{3}$ 00 (77 Séancer).

Siden Marts 00 ikke Sygdomstegn. Set $^{30}/_{8}$ 01. Glatte, næppe synlige Ar. Sidst Brev $^{16}/_{6}$ 02.

Sygehistorie Nr. 99.

Nr. 453, Mand, 10 Aar, Jylland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv rask.

Lup. vulg. i 2 Aar af v. Kind; langsom Vækst; kun ringe Behandling.

$^{28}/_{11}$ 99. Sundt Udseende. Midt paa v. Kind et rundagtigt Ar, godt 1 Ctm., delvis aragtigt, med en Del flade Smaaknuder. — Lille Tilfælde. —

Lysbehandl. $^{28}/_{11}$–$^{15}/_{12}$ 99 (9 Séancer).

Siden December 99 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{20}/_{7}$ 02.

Sygehistorie Nr. 100.

Nr. 454, Mand, 18 Aar, Glænø.

Ikke Tub. i Familien; selv altid rask.

Lup. vulg. i 12 Aar af Halsen; langsom Vækst; et Par Gange behandlet med Ætssalve med delvis Udheling.

$^{1}/_{12}$ 99. Sundt Udseende. Paa Halsens Forside en overfladisk Affektion, 6 × 3 Ctm., delvis aragtig med talrige flade, skællende Knuder. — Middelstort Tilfælde. —

Spredt Lysbehandl. $^{1}/_{12}$ 99–$^{15}/_{2}$ 00 (38 Sé).

Siden Februar 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{25}/_{5}$ 01. Glat, lidet synligt Ar. Brev $^{28}/_{4}$ 02.

Sygehistorie Nr. 101.

Nr. 459, Kvinde, 28 Aar, gift, Jylland (Land).

Flere Søskende døde af Tub.; i 16 Aars Alderen en Del suppurerende Halskirtler, iøvrig tidligere rask.

Lup. vulg. i 7 Aar af Næsen, udgaaet fra Næsehulen. Efter Udskrabning længere Tilheling; i den senere Tid atter Vækst, trods gentagen Behandling.

$^{8}/_{12}$ 99. Sundt Udseende. Paa Halsen talrige Ar. Næsens bløde Del er svullen, rød, med tydelige Knuder og et ret stort Saar. Nogen Defekt, navnlig af v. Næsevinge. — Lille Tilfælde. — Næseborerne noget forsnævrede, paa Slimhinden faa spredte Knuder.

Lysbehandl. $^{8}/_{12}$ 99–$^{19}/_{3}$ 00 (55 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp.

$^{28}/_{7}$ 00. Godt Arvæv, kun paa v. Næsevinge nogen Afskalning og enkelte dybe Knuder. Næsehulen synes fri.

Lysbehandl. $^{28}/_{7}$–$^{8}/_{8}$ 00 (8 Séancer).

Siden August 00 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{17}/_{7}$ 02.

Sygehistorie Nr. 102.

Nr. 461, Kvinde, 29 Aar, gift, København.

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 2 Aar af Næsen, udgaaet fra Næsehulen; behandlet med gentagen Udskrabning og Thermokaut, med forbigaaende Bedring.

$^{11}/_{12}$ 99. Sundt Udseende. Bløde Næse svullen med spredte Knuder og et ærtstort Saar; nogen Defekt af h. Næsevinge. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen ret udbredt Affektion med Perforation i Sept. cart.

Spredt Lysbehandl. $^{11}/_{12}$ 99–$^{27}/_{4}$ 00 (61 Sé).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.
Siden April 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{11}/_{6}$ 02. Glat blødt Arvæv; Defekten som før Behandlingen.
Slimhindelidelsen ikke fuldt udhelet.

Sygehistorie Nr. 103.
Nr. 475, Kvinde, 24 Aar, Møen (Land).
I nærmeste Familie Tub,; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 8 Aar, udgaaet fra Næsehulen, behandlet energisk med Thermokaut, Udskrabning, Excision og Transplantation; delvis Udheling; stadig ny Udbrud. Overlæben først nylig angrebet.
$^{1}/_{2}$ 00. Sundt Udseende. Bløde Næses v. Del solidt aragtig, med stærk Forsnævring af Næseboret; ved h. Næseborsrand et ret stort Saar, der fra Skillevæggen gaar ned paa Overlæben — Lille Tilfælde. — Saaret fortsætter sig langt ind i Næsehulen; lille Perforation i Sept. cart.

Lysbehandl. $^{1}/_{2}$–$^{3}/_{4}$ 00 (39 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk.
Siden April 00 ikke Sygdomstegn. Pt. er rejst til Amerika. Sidst Brev $^{18}/_{10}$ 02.
Slimhindelidelsen synes udhelet.

Sygehistorie Nr. 104. (Tavle XXXVII).
Nr. 485, Mand, 6 Aar, København.
Ikke Tub. i Familien; selv temmelig rask.
Lup. vulg. i 1$^{1}/_{2}$ Aar af v. Kind, langsom Vækst, kun ringe Behandling.
$^{15}/_{2}$ 00. Sundt Udseende, en Del nødstore Halskirtler. Midt paa v. Kind en rundagtig Lupusplet, knap 2 Cntm., dannet af skællende, prominerende Knuder. — Lille Tilfælde. —

Spredt Lysbehandl. $^{15}/_{2}$–$^{17}/_{4}$ 00 (11 Sé).
Siden April 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{8}/_{4}$ 02. Næppe synligt Ar.

Sygehistorie Nr 105.
Nr. 495, Kvinde, 26 Aar, gift, Rusland (By).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 6 Aar af Næsen, 2 Gange udhelet ved langvarig

Behandling med Thermokaut; Recidiv efter 1 og 2 Aar. I sidste $^{3}/_{4}$ Aar samme Behandling, uden Virkning.
$^{10}/_{3}$ 00. Sundt Udseende. Bløde Næse svullen, med talrige Knuder, Ulceration af hele v. Vinge med nogen Defekt. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen faa spredte Knuder.
Spredt Lysbehandl. $^{10}/_{3}$–$^{20}/_{7}$ 00 (63 Sé).
Til Slimhinderne: Jod-Jodk.
Siden Juli 00 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{27}/_{7}$ 02.
Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 106.
Nr. 508, Kvinde, 21 Aar, Fyen (Land).
Moderen død af Tub. pulm.; selv skrofuløs: Halskirtelsvulst og Ørelidelse.
Lup. vulg. i 2 Aar af Næsen, udgaaet fra Næsehulen; aldrig behandlet.
$^{6}/_{4}$ 00. Sundt Udseende. Bløde Næse svullen, rød, med talrige Knuder, flest paa Næsevingerne. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen spredt Affektion med lille Perforation i Sept. cart.
Spredt Lysbehandl. $^{6}/_{4}$–$^{8}/_{9}$ 00 (60 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.
Siden September 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{10}/_{12}$ 00. Glat blødt Arvæv. Brev $^{14}/_{8}$ 02.
Slimhindelidelsen ikke fuldstændig udhelet.

Sygehistorie Nr. 107.
Nr. 509, Kvinde, 10 Aar, København.
Moderen død af Tub. pulm.; selv rask.
Lup. vulg. i c. 10 Aar; behandlet snart efter Udbruddet med Udskrabning; har siden holdt sig omtrent uforandret uden Behandling.
$^{7}/_{4}$ 00. Sundt Udseende. Midt paa v. Kind en uregelmæssig Plet, aragtig, med 5 Smaaknuder. — Lille Tilfælde. —
Spredt Lysbehandl. $^{7}/_{4}$–$^{8}/_{5}$ 00 (12 Séancer).
Siden Maj 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{1}/_{11}$ 02. Glat, let rødligt Arvæv.

Sygehistorie Nr. 108.
Nr. 511, Kvinde, 18 Aar, Sverrig (Land).
Lup. vulg. i $2^{1}/_{2}$ *Aar* af Næsen; ret stærk Vækst; v. Kind nylig angrebet. Gentagen Behandling med Thermokaut og ren Mælkesyre; kun ringe Virkning.
$^{9}/_{4}$ 00. Sundt Udseende. Hele bløde Næse stærkt svullen, rød

med sammenflydende, skællende Knuder; ud paa v. Kind en ærtstor Knude. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen faa spredte Knuder.
Lysbehandl. $^{9}/_{4}$–$^{20}/_{7}$ 00 (65 Séancer).
Til Slimhinderne: Jod-Jodk.
Siden Juli 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set ^{30} s 01. Smukt, lidet synligt Arvæv. Brev $^{6}/_{11}$ 02.
Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 109.
Nr. 512, Kvinde, 40 Aar, gift, Jylland (Land).
Faderen død af Tub. pulm.; selv skrofuløs som Barn: Halskirtelsvulst, sulkutane Skrofulider.
Lup. vulg. i 10 Aar af Næsen; langsom Vækst; gentagen Udskrabning og Thermokaut. med forbigaaende Virkning.
$^{9}/_{4}$ 00. Sundt Udseende; spredte, solide Ar efter de omtalte Affektioner. Bløde Næse svullen, rød med sammenflydende, delvis ulcererede Knuder; ringe Defekt. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen ret udbredt Affektion med lille Perforation i Sept cart.
Spredt Lysbehandl $^{9}/_{4}$–$^{19}/_{9}$ 00 (76 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk.
Siden September 00 ikke Sygdomtegn. Sidst set ^{28} 7 02. Lidet synligt Arvæv, Defekten næppe at se.
Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 110.
Nr. 524, Kvinde, 24 Aar, Tyskland (By).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i $2^{1}/_{2}$ *Aar* af Næsen; langsom Vækst; stadig Behandling med Galvanokaut. og Røntgenstraaler, uden Virkning.
$^{1}/_{5}$ 00. Sundt Udseende. Næsespidsen og Skillevæggen let svullen, rød med c. 10 smaa, flade Knuder. — Lille Tilfælde.
Spredt Lysbeh. $^{1}/_{5}$–$^{4}/_{7}$, $^{4}/_{9}$–$^{18}/_{9}$ 00 (41 Sé).
Siden September 00 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{1}/_{12}$ 02.

Sygehistorie Nr. 111.
Nr. 536, Kvinde, 27 Aar, gift, Jylland (Land).
I Moderens Slægt Tub.; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i 20 Aar, begyndt som en lille Plet paa hver Kind, den ene helede spontant, den anden har holdt sig uforandret. For 2 Aar siden en ny Plet paa h. Kind, for $^{1}/_{2}$ Aar siden en lille Plet paa h. Arm. Hudlidelsen ikke behandlet. I c. 7 Aar Lidelse af Næsehulen, behandlet med gentagen Udskrabning og Galvanokaut.

$^{6}/_{6}$ 00. Sundt Udseende. Spredt Affektion. Paa h. Kind en Plet, 4 × 3 Ctm., paa v. Kind en rundagtig Plet, c. 2 Ctm., paa h. Arm en ærtstor Plet. Pletterne dannes af prominerende, skorpede Knuder. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen udbredt Affektion med stor Perforation i Sept. cart. Taarevejslidelse.

Spredt Lysbehandl. $^{6}/_{6}$–$^{8}/_{8}$ 00 (40 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

Siden August 00 ikke Sygdomstegn. Set ^{11} 3 01: Glatte, bløde Ar. I Næsehulen kun faa Knuder. Sidst Brev $^{22}/_{7}$ 02. Slimhindelidelsen næsten udhelet.

Sygehistorie Nr. 112.

Nr. 537, Mand, 16 Aar, Jylland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i $^{1}/_{2}$ *Aar* af Næsen, udgaaet fra Næsehulen; ikke tidligere behandlet.

$^{7}/_{6}$ 00. Sundt Udseende. Bløde Næse noget svullen, ved Næseborsrandene spredte Smaasaar og Knuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen faa Knuder.

Lysbehandl. $^{7}/_{6}$–$^{30}/_{6}$ 00 (18 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk.

Siden Juni 00 ikke Sygdomstegn. Set ^{24} 10 00: Glat, blødt Arvæv. Næsehulen fri. Sidst Brev $^{1}/_{5}$ 02.

Sygehistorie Nr. 113.

Nr. 538, Mand, 18 Aar, Sjælland (Land).

To Søskende tuberkuløse; selv som Barn skrofuløs: Halskirtelsvulst, Øjenlidelse.

Lup. vulg. i 1 Aar af Næsen; langsom Vækst; tidligere ikke Behandling.

$^{7}/_{6}$ 00. Sundt Udseende. Den bløde Næses h. Halvdel rød, svullen med spredte, skællende Knuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen spredte Knuder og Saar; paa Strubelaaget Ar efter spontant helbredet Affektion.

Lysbehandl. $^{7}/_{6}$–$^{30}/_{8}$ 00 (64 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

Siden August 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{1}/_{11}$ 02: Næppe synligt Arvæv.

Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 114.

Nr. 553, Kvinde, 4 Aar, Sjælland (Land).

Moderen lider af Tub. pulm.; selv rask.

Lup. vulg. i 5 Maaneder af Næsen, ikke tidligere Behandling.

$^{27}/_{6}$ 00. Sundt Udseende. I v. Næseborsrand et lille Substanstab; omkring dette ses Arvæv med et Par smaa flade Knuder. — Lille Tilfælde.

Lysbehandl. $^{27}/_{6}$ 00 (1 Séancer).

Siden Juni 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set ^{6} s 02: Næppe synligt Arvæv, Defekten som før Behandlingen.

Sygehistorie Nr. 115.

Nr. 554, Kvinde, 45 Aar, gift, Jylland (Land).

Faderen og en Broder døde af Tub. pulm.; selv altid skrantende. *Lup. vulg. i 21 Aar*, begyndt paa h. Kind, greb snart over paa Næsen; ringe Vækst; gentagen Behandling med Udskrabning, med delvis Udheling.

$^{27}/_{6}$ 00. Af Udseende mager og anæmisk. Paa Næsen og h. Kind spredte hvide Ar, kun paa Næsen et lille Saar og enkelte Smaaknuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen spredt Affektion med stor Perforation i Sept. cart. Taarevejslidelse.

Spredt Lysbehandl. $^{27}/_{6}$–$^{8}/_{9}$ 00 (45 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

Siden September 00 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{17}/_{10}$ 02.

Slimhindelidelsen synes udhelet.

Sygehistorie Nr. 116.

Nr. 556, Kvinde, 11 Aar, Sønderjylland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 3 Aar af v. Kind; langsom Vækst; tidligere ikke behandlet.

$^{3}/_{7}$ 00. Ret sundt Udseende. Midt paa v. Kind en rundagtig Plet, c. $1^{1}/_{2}$ Ctm., med sammenflydende, skællende Knuder. — Lille Tilfælde.

Spredt Lysbeh. $^{3}/_{7}$–$^{1}/_{10}$ 00 (20 Séancer).

Siden Oktober 00 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{19}/_{10}$ 02.

Sygehistorie Nr. 117.

Nr. 558, Kvinde, 41 Aar, gift, Jylland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv altid rask.

Lup. vulg. i 1 Aar af Næsen, udgaaet fra Næsehulen; tidligere en enkelt Udskrabning med ringe Virkning.

$^{6}/_{7}$ 00. Ret sundt Udseende. Paa Næsespidsen og langs Næseborsrandene Ardannelse med talrige, spredte Smaaknuder; ringe Substanstab. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen Ar efter udhelet Lidelse.

Lysbehandl. $^{6}/_{7}$–$^{8}/_{9}$ 00 (48 Séancer).

Siden September 00 ikke Sygdomstegn. Set $^{26}/_{5}$ 02: Lidet synligt Arvæv, Defekten næppe synlig. Sidst Brev $^{16}/_{10}$ 02.
Slimhindelidelsen holder sig udhelet.

Sygehistorie Nr. 118.

Nr. 562, Kvinde, 23 Aar, Sverig (By).
En Broder død af Tub. pulm.; selv skrofuløs som Barn: Halskirtelsvulst, Øjenlidelse.
Lup. vulg. i 1 Aar, ugdaaet fra Næsehulen. Hudlidelsen ikke tidligere behandlet.
$^{13}/_{7}$ 00. Ret sundt Udseende. Den bløde Næse rød, svullen med talrige, delvis skorpede Knuder og et rundagtigt Saar paa c. 1 Ctm. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen spredt Affektion med stor Perforation i Sept. cart. Taarevejslidelse.
Lysbehandl. $^{13}/_{7}$–$^{18}/_{9}$ 00 (40 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.
Siden September 00 ikke Sygdomstegn. Set $^{9}/_{9}$ 01: Næppe synligt Ar. Sidst Brev $^{30}/_{9}$ 02.
Slimhindelidelsen synes udhelet.

Sygehistorie Nr. 119.

Nr. 574, Mand, 25 Aar, Jylland (Land).
En Søster lider af Lupus (Nr. 156); selv skrantende, med Tilbøjelighed til Hoste.
Lup. vulg. i 10 Aar af Næsen, langsom Vækst; behandlet med Ætssalver med forbigaaende Bedring.
$^{8}/_{8}$ 00. Noget bleg, med Halskirtelsvulst; Dæmpning og Rallelyd over Lungespidserne. Den bløde Næse stærkt rød, svullen; spredt Arvæv med en Del smaa, flade Knuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen ret udbredt, delvis aragtig Affektion af bløde Gane, Uvula, Ganebuer og Strubelaag.
Lysbehandl. $^{8}/_{8}$–$^{28}/_{9}$ 00 (46 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.
Siden September 00 ikke Sygdomstegn. Lægetilsyn i Hjemmet. Sidst Brev $^{1}/_{10}$ 02.
Slimhindelidelsen ikke fuldstændig udhelet. Almenbefindendet godt.

Sygehistorie Nr. 120.

Nr. 582, Kvinde, 11 Aar, Sjælland (Land).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i $^{1}/_{2}$ Aar af h. Næsevinge og ud paa Kinden; ret hurtig Vækst, der standsede efter en Udskrabning.
$^{1}/_{9}$ 00. Sundt Udseende. Paa h. Næsevinge Arvæv med ringe

Substanstab og 3—4 skællende Knuder; tæt herved paa h. Kind en rundagtig Plet, c. $1^1/_2$ Ctm., med sammenflydende, skællende Knuder. — Lille Tilfælde. — I h. Vestibulum Smaasaar, Næsehulen iøvrig fri.

Lysbehandl. $^1/_9$–$^{29}/_9$ 00 (12 Séancer).

Til Næsehulen: Sublimattamp, Jod-Jodk.

Siden September 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{16}/_{10}$ 02: Næppe synligt Ar.

Slimhindelidelsen udhelet.

Sygehistorie Nr. 121.

Nr. 587, Kvinde, 5 Aar, København.

I Moderens Familie Tub.; selv rask.

Lup. vulg. i 3 Aar af v. Kind, langsom Vækst; tidligere behandlet med Ætssalver med delvis Udheling.

$^{15}/_9$ 00. Sundt Udseende. Midt paa v. Kind et rundagtigt Ar, c. 2 Ctm., hvori 7—8 skællende Smaaknuder. — Lille Tilfælde.

Lysbehandl. $^{15}/_9$ og $^{24}/_9$ 00 (2 Séancer).

Siden September 00 ikke Sygdomstegn. Sidst set $^{22}/_{10}$ 02: Næppe synligt Ar.

Sygehistorie Nr. 122.

Nr. 596, Kvinde, 7 Aar, København.

I Moderens Familie Tub. pulm.; en Broder lider af Lupus (Nr. 488); selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 1 Aar paa h. Arm, langsom Vækst; ikke tidligere behandlet.

$^{27}/_9$ 00. Sundt Udseende. Paa h. Albu en rundagtig Plet, godt 1 Ctm., skællende, med et Par Smaaknuder. — Lille Tilfælde.

Lysbehandl. $^{27}/_9$ 00 (2 Séancer).

Siden September 00 ikke Sygdomstegn. Set $^{23}/_{12}$ 01: Næppe synligt Ar. Sidst Brev $^{20}/_8$ 02.

Sygehistorie Nr. 123.

Nr. 60, Kvinde, 23 Aar, Fyen (By).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 7 Aar, begyndt paa Næsen; ret hurtig Vækst ud over Kinderne, trods gentagne Udskrabninger. Noget senere Affektion af h. Haand.

$^{18}/_{10}$ 97. Mager og anæmisk. Angrebet er hele bløde Næse og store Partier af begge Kinder: Talrige prominerende, skorpede Knuder, nogen Defekt af h. Næsevinge. Paa h. øvre Øjelaag en Del Smaaknuder, selve Øjet angrebet og næsten totalt destrueret.

Paa h. Haand indtager Lidelsen Haandryggen og naar ud paa Fingrene, desuden Ar efter ossøse Affektioner. — Stort Tilfælde. — I Næsehulen spredte, slappe Knuder og Saar.

Lysbehandl. $^{18}/_{10}$ 97-$^{16}/_{1}$ 99 (364 Séancer).

Til Haanden samtidig: Pyrogallussalve.

Til Slimhinderne: Jod-Jodk.

$^{31}/_{5}$ 99. Overalt smukt Arvæv, kun paa h. Kind 3 tvivlsomme Smaaknuder. I Næsehulen endnu Saar.

Lysbehandl. $^{31}/_{5}$-$^{20}/_{6}$ 99 (19 Séancer).

$^{5}/_{7}$ 00. Paa Næsen nogle friske Knuder, udgaaede fra Næsehulen.

Lysbehandl. $^{5}/_{7}$-$^{5}/_{9}$ 00 (53 Séancer).

$^{20}/_{4}$ 01. Paa Næsen en enkelt Knude; Kinderne og Haanden stadig fri.

Lysbehandl. $^{20}/_{4}$-$^{27}/_{4}$, $^{1}/_{7}$-$^{13}/_{7}$ 01 (13 Séancer).

Siden Juli 01 ikke Sygdomstegn. Død $^{9}/_{6}$ 02 af akut Lungetuberkulose.

Sygehistorie Nr. 124. (Se Tavle V).

Nr. 97, Kvinde, 28 Aar, Jylland (Land).

En Søster lider af Lupus (Pt. Nr. 138); selv tidligere Haandrodstuberkulose.

Lup. vulg. i 17 Aar, begyndt under Hagen, derfra jævn Vækst over v. Kind, Næsen og h. Kind. For 13 Aar siden behandlet i $1^{1}/_{2}$ Aar paa Kysthospitalet, senere af og til Thermokaut., alt med forbigaaende Virkning.

$^{5}/_{2}$ 98. Sundt Udseende. Angrebet er i Sammenhæng hele bløde Næse, største Delen af begge Kinder og Hagen. Næsen svullen med sammenhængende, skorpede Knuder, iøvrigt Arvæv med talrige, spredte Knuder. — Stort Tilfælde. — I Næsehulen ret udbredt Affektion.

Lysbehandl. $^{5}/_{2}$ 98-$^{20}/_{1}$ 99 (245 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

$^{26}/_{6}$ 99. Overalt glat, blødt Arvæv, kun paa Næsen et Par Smaaknuder.

Spredt Lysbehandl. — $^{20}/_{8}$ 99 (18 Séancer).

Til Slimhinderne: Som tidligere.

Siden August 99 ikke Sygdomstegn. Død $^{17}/_{2}$ 00 efter Operation for Sinusthrombose.

Sygehistorie Nr. 125 (Se Tavle XII).

Nr. 149, Mand, 14 Aar, København.

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere suppurerende Halskirtler.

Lup. vulg. i 7 Aar, begyndt paa Halsen; jævn Vækst over begge Kinder, Næse og Overlæbe. Tidligere kun homøopathisk Behandling.

$^{20}/_{6}$ 98. Sløjt Udseende, Halskirtelsvulst. Angrebet er i Sammenhæng hele bløde Næse, Overlæben og nærmeste Partier af begge Kinder: Betydelig Svulst og skorpede Knuder; paa Halsens Forside en Affektion paa 4 × 12 Ctm., delvis aragtig med talrige Knuder. — Meget udbredt Tilfælde. — Udbredt Slimhindelidelse af Næsehule, Læber, Tandkød, Gane, Svælg og Strube.

Lysbehandl. $^{20}/_{6}$ 98–$^{8}/_{3}$ 99 (176 Séancer).

Til Halsen samtidig: Pyrogallussalve.

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

$^{6}/_{11}$ 99. Overalt smukt Arvæv, kun spredte Knuder. Slimhindelidelserne næsten udhelede.

Lysbehandl. $^{6}/_{11}$ 99–$^{6}/_{1}$ 00 (50 Séancer).

Siden Januar 00 ikke Sygdomstegn. Død $^{9}/_{5}$ 01 af kronisk Empyem.

Sygehistorie Nr. 126 (Se Tavle XIV).

Nr. 152, Kvinde, 24 Aar, Ærø (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere suppurerende Halskirtler og Spina ventosa, i de senere Aar Hoste.

Lup. vulg. i 20 Aar af begge Overextremiteter; for 5 Aar siden blev Næsen angrebet, derefter begge Kinder og v. Øre. Tidligere ingen Behandling.

$^{22}/_{6}$ 98. Mager og bleg, med Affektion af v. Lungespids. Angrebet er i Sammenhæng bløde Næse og ret store Partier af begge Kinder: Sammenhængende, overfladiske Knuder. V. Øre: Sammenhængende Knuder paa Lobulus. Paa begge Overextremiteter udbredt Ardannelse med spredte, ret talrige Knuder. — Meget udbredt Tilfælde. — I Næsehulen faa slappe Knuder.

Lysbehandl. $^{22}/_{6}$ 98–$^{21}/_{3}$ 99 (240 Séancer.)

Til Extermiteterne: Pyrogallol.

Til Slimhinderne: Sublimattamp.

$^{5}/_{9}$ 99. Overalt Ardannelse med en Del spredte Knuder, Almenbefindendet ret daarligt. Næsehulen fri.

Spredt Lysbh. $^{5}/_{9}$ 99–$^{25}/_{9}$ 00 (168 Séancer).

Siden September 00 ikke Sygdomstegn. Død $^{13}/_{3}$ 01 af Tub. pulm.

Sygehistorie Nr. 127.

Nr. 161, Kvinde, 60 Aar, Sjælland (Land).

2 Børn tuberkuløse; selv rask i Barndommen.

Lup. vulg. i 45 Aar, holdt sig længe som en lille Plet paa h. Kind, bredte sig for c. 20 Aar siden over begge Kinder og Næsen; behandlet med Udskrabninger og Ætssalver med ringe Virkning.

$^{2}/_{7}$ 98. Ret sundt Udseende, kronisk Brystaffektion. Angrebet er

bløde Næse og store Partier af Kinderne: Infiltration, Arvæv med talrige, spredte Knuder. — Stort Tilfælde. — I Næsehulen Ar efter udhelet Lidelse.

Lysbehandl. $^{2}/_{7}$–$^{30}/_{9}$ 98 (81 Séancer).

Samtidig: Pyrogallussalve.

Siden September 98 ikke Sygdomstegn. Død $^{15}/_{3}$ 99 af Tub. pulm.

Sygehistorie Nr. 128.

Nr. 173, Kvinde, 36 Aar, Jylland (Land).

2 Søskende døde af Tub. pulm.; selv Pleuritis for 10 Aar siden, har iøvrigt været rask.

Lup. vulg. i 10 Aar, begyndt paa Næsen; langsom Vækst; ingen Behandling.

$^{6}/_{8}$ 98. Noget mager og bleg; ikke Lungeaffektion. Hele bløde Næse er svullen, rød med sammenflydende, skællende Knuder. Paa Overlæben 1 og paa h. Kind 5—6 Smaaknuder. — Middelstort Tilfælde. — I Næsehulen faa, slappe Knuder.

Lysbehandl. $^{6}/_{8}$–$^{5}/_{11}$ 98 (77 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp.

$^{22}/_{7}$ 99. Paa Næsen nogle spredte Knuder.

Lysbehandl. $^{22}/_{7}$–$^{26}/_{8}$ 99 (40 Séancer).

$^{13}/_{7}$ 00. Godt Arvæv, hvori et Par Smaaknuder. Næsehulen fri.

Spredt Lysbehandl. – $^{27}/_{11}$ 00 (15 Séancer).

Siden November 00 ikke Svgdomstegn. Død $^{9}/_{12}$ 01 pludselig.

Sygehistorie Nr. 129.

Nr. 175, Mand, 44 Aar, Fyen (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv Taarevejslidelse for 5 Aar siden, i de sidste Aar Hoste.

Lup. vulg. i $3^{1}/_{2}$ *Aar*, begyndt paa Næsen; ret hurtig Vækst over Næse, Overlæbe og begge Kinder; ikke behandlet.

$^{9}/_{8}$ 98. Ret sundt Udseende; Tub. pulm. Angrebet er i Sammenhæng hele Næsen, store Partier af Overlæbe og begge Kinder: Ret overfladisk, knudet Affektion, kun paa Næsevingerne Ulceration med ringe Defekt. — Stort Tilfælde. — I Næsehulen udbredt Ulceration med Perforation i Sept. cart.

Lysbehandl. $^{9}/_{8}$ 98–$^{8}/_{2}$ 99 (157 Séancer.)

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

Siden Februar 99 ikke Sygdomstegn. Død $^{13}/_{10}$ 99 af Tub. milliaris.

Sygehistorie Nr. 130.

Nr. 245, Kvinde, 13 Aar, Jylland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv noget skrantende.

Lup. vulg. i 2 Aar, udgaaet fra Næsehulen, har bredt sig over

Næsen og lidt ud paa Overlæbe og Kinder; 2 Gange Udskrabning og Thermokaut. uden Virkning.
$^{4}/_{1}$ 99. Svageligt Udseende; Tub. pulm. og Albuminuria. Angrebet er bløde Næse og nærmeste Del, af Overlæbe og begge Kinder: Betydelig Svulst, Ulceration med delvis Defekt af begge Næsevinger, talrige Knuder. — Middelstort Tilfælde. — Næseborerne forsnævrede, i Næsehulen udbredt Ulceration med stor Perforation i Sept. cart.

Lysbehandl. $^{4}/_{1}$–$^{24}/_{4}$ 99 (94 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Nitr. argent.
Siden April 99 ikke Sygdomstegn. Død Juli 00 af Tub. pulm. og Nephritis.

Sygehistorie Nr. 131.
Nr. 285, Kvinde, 58 Aar, gift, Jylland (Land).
Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.
Lup. vulg. i $6^{1}/_{2}$ *Aar*, begyndt paa Næsen; langsom Vækst til Kinderne, Hage og Hals; tidligere Lapisætsning, Salver, 5 Gange Udskrabning og Thermokaut, alt med ringe Virkning.
$^{20}/_{3}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er i Sammenhæng bløde Næse, nærmeste Del af v. Kind, største Delen af h. Kind og videre ned paa Hage og Hals; Overalt prominerende, skællende Knuder, paa Næsen sammenflydende, delvis ulcererende. — Stort Tilfælde. — I Næsehulen ret udbredt Ulceration med Perforation i Sept. cart.

Lysbehandl. $^{20}/_{3}$–$^{19}/_{8}$ 99 (146 Séancer).
Samtidig: Pyrogallussalve.
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.
Siden August 99 ikke Sygdomstegn. Død $^{27}/_{2}$ 00 af Pneumoni.

Sygehistorie Nr. 132.
Nr. 390, Mand, 24 Aar, Sønderjylland (Land).
Moderen død af Tub. pulm.; selv i Barndommen skrofuløse Affektioner af Øre, Øjne og Halskirtler.
Lup. vulg. i 10 Aar, begyndt paa Næsen; langsom Vækst til Overlæbe og begge Kinder; behandlet med Udskrabning og Tuberkulin uden Virkning; senere homøopatisk Behandling.
$^{17}/_{8}$ 99. Sundt Udseende. Angrebet er i Sammenhæng hele Næsen, store Partier af Overlæbe og begge Kinder. Overfladisk, knudet Affektion, kun Næsen svullen med delvis Defekt af Næsevingerne. — Stort Tilfælde. — I Næsehulen Ar efter udhelet Affektion. Taa Tandkød og Gane spredte Knuder.

Lysbehandl. $^{17}/_{8}$–$^{14}/_{12}$ 99 (104 Séancer).
Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

$^{10}/_{3}$ 00. Overalt godt Arvæv, kun faa spredte Knuder. Slimhindelidelserne ikke fuldt udhelede.

Lysbehandl. $^{10}/_{3}$–$^{5}/_{6}$ 00 (73 Séancer).

Til Slimhinderne: Som tidligere.

Ved Udskrivningen ikke Sygdomstegn. Død $^{12}/_{7}$ 00 af Tyfus.

Sygehistorie Nr. 133.

Nr. 484, Kvinde, 23 Aar, gift, Sønderjylland (Land).

Ikke Tub. i Familien; selv i det hele rask.

Lup. vulg. i 17 Aar, opstaaet samtidig i Ansigtet og paa begge Arme; meget langsom Vækst; behandlet af og til med Ætssalver med forbigaaende Virkning.

$^{15}/_{2}$ 00. Sundt Udseende. Paa begge Kinder, v. Tinding og begge Arme ialt 11 spredte, rundagtige Lupuspletter fra ært- til tokronestore; i Midten Arvæv, langs Randene skællende Knuder — Middelstort Tilfælde. —

Lysbeh. $^{15}/_{2}$–$^{27}/_{2}$, $^{1}/_{5}$–$^{23}/_{6}$ 00 (66 Séancer).

Samtidig: Pyrogallussalve.

$^{4}/_{1}$ 01. Overalt godt Arvæv, kun faa spredte Knuder.

Lysbehandl. $^{4}/_{1}$–$^{16}/_{1}$ 01 (20 Séancer).

Siden Januar 01 ikke Sygdomstegn. Død $^{11}/_{5}$ 02 af Hjærnebetændelse.

Sygehistorie Nr. 134.

Nr. 563, Kvinde, 20 Aar, Falster (Land).

I Moderens Familie Tub.; selv tidligere rask, i sidste Aar Brystsymptomer.

Lup. vulg. i $1^{1}/_{4}$ *Aar*, begyndt paa Næsen; senere Affektion af begge Kinder og h. Pegefinger; behandlet med Lapisætsning uden Virkning.

$^{13}/_{7}$ 00. Svageligt Udseende; Tub. pulm. gravis. Paa Næseryggen et rundagtigt Saar, c. 1 Ctm., paa h. Kind 2, paa v. Kind 1 ærtstor Knude; paa h. Pegefinger et rundagtigt Saar c. 1 Ctm. — Lille Tilfælde. —

Lysbehandl. $^{13}/_{7}$–$^{29}/_{9}$ 00 (58 Séancer).

Siden September 00 ikke Sygdomstegn. Død $^{30}/_{3}$ 01 af Tub. pulm.

Sygehistorie Nr. 135.

Nr. 744, Kvinde, 41 Aar, Skotland (By).

Ikke Tub. i Familien; selv tidligere rask.

Lup. vulg. i 6 Aar udgaaet fra Næsehulen; udvendig kun ringe Affektion, der ikke er behandlet.

$^{9}/_{7}$ 01. Af Udseende mager og bleg. Bløde Næse svullen, rød,

kun faa skorpede Knuder. — Lille Tilfælde. — I Næsehulen er Lidelsen væsentlig udhelet med Perforation i Sept. cart.

Lysbehandl. $^{9}/_{7}$-$^{22}/_{8}$ 01 (34 Séancer).

Til Slimhinderne: Sublimattamp., Jod-Jodk., Galvanokaut.

Siden August 01 ikke Sygdomstegn. Død Marts 02 af Variola.

BILLEDER AF PATIENTER

FØR OG EFTER BEHANDLINGEN

(FOTOGRAFEREDE AF INSTITUTETS FOTOGRAF FRK. **RASMUSSEN**)

Fot. $^{8}/_{6}$ 97.

Fot. $^{12}/_{10}$ 99.

Lupus vulgaris Nr. 40

Fot. $^{2}/_{11}$ 97.



Fot. $^{15}/_{11}$ 98.

Lupus vulgaris Nr. 67



Fot. $^{16}/_{11}$ 97.

Fot. $^{13}/_{2}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 74



Fot. $^{11}/_{1}$ 98.

Fot. $^{27}/_{9}$ 99.

Lupus vulgaris Nr. 87

Fot. $^{5}/_{12}$ 98.

Fot. $^{16}/_{1}$ 00.

Lupus vulgaris Nr. 97

Fot. $^{9}/_{2}$ 98.

Fot. $^{1}/_{2}$ 00.

Lupus vulgaris Nr. 104

Fot. $^{22}/_{3}$ 98.

Fot. $^{16}/_{10}$ 99.

Lupus vulgaris Nr. 124

Fot. $^{28}/_{4}$ 98.

Fot. $^{10}/_{11}$ 99.

Lupus vulgaris Nr. 133

Fot. $^{19}/_{5}$ 98.

Fot. $^{11}/_{3}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 139

Fot. $^{1}/_{6}$ 98.

Fot. $^{15}/_{11}$ 98.

Lupus vulgaris Nr. 141

Fot. $^{31}/_{5}$ 98.

Fot. $^{25}/_{6}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 143

Fot. $^{20}/_{6}$ 98.



Fot. $^{15}/_{11}$ 98.

Lupus vulgaris Nr. 149



Fot. $^{21}/_{5}$ 98.

Fot. $^{2}/_{9}$ 99.

Lupus vulgaris Nr. 150

Fot. $^{22}/_{6}$ 98.

Fot. $^{15}/_{11}$ 98.

Lupus vulgaris Nr. 152

Fot. $^{29}/_{10}$ 98.

Fot. $^{3}/_{6}$ 02.

Lupus vulgaris Nr. 212

Fot. $^{29}/_{10}$ 98

Fot. $^{3}/_{6}$ 02



Lupus vulgaris Nr. 212

Fot. $^{14}/_{11}$ 98.

Fot. $^{23}/_{4}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 225

Fot. $^{15}/_{12}$ 98.



Fot. $^{5}/_{2}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 239

Fot. $^{2}/_{1}$ 99.

Fot. $^{16}/_{2}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 244

Fot. $^{9}/_{1}$ 99.

Fot. $^{17}/_{4}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 250

Fot. $^{10}/_{1}$ 99.



Fot. $^{28}/_{2}$ 00.

Lupus vulgaris Nr. 252

Fot. $^{2}/_{2}$ 99.

Fot. $^{20}/_{1}$ 00.

Lupus vulgaris Nr. 266



Fot. $^{20}/_{2}$ 99.

Fot. $^{30}/_{8}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 276

Fot. $^{6}/_{4}$ 99.

Fot. $^{21}/_{1}$ 00.

Lupus vulgaris Nr. 290

Fot. $^{20}/_{5}$ 99.

Fot. $^{7}/_{2}$ 00.

Lupus vulgaris Nr. 331

Fot. $^{17}/_{6}$ 99.



Fot. $^{18}/_{5}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 349.

Fot. $^{30}/_{6}$ 99.

Fot. $^{5}/_{3}$ 00.

Lupus vulgaris Nr. 361

Fot. $^{31}/_{8}$ 99.

Fot. $^{6}/_{1}$ 02.

Lupus vulgaris Nr. 396

Fot. $^{12}/_{9}$ 99.



Fot. $^{28}/_{4}$ 00.

Lupus vulgaris Nr. 403

Fot. $^{7}/_{11}$ 99.

Fot. $^{20}/_{4}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 438



Fot. $^{16}/_{11}$ 99.



Fot. $^{24}/_{2}$ 02.

Lupus vulgaris Nr. 442

Fot. $^{21}/_{11}$ 99.



Fot. $^{30}/_{8}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 443

Fot. $^{22}/_{11}$ 99.

Fot. $^{30}/_{8}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 445



Fot. $^{27}/_{11}$ 99.

Fot. $^{30}/_{8}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 449

Fot. $^{2}/_{4}$ 01

Fot. $^{23}/_{1}$ 00

Lupus vulgaris Nr. 471



Fot $^{20}/_{1}$ 00.

Fot. $^{17}/_{1}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 474

Fot. $^{15}/_{2}$ 00.

Fot. $^{27}/_{4}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 485

Fot. $^{26}/_{4}$ 00.

Fot. $^{30}/_{5}$ 02.

Lupus vulgaris Nr. 521

Fot. $^{30}/_{4}$ 00.

Fot. $^{15}/_{1}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 523

Fot. $^{10}/_{5}$ 00.

Fot. $^{21}/_{2}$ 00

Lupus vulgaris Nr. 527

Fot. $^{21}/_{7}$ 00.

Fot. $^{15}/_{3}$ 02.

Lupus vulgaris Nr. 569

Fot. $^{6}/_{6}$ 00.

Fot. $^{16}/_{11}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 599

Fot. $^{30}/_{10}$ 00.

Fot. $^{18}/_{2}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 616

Fot. $^{28}/_{9}$ 99.

Fot. $^{12}/_{9}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 619

Fot. $^{20}/_{1}$ 02.

Fot. $^{7}/_{4}$ 02.

Lupus vulgaris Nr. 659



Fot. $^{12}/_{3}$ 01.



Fot. $^{3}/_{10}$ 01.

Lupus vulgaris Nr. 680



Fot. $^{14}/_{3}$ 01.

Fot. $^{5}/_{6}$ 02.

Lupus vulgaris Nr. 683

Fot. $^{3}/_{5}$ 01.

Fot. $^{9}/_{4}$ 02.

Lupus vulgaris Nr. 709